




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1785/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1785/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1785/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1785/A

IOTHECA


P. P. C. LAMMENS.

1785/A
L

2a3

24096

24096



16: 7: B.
PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE
MEDICA MATERIA

LIBRI SEX,
Ioanne RVELLIO Suefsionenfi
interprete.

HIS ACCESSIT, PRÆTER
Pharmacorum simplicium catalogum,
copiosus omnium ferme medela-
rum siue curationum
Index.



LVGDVNI,
SVB SCVTO COLO-
NIENSI.
1546

INDEX OMNIUM

quæ in Dioscoride continentur.

| A | | A | |
|---------------------|-----|-----------------|-----|
| A Brotonum | 229 | Adeps omnis | 135 |
| Abſinthium | 227 | Adianton | 364 |
| Abſinthium marinū | 228 | Aegilops | 365 |
| Abſinthiū Santonicū | 229 | Aeris squamma | 441 |
| Acacalis | 76 | Aeris flos | 440 |
| Acacia | 83 | Aerugo rafa | 442 |
| Acacia altera | 84 | Aerugo scolecia | 444 |
| Acantha,us | 223 | Aes vſtum | 439 |
| Acanthium | 222 | Aethiopis | 354 |
| Acanthus ſylueſtris | 223 | Aëtites lapis | 482 |
| Acerum | 413 | Agallochon | 25 |
| Acetum è betonica | 427 | Agaricum | 211 |
| Acetum muſſum | 414 | Ageraton | 327 |
| Acetum ſcillinum | 416 | Agnus | 85 |
| Acetum è ſtœchade | 427 | Aiuga | 302 |
| Achillea | 319 | Alabaſtrites | 480 |
| Achras | 99 | Alcea | 298 |
| Acida muria | 415 | Alcibiadion | 315 |
| Acinos | 239 | Alcyonium | 473 |
| Acorum | 8 | Alisma | 299 |
| Aconitum | 342 | Allium | 186 |
| Adarces | 474 | Aloë | 225 |
| | | Alſine | 347 |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Althæa | 297 | Anisum | 249 |
| Alumen | 464 | Anonis | 223 |
| Alumen scissile | ibidem | Anthemis | 292 |
| Alus | 309 | Anthericum | 198 |
| Alysson | 271 | Antyllis | 291 |
| Alypon | 393 | Antipathes | 475 |
| Amaracum | 238 | Antirrhinon | 362 |
| Amaranton | 327 | Antispoda | 439 |
| Ambrosia | 282 | Aparine | 271 |
| Amiantus lapis | 481 | Aphaca | 184 |
| Anmi | 251 | Apiastrum | 276 |
| Ammoniacon | 269 | Apios | 392 |
| Amomis | 20 | Apium | 23 |
| Amomum | 19 | Apocynon | 344 |
| Ampelitis terra | 486 | Apollinaris | 334 |
| Ampeloprason | 186 | Apriecur | 121 |
| Amphisbænæ ictus notæ | | Apum ictus curatio | 537 |
| 531. eius curatio | 541 | Aqua | 412 |
| Amurca | 88 | Aqua frigida | 513 |
| Amygdalæ amaræ | 101 | Aqua marina | 412 |
| Amylum | 157 | Aqua mulsa | 411 |
| Anagallis | 205 | Arabicus lapis | 480 |
| Anagyris | 299 | Araneus | 126 |
| Anchusa | 315 | Arbutus | 101 |
| Androsaces | 290 | Arcion | 355 |
| Androsamon | 301 | Arction | 354 |
| Anemone | 204 | Arcturon | ibidem |
| Anethum | 249 | Arena | 483 |
| Anguium senectus | 115 | Argemone | 205 |
| | | Arg | |

I N D E X.

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Argenti recrementū | 449 | Atramentum librariū | 487 |
| Argenti scoria | ibidem | Atramentū sutorium | 488 |
| Argēti spuma | ibi.& 510 | Atriplex | 169 |
| Argentum viuū | 456.& 510 | Auellana nux | 103 |
| Arisarum | 198 | Auena | 156 |
| Aristolochia | 214 | Auricula muris | 209 |
| Armeniaca mala | 98 | Auri pigmentum, siue ar- | |
| Armenius lapis | 454 | senicon | 463.& 510 |
| Armoracia | 167 | B | |
| Aron | 197 | B Accæ lauri | 71 |
| Arrhenogonon | 286 | Baccharis | 240 |
| Artemisia | 281 | Balaustium | 94 |
| Arundo, vide Harundo | | Ballote | 276 |
| Asarum | 13 | Balsamum | 22 |
| Asclepias | 272 | Barbula hirci | 183 |
| Ascyron | 301 | Basilisci ictus notę 533. eius | |
| Asininum iecur | 121 | curatio | 543 |
| Asini vngula | 120 | Bdellium | 55 |
| Asius lapis | 476 | Beta | 171 |
| Aspalathus | 24 | Betonica | 304 |
| Asparagus | 173 | Bitumen | 66.& 67 |
| Asplenon | 290 | Blatta pistrinaria | 120 |
| Aspidis ictus notę 533. eius | | Bliton | 168 |
| curatio | 543 | Botrys | 282 |
| After Atticus | 319 | Brassica | 169 |
| Astragalus | 329 | Brassica marina | 171 |
| Athamanticum | 8 | Brassica syluestris | 170 |
| Athera | 155 | Britannica | 305 |
| Atractylis | 271 | Bromus | 365 |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|
| Bryon | 25 | curatio morsus eius | 525. |
| Bryonia | 394 | ab eo morsorum victus | |
| Buccina | 110 | ratio | 527 |
| Buglossum | 361 | Cannabis | 298 |
| Bulbus esculentus | 199 | Cantharides | 125 |
| Bulbus vomitorius | 200 | Capnos | 355 |
| Bunion | 360 | Capparitis | 202 |
| Buprestis | 125. & 499 | Capræ vngula | 121 |
| Buphthalmos | 294 | Caprinum iecur | ibidem |
| Butyrum | 131 | Cardamomum | 10 |
| Butyri fuligo | ibidem | Cardamina | 175 |
| C | | Carduus | 222 |
| Acacia | 360 | Carpasi succus | 503 |
| Canchrys | 260 | Cariotæ | 92 |
| Cadmia | 433 | Carum | 249 |
| Cæcilie ictus notæ 531. cu- | | Caseus | 130 |
| ratio eadem quæ viperæ | | Cassia | 16 |
| morsus. | | Castanea | 90 |
| Calamus odoratus | 21 | Castorium | 117 |
| Calamintha | 235 | Catanance | 363 |
| Calcifraga | 393 | Caucalis | 181 |
| Caltha | 327 | Cedria | 70 |
| Calx | 510 | Cedrides | 71 |
| Calx vina | 471 | Cedromela | 98 |
| Cancamum | 26 | Cedrus | 69 |
| Canceri | 113 | Celticum nardum | 12 |
| Canis rubus | 77 | Cēchri ictus notæ 532. eius | |
| Canis rabidi iecur | 121 | remedia | 542 |
| Canis rabiosi signa | 524. | Centauriū magnum | 216 |
| | | Cent | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Centaurium minus | 217 | 327 | |
| Cepa | 185 | Chrysocolia | 454 |
| Cepæa | 299 | Chrysocome | 326 |
| Cera | 151 | Chrysogonon | ibidem |
| Cerafia | 96 | Cicadae | 123 |
| Ceraſte iſtus notę 533.eius | | Cicer fatium | 159 |
| curatio | 542 | Cicer arietinum | ibidem |
| Cerui genitale | 120 | Cicer ſylueſtre | 160 |
| Ceruinum cornu | 124 | Cichorion | 178 |
| Ceruſſa | 452.& 507 | Cici | 381 |
| Celſtron | 304 | Cicuta | 343.& 503 |
| Chalcitis | 459 | Cimices | 119 |
| Chamæ | 111 | Cimolia | 485 |
| Chamæacte | 390 | Cinis ſarmentitius | 472 |
| Chamæciſſos | 361 | Cinnabaris | 455 |
| Chamædaphne | 369 | Cinnamomum | 17 |
| Chamædryſ | 274 | Cionia | 110 |
| Chamæleo albus | 118 | Circaea | 283 |
| Chamæleo niger | 219 | Cirſium | 358 |
| Chamæleuce | 361 | Ciſtus | 78 |
| Chamæpitys | 302 | Citria mala | 98 |
| Chamæſyce | 387 | Clematis | 307 |
| Chamælea | 389 | Clinopodion | 273 |
| Characias tithymalus | 382 | Clymenon | 310 |
| Chelidonium | 207 | Cnicus | 398 |
| Chelidonium minus | 208 | Coagulum | 134 |
| Chia terra | 485 | Coccum gnidion | 390 |
| Chondrylla | 178 | Coccum infectorium | 324 |
| Chryſanthemon | 292.& | Cochlex | 112 |

INDEX.

| | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------|
| Cœruleus | 455 | Croton | 381 |
| Colchicon | 345 | Cucurbita | 179 |
| Colligendorum ratio | 4 | Cucumis sativus | 179 |
| Colocasia | 161 | Cucumis sylvestris | 372 |
| Colocynthis | 392 | Cuminum sativum | 250 |
| Colymbades | 87 | Cuminum sylvestre | ibid. |
| Communis curatio in o- | | Cunila | 231 |
| mmes ictus virulentos | 533 | Capressus | 68 |
| Conyza | 284 | Curmi | 154 |
| Corallium | 475 | Cyclaminus | 194 |
| Coriandrum | 251. & 502 | Cyclaminus altera | 196 |
| Coria veteramentaria | 121 | Cydonomeli | 419 |
| Coriarius frutex | 91 | Cynia | 399 |
| Coris | 302 | Cynorambe | ibidem |
| Coronopus | 176 | Cynoglosson | 362 |
| Cornu cerui | 124 | Cynosorchis | 287 |
| Cornus | 100 | Cyparissias tithymalus | |
| Corruda | 173 | | 384 |
| Cos Naxia | 483 | Cyphi | 26 |
| Costus | 20 | Cypirus | 9 |
| Cotonea mâla | 97 | Cytinus | 94 |
| Cotyledon | 349 | Cytisus | 356 |
| Crateogonon | 286 | | |
| Crimnon | 155 | D | |
| Crithmum seu crithamon | 176 | D Amascena pruna | 100 |
| | | Damasonion | 299 |
| Crocodilion | 220 | Daphnoides | 368 |
| Crocomagma | 27 | Daucus | 257 |
| Crocum | ibidem | Delphinium | ibid. |
| | | Dendroides tithymalus | |
| | | Deur | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 384 | | Elæomeli | 32 |
| Deuteria | 409 | Eleoselinum | 253 |
| Dictamnium | 233 | Elichryson | 327 |
| Dictamnium Cretense | 234 | Empetron | 393 |
| Diphryges | 462 | Ephemeron | 346.& 500 |
| Dipsacum | 220 | Epimedium | 313 |
| Dipsadis morsus notæ | 532. | Epimelis | 99 |
| eius curatio | 541 | Epipactis | 355 |
| Dorycnion | 339.& 501 | Epirotica mâla | 98 |
| Draba | 190 | Epithymum | 393 |
| Draco marinus | 110 | Equisetum | 323 |
| Draconis marini ictus re- | | Equorum lichenes | 121 |
| media | 539 | Eretria terra | 483 |
| Dracunculus | 196 | Erica | 75 |
| Dryini ictus notæ | 532. | Erinaceus | 109 |
| eius curatio | 541 | Erinei | 107 |
| Dryopteris | 397 | Erinus | 317 |
| Dulcis radix | 216 | Eruca | 181 |
| E | | Erucae olerum | 125 |
| E Benus | 80 | Erucae pinorum | 125.& |
| Ebulum | 390 | 498 | |
| Ebur | 124 | Eruum | 163 |
| Echinus | 109 | Eryngium | 225 |
| Echion | 316 | Erysimon | 190 |
| Elaphoboscon | 255 | Erythrodanon | 296 |
| Elaterion | 373 | Empatorium | 321 |
| Elatine | 320 | Emphorbium | 266 |
| Electrum | 73 | F | |
| Elelisphacos | 234 | F Aba | 160 |

INDEX.

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| Faba ægyptia | 161 | G | |
| Fax | 471 | Agates lapis | 479 |
| Fagus | 90 | Galaetites lapis | 480 |
| Farina crassior | 155 | Galaxias | ibidem |
| Fel | 143 | Galbanum | 267 |
| Ferri rubigo | 445 | Galerita | 123 |
| Ferula | 261 | Galion | 356 |
| Festuca | 365 | Galiopsis | ibidem |
| Fibrini testes | 116 | Galla | 90 |
| Ficus | 105 | Gallina | 122 |
| Filicula | 397 | Gallinæ cerebellum | ibid. |
| Filix | 396 | Garum | 119 |
| Filix fœmina | ibidem | Genitale cerui | 120 |
| Fimum | 145 | Gentiana | 213 |
| Flos aris | 440 | Geranion | 283 |
| Flos salis | 469 | Geodes lapis | 483 |
| Flos punicæ | 94 | Gingiberis | 192 |
| Flos sylvestris punici | ibid. | Gingidion | 181 |
| Fœniculum | 256 | Gith | 273 |
| Fœniculum erraticū | ibid. | Gladiolus | 313 |
| Fœnum græcum | 158 | Glans | 89 |
| Fraxinus | 72 | Glans Iouis | 90 |
| Fuligo è myrrha, resina, | | Glans Sardiana | ibidem |
| styrace | 59 | Glans vnguentaria | 379 |
| Fuligo liquidæ picis | 65 | Glastum satium | 209 |
| Fuligo pictoria | 486 | Glastum sylvestre | 210 |
| Fuligo thuris | 59 | Glaucium | 270 |
| Fumaria | 355 | Glaux | 366 |
| Fungi | 345. & 508 | Gluten piscium | 270 |
| | | Glut | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|------------|
| Glutinum | ibidem | Heliotropium | magnum |
| Glycyfide | 294 | | 399 |
| Gnaphalion | 283 | Heliotropium parvū | 400 |
| Gnidium granum | 389 | Helleborum album | 369 |
| Gobius | 118 | Helleborum nigrum | 370 |
| Gramen | 317 | Helxine | 320. & 346 |
| Gramen arūdinaceū | ibid. | Hemerocallis | 289 |
| Gramen parnafi | ibidem | Hemionitis | 291 |
| Grossi | 107 | Herba Sabina | 69 |
| Gummi amygdalæ | 102 | Hieracium magnum | 252 |
| Gummi cerasi | 96 | Hieracium paruum | ibid. |
| Gypsum | 472. & 508 | Hippace | 131 |
| H | | Hippocampus | 110 |
| H Aematites | 477 | Hippoglosson | 362 |
| H Hemorrhoi ictus no | | Hippolapathon | 168 |
| ta 32. eius curatio | 542 | Hippomarathon | 256 |
| Halica | 156 | Hippophaës | 380 |
| Halicacabon solanum | 338 | Hippophæston | 381 |
| Halimus | 76 | Hippopotami testes | 116 |
| Harundo | 74 | Hipposelinon | 254 |
| Harundo cypria | ibidem | Hirci barbula | 183 |
| Harundo vallatoria | ibid. | Hirculus | 12 |
| Hastula regia | 128 | Hirundines | 124 |
| Hedera | 206 | Hirudo | 512 |
| Hedysaron | 289 | Holostium | 310 |
| Helcysma | 449 | Hordeum | 153 |
| Helenium | 28 | Horminum | 288 |
| Helenium alterum | 29 | Hyacinthus | 329 |
| Helioscopius | 384 | Hydromeli | 412 |
| | | Hyd | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|--------|
| Hydromelon | 419 | Iuncus | 325 |
| Hydropiper | 193 | Iuncus odoratus | 21 |
| Hyoscyamus | 334.&504 | Iuniperus | 68 |
| Hypecoon | 334 | Iuspiscium | 119 |
| Hypericon | 300 | Ixia | 218 |
| Hypocistis | 78 | | |
| Hyssopum | 230 | L | |
| | | L Abram Veneris | 220 |
| | | L Labrusca | 402 |
| I Aspis | 481 | Lac | 128 |
| Iberis | 108 | Lac coagulatum | 509 |
| Ibiscum | 297 | Lac humanum | 130 |
| Ichthyocolla | 270 | Lac schiston | 129 |
| Idæa radix | 323 | Lactis serum | ibid. |
| Iecur apri | 121 | Lacerta | 127 |
| Iecur alinum | ibid. | Lactuca sativa | 180 |
| Iecur canis rabidi | ibid. | Lactuca sylvestris | ibid. |
| Iecur caprinum | ibid. | Ladanum | 79 |
| Iecur mergi | ibidem | Lagopus | 312 |
| Illecebra | 348 | Lampfana | 168 |
| Ilex | 90 | Lana | 132 |
| Indicum | 455 | Lana cremata | ibidem |
| Inguinalis | 359 | Lanaria herba | 194 |
| Intybus | 177 | Lappa | 365 |
| Iouis glans | 90 | Lapathum | 167 |
| Irio | 190 | Lasfer | 264 |
| Iris | 6 | Lasferpitium | ibidem |
| Isopyron | 359 | Lathyrus | 385 |
| Iudaicus lapis | 481 | Lauer | 175 |
| Inglandes nucs | 102 | Laurus | 71 |
| | | Laurus | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|
| Laurus Alexandrina | 368 | Lithospermon | 295 |
| Lauri baccaë | 71 | Locustæ | 123 |
| Lemnia terra | 417 | Lolium | 157 |
| Lens | 162 | Lonchitis | 296 |
| Lens palustris | 347 | Lora | 409 |
| Lentiscus | 61 | Lotus arbor | 99 |
| Lentiscina resina | 64 | Lotus Aegyptia | 357 |
| Leontopetalon | 273 | Lotus sylvestris | 356 |
| Leontopodion | 362 | Lotus urbana | ibid. |
| Lepidium | 203 | Lupinus | 164 |
| Leptocarya | 103 | Lychnis coronaria | 275 |
| Lepus marinus | 115 & 511 | Lychnis sylvestris | ibidem |
| Lepus terrestris | 115 | Lycium | 82 |
| Leucacantha | 224 | Lycopsis | 316 |
| Leucanthemon | 292 | Lygos | 86 |
| Leucas | 274 | Lysimachia | 306 |
| Lencoion | 285 | M | |
| Lichenes equorum | 121 | M Acer | 73 |
| Lichen | 326 | M Manæ | 118 |
| Lignorum marcor | 73 | Magnes | 479 |
| Ligusticum | 246 | Magudaris | 365 |
| Ligustrum | 77 | Malabathrum | 15 |
| Lilium | 275 | Malicorium | 94 |
| Lilium sylvestre | 285 | Malua | 168 |
| Limonion | 312 | Malum | 97 |
| Lingua bubula | 361 | Malum Armeniacum | 98 |
| Linozostis | 398 | Malum cotoneum | 97 |
| Linum | 159 | Malum dulce | 98 |
| Lithocolla | 482 | Malum Epiroticum | ibid. |
| | | Mal | |

INDEX.

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|-------|
| Malum Medicum | ibid. | Memphites | 481 |
| Malum orbiculatum | ibid. | Mentha | 235 |
| Malum Persicum | ibid. | Menthastrum | ibid. |
| Malum præcox | ibid. | Meon | 8 |
| Malum punicum | 93 | Mercurialis | 398 |
| Malum sylvestre | ibid. | Mergi iecur | 121 |
| Mandragoras | 339. & 504 | Mespilus | 99 |
| Manna thuris | 53 | Metopion vnguentũ | 49 |
| Marcor lignorum | 73 | Milium | 156 |
| Maron | 239 | Millefolium | 357 |
| Marrubium | 277 | Millepedæ | 120 |
| Marrubium nigrum | 276 | Misy | 460 |
| Mastiche | 61 | Mituli | 111 |
| Meconium | 504 | Moly | 243 |
| Medica | 184 | Molybdæna | 448 |
| Medica mâla | 98 | Molybdoides lapis | 448 |
| Medion | 313 | Morochthus | 480 |
| Medulla | 142 | Morus | 103 |
| Mel | 149 | Mullus | 116 |
| Mel heraction | 502 | Mulfum | 411 |
| Melampythium | 462 | Muralis herba | 346 |
| Melanteria | 460 | Muria | 469 |
| Melanthium | 263 | Mures | 128 |
| Melia terra | 486 | Murisaurecula | 209 |
| Melilotos | 239 | Musaraneus | 127 |
| Melímela | 98 | Muris aranei ictus notæ | 539 |
| Melissophyllon | 276 | 531. eius curatio | 539 |
| Melitites lapis | 480 | Muscus | 25 |
| Melomeli | 419 | Muscus marinus | 351 |
| | | Must | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------|------|------------------------|------------|
| Mustela | 117 | Nymphæa | 289 |
| Myagron | 358 | O | |
| Myolotis | 269 | O Chra | 455 |
| Myrica | 71 | O Ocimastrum | 316 |
| Myrrha | 52 | Ocimum | 182 |
| Myrrha Bœotica | 54 | Oenanthe | 284. & 403 |
| Myrrhis | 357 | Ocypum | 133 |
| Myrtidanum | 96 | Olea sylvestris | 86 |
| Myrtus fatiua | 95 | Oleaster | ibidem |
| Myrtus sylvestris | 367 | Oleæ æthiopice lacryma | 88 |
| N | | Olei vires | 29 |
| N Aphtha | 67 | Oleum amygdalinum | 33 |
| Napus | 166 | Oleum balaninum | 34 |
| Narcaphthon | 25 | Oleum cicinum | 32 |
| Narcissus | 379 | Oleum cnicinum | 34 |
| Nardi genera | 10 | Oleū è gnidio grano | ibid. |
| Nardum Celticum | 12 | Oleum hyoscyaminum | 34 |
| Nardum montanum | 13 | Oleum laurinum | 35 |
| Nardinum vnguentum | 51 | Oleum lentiscinum | 36 |
| Nasturtium | 189 | Oleum mastichinum | ibid. |
| Natricis ictus notæ | 532. | Oleum melanthinum | 34 |
| eius curatio | 542 | Oleum melinum | 98 |
| Nepeta | 235 | Oleum myrteum | 35 |
| Nerion | 344 | Oleum oliuæ sylvestris | 30 |
| Nitrum | 469 | & 88 | |
| Nitri spuma | 470 | Oleum omphacinum | 29 |
| Nux auellana | 103 | Oleum picinum | 65 |
| Nux iuglans | 102 | Oleum raphaninum | 34 |
| Nux pinea | 60 | Oleum Sicyonium | 31 |
| | | Oleum | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------|--------|
| Oleum sinapium | 34 | Othonna | 208 |
| Oleum styracinum | 55 | Ouorum natura | 122 |
| Oleum terebinthinum | 36 | Oui candidum | ibidem |
| Oliuæ colymbades | 87 | Oxalme | 415 |
| Oloschœnos | 325 | Oxylapathum | 167 |
| Olusatrum | 254 | Oxymyr sine | 367 |
| Omphacium | 404 | P | |
| Omphacomelites | 419 | P Aederota | 223 |
| Onagra | 358 | Pætonia | 294 |
| Onitis | 231 | Paliurus | 76 |
| Onobrychis | 300 | Palma | 92 |
| Ononis | 223 | Palma elate | 93 |
| Onosma | 289 | Palma thebaicæ | 92 |
| Onyx | III. & 480 | Panaces Asclepij | 245 |
| Ophioscorodon | 187 | Panaces Chironium | ibid. |
| Ophites lapis | 432 | Panaces Heracleum | 243 |
| Opium | 331 | Pancration | 201 |
| Opobalsamum | 22 | Panicum | 156 |
| Opopanax | 243 | Papauer corniculatum | |
| Orbiculata mala | 98 | 333. & 505 | |
| Oreoselinon | 253 | Papauer erraticum | 330 |
| Origanum | 231 | Papauer sativum | ibid. |
| Origanum sylvestre | ibid. | Papauer spumeum | 334 |
| Ornithogalum | 183 | Pappi | 512 |
| Orobanche | 182 | Papyrus | 74 |
| Oryza | 156 | Paralios | 384 |
| Osisifragus | 123 | Pardalianches | 342 |
| Ostracites | 483 | Paronychia | 326 |
| O syris | 366 | Parthenium | 293 |
| | | Paf | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Passum | 406 | Phycus marinus | 352 |
| Pastinaca herba | 247 | Phyllitis | 278 |
| Pastinaca marina | 115 | Phyllon | 286 |
| Pastinacæ marinæ ictus | | Phyteuma | 362 |
| notæ 531. eius curatio | | Picea | 59 |
| 539 | | Picis liquidæ fuligo | 65 |
| Pedicularia | 375 | Pineæ nuces | 60 |
| Peleciton | 289 | Pinorum erucæ 125. & 498 | |
| Peplis | 386 | Pinus | 59 |
| Peplos | ibid. | Piper | 191 |
| Pepo | 179 | Piscium ius | 119 |
| Periclymenon | 311 | Pissasphaltos | 67 |
| Peristereon | 328 | Pisselaon | 65 |
| Persea | 108 | Pistacia | 102 |
| Perfica mala | 98 | Pityusa | 385 |
| Personata | 355 | Fix liquida | 64 |
| Petasites | ibid. | Fix sicca | 66 |
| Petroselinum | 253 | Plantago | 173 |
| Peucedanon | 261 | Platanus | 72 |
| Phalangium | 278 | Plumbago | 448 |
| Phalāgij morsus notæ 530. | | Plumbum elotum | 446 |
| eius curatio | 538 | Plumbum vltam | ibid. |
| Phalaris | 295 | Plumbi recremētum | 447 |
| Pharicon | 506 | Pnigitis terra | 485 |
| Phasiolus | 163 | Polemonia | 308 |
| Phœnicobalanus | 92 | Polion | 279 |
| Phœnix | 322 | Polycnemon | 273 |
| Phrygius lapis | 476 | Polygala | 366 |
| Phu | 14 | Polygonaton | 307 |

b

INDEX.

| | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| Polygonon | 306 | Pyrites | 477 |
| Polypodion | 397 | Pyrorum genera | 99 |
| Pompholyx | 435 | | |
| Populus alba | 72 | Q Vercus | 89 |
| Populus nigra | ibidem | Q Quinquefolium | 321 |
| Porrum capitatum | 184 | R | |
| Portulaca | 172 | R Adicula | 194 |
| Potamogeton | 352 | R Radix | 166 |
| Poterion | 222 | Radix dulcis | 216 |
| Propolis | 152 | Radix sylvestris | 167 |
| Prunus, pruna | 100 | Rana | 117 |
| Pseudobunion | 360 | Rana palustris | 511 |
| Pseudocasia | 16 | Ranunculum | 203 |
| Pseudocinnamomum | 19 | Rapum | 165 |
| Pseudodictamnium | 234 | Recondendorum ratio | 5 |
| Psoricon | 459 | Recrementum argēti | 449 |
| Ptychotrophon | 304 | Resinæ variæ | 63 |
| Ptyllion | 336. & 502 | Resina lentiscina | 64 |
| Parmica | 193 | Resina liquida e pinu & pi | |
| Pulegium | 232 | cea | 63 |
| Pulegium sylvestre | 233 | Rha | 213 |
| Pulicaria | 336 | Rhamnus | 78 |
| Pulicula | 155 | Rhaphanus | 166 |
| Pulmones animalium | 120 | Rhaphanus sylvestris | 167 |
| Pumex | 466 | Rhaponticum | 213 |
| Purpura | 110 | Rheon | ibid. |
| Pycnocomon | 391 | Rhodia radix | 323 |
| Pyrafter | 99 | Rhododendron | 344 |
| Pyrethrum | 258 | Rhus | 91 |
| | | Ric | |

INDEX.

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Ricinus | 381 | Salix | 86 |
| Rosa | 81 | Salvia | 234 |
| Roseipastilli | ibidem | Sambucus | 390 |
| Rosmarinus | 258 | Samia terra | 484 |
| Rosmarinum coronariū | ibidem | Samius lapis | ibidem |
| 260 | | Sampfuchum | 238 |
| Rubeta | 511 | Sandaracha | 463.& 510 |
| Rubia | 296 | Sandyx | 453 |
| Rubigo ferri | 445 | Sanguinaria | 306 |
| Rubrica fabrilis | 457 | Sanguinaria foemina | 307 |
| Rubrica Sinopica | ibidem | Sanguis | 144 |
| Rubus | 319 | Sanguis tauri | 509 |
| Rubus canis | 77 | Sapa | 406 |
| Rubus Idaeus | 320 | Sapphirus | 481 |
| Rumex | 167 | Sarcocolla | 269 |
| Ruscum | 367 | Sardianæ glandes | 90 |
| Ruta | 240 | Sardonias | 503 |
| Ruta sylvestris | 242 | Sarmentitius cinis | 472 |
| S | | Satureia | 237 |
| Sabina herba | 69 | Satyrion | 288 |
| Saccharum | 150 | Satyrion erythroniō | ibid. |
| Sacra herba | 328 | Scammonia | 387 |
| Sagapenum | 266 | Scandix | 181 |
| Sal | 467 | Schistum lac | 129 |
| Salis flos | 469 | Schistos lapis | 479 |
| Salis spuma | 468 | Scilla | 200 |
| Salamandra | 126.& 499 | Scincus | 127 |
| Salinaris | 258 | Scolopendra | 114 |
| Saliunca | 12 | Scolopendræ ictus notæ | |

b 2

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 530. eius curatio | 538 | Seseli Creticum | ibidem |
| Scolymos | 222 | Seseli Peloponnesense | ibid. |
| Scordion | 280 | Setanium | 99 |
| Scorodoprasum | 188 | Sicyonium oleum | 31 |
| Scoria plumbi | 447 | Sideritis | 318 |
| Scorpioides | 400 | Sidion | 94 |
| Scorpius marinus | 113 | Siligo | 155 |
| Scorpius terrestris | ibid. | Siliquæ | 97 |
| Scorpij ictus notæ 530. eius | | Silphium | 264 |
| curatio | 538 | Silurus | 118 |
| Securidaca | 289 | Silybum | 379 |
| Sedum magnum | 347 | Sinapi | 188 |
| Selenites lapis | 481 | Sion | 175 |
| Selinusia terra | 485 | Siser | 167 |
| Semen | 155 | Sison | 248 |
| Semperuium | 347 | Sisymbrium vtrunq; | 175 |
| Semperuium minus | 348 | Sitania | 153 |
| Senecta anguium | 115 | Smarides pisces | 118 |
| Senecio | 351 | Smilax 183. & 343. & 503. | |
| Sepia | 115 | Smilax aspera | 366 |
| Seps | 127 | Smilax lævis | 367 |
| Seris | 177 | Smyris lapis | 483 |
| Serpyllum | 237 | Smyrnion | 254 |
| Sertula Campana | 239 | Solanum hortense | 336 |
| Serum lactis | 129 | Solanum manicum | 338 |
| Sesania | 157 | Solanum somniferum ibid. | |
| Sesamoides | 372 | Sonchus | 177 |
| seseli | 247 | Sorba | 100 |
| seseli Aethiopicum | 248 | Sory | 461 |
| | | Spar | |

I N D E X.

b 3

INDEX.

| | | | |
|----------------|------------|---------------------------|-------------------|
| Thunus | 119 | V | |
| Thus | 56 | V | Enenata 513 |
| Thuris cortex | 58 | V | Veneris umbilicus |
| Thuris fuligo | 59 | | 349 |
| Thurismauna | 58 | Veratrum album | 369 |
| Thyites lapis | 480 | Veratrum nigrum | 370 |
| Thymelæa | 389 | Verbascum | 353 |
| Thymoxalme | 415 | Verbenaca | 328 |
| Thymus | 236 | Vermes terreni | 127 |
| Tilia | 78 | Vesparū iētus curatio | 537 |
| Tithymali | 382 | Vesicaria | 337 |
| Tordylion | 248 | Vetonica | 305 |
| Torpedo piscis | 114 | Victus ratio in morfu ra- | |
| Toxicon | 506 | biofi canis | 527 |
| Tragacantha | 224 | Vimen | 86 |
| Tragium | 324 | Vina marina | 417 |
| Tragoriganum | 232 | Vina picata | 424 |
| Tragos | 155. & 325 | Vina resinata | 423 |
| Tribulus | 311 | Vini natura | 405 |
| Trichomanes | 365 | Vinum abiegnum | 423 |
| Trifolium | 278 | Vinum abrotonites | 428 |
| Trimestria | 152 | Vinum absinthites | 228 & |
| Triphyllon | 278 | | 425 |
| Tripolion | 363 | Vinum acorites | 430 |
| Trissago | 274 | Vinum adynamon | 410 |
| Triticum | 152 | Vinum anethinum | 431 |
| Tuber | 183 | Vinum apijtes | 419 |
| Tussilago | 281 | Vinum aromatites | 428 |
| Typha | 283 | Vinum asarites | 430 |
| | | Vin | |

INDEX

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Vinum bunites | 427 | Vinum myrsinites | 421 |
| Vinum calaminthites | 428 | Vinum myrtites | 420 |
| Vinum catorchites | 422 | Vinum è nardo sylvestri | |
| Vinum cedrinum | 423 | 430 | |
| Vinum cedrites | 424 | Vinum nectarites | 429 |
| Vinum cestrites | 427 | Vinum œnanthinum | 419 |
| Vinum chamædryites | 426 | Vinum omphacites | 409 |
| Vinum è chamælaea | 431 | Vinum palmeum | 421 |
| Vinum chamæpitynū ibi. | | Vinum organites | 428 |
| Vinum è conyza | 428 | Vinum panacites | 430 |
| Vinum cupressinum | 423 | Vinum phthorion | 431 |
| Vinum cydonites | 418 | Vinū è petroselino | ibid. |
| Vinum daucites | 430 | Vinum picatum | 424 |
| Vinum dictamnites | 427 | Vinum pincum | 423 |
| Vinum è flore salis | 431 | Vinum è pipere | 429 |
| Vinum helleborites | 432 | Vinum è pulegio | 428 |
| Vinum hyssopites | 426 | Vinum resinatum | 423 |
| Vinum ex iride | 429 | Vinum rhodites | 420 |
| Vinum iuniperinum | 423 | Vinum rhœtes | ibid. |
| Vinum laurinum | ibidem | Vinum saluiatum | 430 |
| Vinum lentiscinum | 421 | Vinum è satireia | 428 |
| Vinum mandragorites | | Vinum scammonites | 433 |
| 432 | | Vinum scillinum | 417 |
| Vinum marathrites | 431 | Vinum selinites | 431 |
| Vinum è marrubio | 427 | Vinum sicchadites | 426 |
| Vinum melites | 418 | Vinum strobilites | 423 |
| Vinum melirites | 410 | Vinum è sycomoris | 422 |
| Vinum melomeli | 429 | Vinū è Syriaca nardo, cel- | |
| Vinum è myrrha | 429 | tica, malabathro. | 429 |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------|--------|
| Vinum terebinthinum | | Vng.bedychroon | 45 |
| 421 | | Vng.iasminum | 52 |
| Vinum thymites | 428 | Vng.irinum | 46 |
| Vinum è thymelæa | 431 | Vng.lilinum | 42 |
| Vinũ tragoniganites | 427 | Vng.malabathrinum | 52 |
| Viola alba | 285 | Vng.megalinum | 49 |
| Viola purpurea | 359 | Vng.melinum | 39 |
| Viperæ ictus notæ 531. eius | | Vng.mendesium | 50 |
| curatio | 540 | Vng.metopion | 49 |
| Viperinæ carnes | 114 | Vng.narcissinum | 44 |
| Viscum | 270 | Vng.nardinum. | 51 |
| Vitis alba | 394 | Vng.ociminum | 41 |
| Vitis nigra | 395 | Vng.cœnanthinum | 39 |
| Vitis sylvestris | 397 | Vng.onychinum | 45 |
| Vitis vinifera | 401 | Vng.rosaceum | 37 |
| Vitex | 85 | Vng.sampsuchinum | 40 |
| Vlmus | 73 | Vng.styracinum | 45 |
| Umbilicus Veneris | 349 | Vng.susinum | 42 |
| Unedo | 101 | Vng.telinum | 40 |
| Vnguentorum ratio | 36 | Vngula asini | 120 |
| Vng.abrotoninum | 41 | Vngula capræ | ibidem |
| Vng.amaracinum | 48 | Vnguis odoratus | 111 |
| Vng.anethinum | 42 | Vrina | 148 |
| Vng.butyrium | 45 | Vrtica | 349 |
| Vng.cinnamominum | 50 | Vstio contra venenatos | |
| Vng.crocinum | 44 | ictus | 526 |
| Vnguentum cyprinum | 45 | Vua | 402 |
| Vng.elatinum | 38 | Vua passâ | 403 |
| Vng.gleucinum | 48 | Vulpinus pulmo | 120 |
| | | Xan | |

INDEX.

| | | | |
|------------------|-----|------------------------|-----|
| X | | Xyris | 314 |
| X Anthion | 365 | Z | |
| X Xyphion | 313 | Z Ea, seu semen | 155 |
| Xylobalsamon | 23 | Z Zopiffa | 66 |
| Xylocinnamomum | 18 | Zythum | 154 |

FINIS.

INDEX NOMENCLATIONUM, quibus officinae Seplasiariorum, & Herbarij nostri temporis utuntur.

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| A | | Berberis | 77 |
| A Cacia | 83 | Berula | 175 |
| A Agnus castus | 85 | Bismalua | 297 |
| Agrimonia | 321 | Borago | 361 |
| Alcanna | 77 | Branca vrcina | 223 |
| Alkekengi | 337 | Bruscus | 367 |
| Aloë | 25 | Bryonia | 394 |
| Apium | 253 | Buglossa | 358 |
| Apium risus | 283 | C | |
| Aphrodilos | 198 | C Alamentum | 235 |
| Arabis | 190 | C Camomilla | 292 |
| Artichault | 222 | Capillus Veneris | 364 |
| Aspergula | 271 | Caprifolium | 311 |
| B | | Cartamus | 398 |
| B Alfamita | 175 | Cataputia maior | 381 |
| B Bardana | 355 | Cataputia minor | 385 |
| Basilicon | 182 | Cauda equina | 323 |

b s

INDEX.

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| C entinodia | 306 | H ermodactylus | 345 |
| C errefolium | 181 | I | |
| C eterach | 290 | I arus | 197 |
| C heiri | 285 | I ringus | 225 |
| C oloquintida | 392 | I ua arthritica | 302 |
| C onfolida maior | 309 | I ufquianus | 334 |
| C ornu cerni | 176 | L | |
| C raffula maior | 210 | L acca | 26 |
| C ucumer afininus | 372 | L apatium | 167 |
| D | | L appa maior | 355 |
| D ragagantum | 224 | L appa minor | 365 |
| E | | L aureola | 368 |
| E nula campana | 28 | L enticula aquæ | 347 |
| E upatoriū vulgatum | 298 | L ilium conuallium | 346 |
| F | | L inaria | 366 |
| F aba inuerfa | 210 | L ingua hircina | 316 |
| F ilipendula | 284 | L iquiritia | 216 |
| F lammula | 308 | M | |
| F umus terræ | 355 | M aluauifcus | 297 |
| G | | M alum granatū | 93 |
| G allitrichum | 288 | M affix | 61 |
| G enifta | 378 | M atricaria | 293 |
| H | | M atrifylua | 311 |
| H edera terrefttris | 361 | M eliffa | 276 |
| H epatica | 325 | M ezereon | 389 |
| H erba Iudaica | 318 | M ilium folis | 295 |
| H erba Simeonis | 298 | M illefolium | 352 |
| H erba tetrahil | 318 | M orſus gallinæ | 347 |
| | | N | |

INDEX.

| | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------|-----|
| N | | | |
| N | Asturtium aquati- | Scariola | 177 |
| | cum 175 | Scrofularia minor | 208 |
| | Nenuphar 289 | Sicla | 172 |
| O | | Sigillum Salomonis | 307 |
| | O Robus 163 | Siler montanum | 247 |
| P | | Solatrum | 336 |
| | Papauer cornutum 333 | Sparagus | 173 |
| | Papauer rubrum 330 | Spelta | 155 |
| | Parietaria 346 | Squilla | 200 |
| | Perforata 300 | Squinantum | 21 |
| | Perficaria 286 | Stichas Arabica | 230 |
| | Pes columbinus 283 | Stoechas citrina | 327 |
| | Petroselinum 253 | Sumach | 91 |
| | Piperitis 203 | T | |
| | Plantago aquatica 299 | T Amariscus | 75 |
| | Polytrichon 365 | T Tapsus barbatus | 353 |
| | Prasimum foetidum 276 | Terpentina | 62 |
| | Pulicaria 284 | V | |
| R | | V Ermicularis | 348 |
| | R Esta bouis 223 | V Vicia syluestris | 184 |
| | R Reuponticum 216 | Vincamperuinca | 307 |
| | Rostrum porcinum 177 | Virga pastoris | 220 |
| | Rubia tinctorum 296 | Vngula caballina. | 281 |
| S | | FINIS. | |
| | S Aponaria 199 | | |
| | S Satyrion 287 | | |

E P I T A P H I V M

Ioannis Ruellij, Dionysio

*Corronio au-
thore.*

Hic situs est, in quo vixit medicina, Ruellus:

In quo natura notitia, atque poli.

In quo prima fuit dos, Graium vertere scripta

In Latium, ac Latio scribere digna Ioue.

Olim erat affinis, nunc est communis deorum,

Praemiaq; illa sui grata laboris habet

NAENIA IN OBITU
RUELLII.

Cesserat è viuis ad celsa Ruellius astra,
Constitit atq; alti clarus in arce patris.
Cum perisſe hominē rata Mors, ait, Ecce triūphe
Clamet io, cui cui victima grata cadit.
Vicimus, en nostras toties qui eluserat artes,
Qui toties mortem vicerat, interijt.
Aſt ubi in ore virū verſari auditq; videtq;
Hunc magis atq; magis viuere, victa fremit.
Cui Pea, quibus ortus erat mihi redditur aſtris,
Quemq; putas victum, bina trophæa refert.
Prima, quod olim animas mille atro depulit orco:
Altera, quod moriens nunc quoq; mille rapit:
Nempe Dioſcoride Romana per oppida ducto,
Cui toga, cui potior lingua Latina, ſua eſt.
Cætera quid memorem victuri ſcripta laboris,
Naturam & ſtirpes, pharmacq; omne genus?
Non villas, nec equos, nec curam diuitis agri,
Nullaq; vitæ hominis commoda præterijt,
Quæ non tractarit, ſapientibus edita Grays,
Quæ non reddiderit, vel meliora ſuis.
Utq; mage inuideas, dicam amplius, edidit annus
A mille hand quiſquam tanti opus ingenij.

FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS


A N A Z A R B E I, D E

Medicinali materia, libri

primi præfatio,

Ioanne R V E L L I O Sueſſionenſi

interprete.



Vanquam amicissime Aree, com-
plures non veterum modo, sed
recentiorum quoque, de medi-
camentorum compositione, viris
bus, atque probatione commenta-
ti sunt: nobis tamen nec vanum, nec à ratione ab-
horretum impetum animi ad hoc opus incessisse,
tibi ostendere temabimus: quòd eorum nonnulli
absolutum nihil ediderunt, alij quàm plurima,
quæ auditu percunctando didicerant, scriptis tra-
diderunt. Siquidem Bithynus Iobus & Heracli-
des Tarentinus, omiſſa prorsus herbarum tra-
ctatione, rem sanè quàm paucis perſtrinxerunt.
Neque verò omnes illi de metallicis quicquã re-
bus aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Cra-
teus autem herbarius, & Andreas medicus,
qui cæteris diligentius hac in parte versati viden-
tur, radices multas apprimè vtileis, herbasq;
banc quaquam adnotatas, reliquerunt. Veruntamen

mcid

men priscorum subscribere oportet sententias quos,
 etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam ta-
 men impendisse diligentiam constat. Iunioribus
 minus assentiendum: è quibus Iulius Bassus,
 & Niceratus, & Petronius Niger, & Diodo-
 tus, Asclepiada omnes, medicinalem materiam
 vermaculam cognitamque; vulgò, dignam censue-
 runt, quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: &
 vi medicamentorum vires probationesque cursim
 complexi, sic nullo experimento eorum esse-
 ctus colligentes, inani verò reddendarum cau-
 sarum studio verba fundentes, alia pro aliis scri-
 ptitando, rem in acervum congeriemque; contro-
 versiarum extulerunt. Siquidem, qui inter eos
 egregius habetur Niger, euphorbium, nascenti-
 us in Italia, chameleæ succum esse contendit:
 androsemonque; eandem herbam cum hyperico esse.
 quinetiam aloën in Iudæa fossilem nasci, & ple-
 raque hæc similia exponit, reclamante evidentia,
 quæ prorsus veritati refragantur. Quibus con-
 iectura colligi potest, ea non oculata fide, sed nar-
 ratione potius ab alijs accepisse. In ordine idem
 ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes nul-
 laque cognatione coniunctas vires collidentes: par-
 tim per elementa literarum scripta in ordinem di-
 gerentes, quò facilius memorie mandarentur, ge-
 nera & eorum effectus à sua cognatione disiu-
 gentes. Nos verò ab iuventute, ut ita dicam, iuven-
 ta, iugi desiderio cognoscendæ materie allecti,
 permul

Dioscori-
 dis cogno-
 scendorum
 simpliciū
 studium.

per multis regionibus peragratus (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus: quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excoltos, tum verò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiaris. Enimvero non parum præbet tæe probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unâ nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter vos beneuolentiam emulatione dignam intueremur. Admonitum autem te velim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima visus ipsi exactissimè cognouimus: quedam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit historia, percunctationeq; rerum apud singulos vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operâ, vt differenti ab alijs ordine tradito, genera medicinarum viresq; describantur. Quod autem necessaria sit medicamentorû ratio, nemo est fermè qui ignoret. quòd ea & toti arti coniuncta sit, vniuersisq; eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atque misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incre-

A

mentum capeſſere poteſt, quàm plurimum confe-
rente ſingulorum medicaminũ cognitione. Quin-
etiam vernaculam familiaremq; materiam com-
plectemur, ut perfectã ſit quæ à nobis relinquetur
doctrina. Verum in primis curã impendere oportet,
ut ſuis temporibus ſingula & demetantur &
recondantur. certè pro horum ratione aut valent
viribus, aut euanido nulloq; munere funguntur.
Serena igitur cœli conſtitutione demetenda ſunt.
Magni ſiquidem refert inter colligendum, ſi vel
ſqualores vel imbres infeſti ſint: quemadmodum
ſi loca, in quibus prodeunt, cluſa, & ventis ex-
poſita ſint & perflata, frigidaq; & aquis caren-
tia: in his enim locis vires eorum longè validio-
res intelliguntur. Contrà, quæ in campeſtribus,
riguis, & opacis, cæterisq; locis à vento ſilenti-
bus enaſcuntur, plerumque degenerant, & minus
viribus valent: multoq; magis, ſi non ſuo tempore
nec opportunè colligantur, aut ſi per imbecillita-
tem intabuerint. Neque ignorandum, ſæpe pro pe-
culiari loci natura, aut anni clementia, matu-
rius aut ſerius adleſcere. Nonnulla propria vi,
hyeme florent & folia pariunt: quedam bis an-

Plantæ, ut no florifera. Quare cui in animo eſt horum pe-
exacide co- ritiam aſſequi, neceſſe eſt eum prima germina-
gnoscant, tione ſolo emergentibus, adultis & ſeneſcentibus
omni tem- adeſſe. Nam qui pullulanti herbæ duntaxat ad-
pore inſpi ſtiterit, adultam cognoscere non poteſt: neque qui
ciendæ. adultam tantum inſpexerit, imper erumpentem
noſ

misceat. Quo sit, ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quae causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramen, quinquefolium, & tusiliginem emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui saepius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis educare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quae verò fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, seriphium, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine pregnantia demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidant. fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccari coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primis cauliculis. Lac & lacryma excipiatur, inciso per summum adolescentiae vigorem caule. Radices, & linguamentata, corticesve ut recondantur, eximere conuenit cum herbae suis folijs exiuntur. Siccantur etiam expurgatae inibi, locus asperginem non redolentibus: sed quae luto aut puluere sunt obsitae, aqua elui debent. Flores & omnia quae iucundum

odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obduc-
tis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs se-
mina, ut pereurent, aptè involuuntur. Liquidis
medicaminibus densior materia, argentea, vitrea,
aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara
non sit, accommodatur: & lignea, praesertim è bu-
xo: sed aenea vasa ocularijs medicamentis liqui-
disq; & omnibus ijs quae aceto, pice liquida, aut
cedria compinguntur. Adipem autem & medullis
stagnans vasis recondi conuenit.

Iris.

CAP.

I.



R I S à caelestis arcus simili-
tudine nomen accepit. Folia fert
gladioli, sed maiora, latiora,
& pinguiora. Flores in caule
equalibus inter se spatijs di-

stant, incurui, varij: siquidem candidi, pal-

* *μυλινά*, lentes, * lutei, purpurei, aut caerulei conspiciun-
t^{ur} *μυλινά* = tur: quae diuersi coloris specie, quaedam caelestis
v^a.

arcus imago representari videtur. Radices subia

* *σπυαί*, id cent geniculatae, * durae, odoratae: quae frustatim
est, solidae. dissectae, in umbra siccantur, & traiectae lino re-

* *Τῆ γόβο* conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: &

* *πυρωτίγα*, inter has laudatissima, quae pumila serè & den-
id est, gu- sa constat radice, frangenti contumax, subrufo
stu feruent colore, * gustu amaro, odore perquam sincero, ita
tiore.

ut nullum prorsus situm redoleat: quae dum timi-
ditur, sternutamenta mouet. Secundum locum ha-

bet

bet Africana, candicans, gustuq; amara. Teredines in vetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent. Vis omnibus excelsa factoria, extenuas, contra tussim efficax: humorum qui aegre reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epota purgant, somnum conciliant, lacrymas ciunt, tormentibus medentur. Eadem pota ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit: menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum, foeminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis venarum spiracula, ischiadicis infunditur, fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; vlcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat: pestis, malagmati, & acopis inseruntur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

ANNOTATIO.

Censetur Galāga officinarum. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturā obtinet, quam vulgus herbariorum hoc nomine solet indicare.

Acorum. CAP. II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cepite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: lienem absumit, urinæ stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur, oculorum caligines succo discutit, anidotis radice

* Plinius magno usu commiscetur.

Meum. CAP. III.

Meon, quod Athamanticum vocant, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, * anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excelsacientibus. Quæ feruesfactæ ex aqua, vel tritæ citra coctionem, præclusorum renu vesicæque; factæ vitia potu leniunt; urinæ difficultati medentur, stomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectæ vuluæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur, sanguinem

per

per mēstrua pellunt, defensionibus feruefacta: infantibus autem illis imo ventri, vrinis mouent: quod si plus quā debeat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

Cypirus.

CAP. II II.

Cypirus, quem aliqui erysisceptrum, vt aspalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiore, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoruntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter se, oleis oblongis similes: aut rotundae, nigro colore, suauis odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur. Optima est grauiissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quae à Cycladibus insulis petitur. Huic calidi vis inest. Venarum spiracula laxat, vrinam ciet, ad calculos aquamq; subter cutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est, perfrictionibus vuluae & praecusionibus fotu prodest, pellit menses. Contra vlceris etiam si depascent vorentq;, farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & vnguentorum spissamentis benè adycci solet. Aliud cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci vim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum praesentem psilothrō vim exhibet.

Cardamomum.

CAP. V.

Cardamomum optimum est, quod ex Coma-
gene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur: in In-
dia quoque, & Arabia prouenit. Eligi debet ple-
num, frangenti contumax, occlusum, sarctumq;
(quod enim huiusmodi non est, exoletum indica-
tur) & gustu acre, subamarum, & odore caput
tentans. Excalfactoriam vim habet, potumq; ex
aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, ner-
uorum resolutionem. Item ad rupta, vulsa, tormi-
na: latas ventris tineas excutit. Ex vino autem
potu, remibus, difficultati vrinae, a scorpione iclis,
neque non omnibus venenum vibrantibus, auxi-
lio est. Cum cortice radicis lauri epota drachma
calculos cominuit, partus suffitu enecat, scabiem
ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spif-
samenta additur.

Nardum.

CAP. VI.

Duo nardi genera: unum Indicum, alterum
Syriacum appellatur, non quod in Syria
proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars
vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex
hoc Syriaci genere praecipuum est recens & leue,
largam gerens comam, flauum colore, perquam
odoratu, ac cyperum redolens, breui spica, ama-
ro sapore, linguam siccante, quod diu in sua odo-
ris gratia permaneat. Ex Indicis autem nar-
dum quoddam Gangitis vocatur, a flumio Gange,
apud quem enascitur, montem praeterfluente: quod
gen

genus ob multam loci, in quo prodit, viginem, viribus infirmius est, atque procerius adolescit plures ferens spicas ab vnica radice comosus, unaq; conuolutas, ac grauitersolentes. Montanum autem odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum virus supra modum redolente: quod improbat. Madefactum vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, * nulloq; * *ἡγεῖ μὲν* puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua aut *ἐχειρ τὸν* palmeo vino, inspissationis ponderisq; causa inspi *χνοῦν*, idrato. Intueri autem oportet si lutum radicibus inest, et quod sideat, & incerniculo puluerem excutere, eluennatiua cadis manibus vtilem. Vim habent excalfactoriam, reat lanu & exiccantem. Vrinam movent, aluum potu si gine. stunt, vuluæ profluvia, sanienq; apposita supprimunt. Nauseæ ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rosionibus, inflationi, iocineri, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incoctæ fotu ad insecsum, vuluæ inflammationibus medentur: ad glabras oculorum genas valent: siquidem eas ad densiorem pilum reduciunt. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in sicili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nardum Celticum. CAP. VII.

Hirculus
herba.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluunca patrio nomine appellatum, prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: unde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempla terra paulo solo atque humenti subiecta charta reponere, post tridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso alie noq; propter humoris vim, non excutitur. Adulte-
ratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanq; herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, uti verum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadē, quæ Syriacum pollet: sed vehementius urinam cit, & stomecho uilius est. Inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Mon

Montanum nardum. CAP. VIII.

Montanum nardū, quod ab aliquibus thy-
 lacitus, & nirus appellatur, in Cilicia, &
 Syria nascitur, surculo & solijs eryngio simili-
 bus, minoribus, minimè tamen spinosis, aspe-
 rusq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, ni-
 gris, odoratis, ceu hastule regie, sed longè gra-
 cilioribus, & longè minoribus. Neque caulem,
 neque fructum, neque florem profert. Ad eadem
 ad quæ Celticum efficax.

ANNOTATIO.

*Minoribus.] Fuchsius in opere de Stirp.
 maioribus legendum suspicatur. Plinius, qui
 hinc omnia mutuatus est, mollioribus ha-
 bet: quod sanè vtrunque herbæ, quàm aptis-
 simè quadrat.

*Cytino hyoscyami.] Id est, flori hyoscy-
 ami, qui veri cytini, quem domesticæ punicæ
 florem esse nouimus, aliquam exprimit effi-
 giem, vt in eius descriptione author Dio-
 scorides.

Asarum.

CAP. IX.

Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre
 nardum appellant, hederæ folijs * minori-
 bus multò, rotundioribusq;, floribus * cytino hyo-
 scyami similibus, purpureis, inter folia proxime
 radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen
 acinosum. [Cauliculos habet angulifos, asperos, Deest in
 & molles] radices numerosas, geniculatas, te- Græco.
 nues,

nues, obliquas, gramine non dissimiles, longè
tamen graciliores: odoratas, excalfacientes, &
que linguam vehementer mordent. Excalsa-
etoriam vim habet: urinam cit, hydropicus &
vetusto coxendicum dolori prodest. Radices
seus drachmis ex aqua mulsæ potæ, menses tra-
hant, & veratri albi modo purgant. In vnguenta
additur. Umbrosis montibus provenit, sed plu-
rimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italia In-
stinienfi agro.

ANNOTATIO.

* Maioribus] Rectius fortè minoribus le-
gas, vt Ruellius quoque monuit. Flores si-
quidem Valerianæ nunc dictæ, quam Phu
essè omnes ferè suspicantur, Narcissum effi-
gie expressissimè quidem referunt, eo tamen
longè sunt minores: ni fortè soli diuersitati
id imputandum censeas.

Phu.

CAP. X.

* hippose-
lini. **P**Hu, quod & aliqui syluestre nardum appel-
lant, nascitur in Ponto, folio * olusatris, aut
elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui, cauo,
melli, in purpuram vergente, geniculis interce-
pto, floribus narcisso proximis, * maioribus, tene-
rioribus, & ex albicante purpureis: radice supe-
rius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo
villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum:
capillamentis inuicem contextis, flauescentibus,
odoratis, cum quadam odoris granitate nardum
emul

amulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest. ad lateris etiā dolorem efficax, menses cit, antidotus inferitur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hac dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum.

CAP. XI.

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris congnatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum plu, asarum, niris. secus autem res se habet. Namque malabathrum folium sui generis est, quod Indice gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstius feruore aquis, humum aridis fruticibus vri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in sua vi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirnum verò & minutim contusum, præsertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Easdem nardo sortitur vires, sed efficacius omnia præstat. Urinam vehemētius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritū & in vino feruefactū commodè illinitur: subditū linguæ, oris halitū & suauitatē commendat. Vestium quoque odorem interposituna

scs

seruat, & ab erosione tuetur.

ANNOTATIO.

Officinis falsò Cinnamomum hodie dicitur. Est enim earum Cassia, non quam hic Dioscorides, cui, sicut & aliis veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro de Composit. medic. depinxit.

Cassia.

CAP. XII.

Cassia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fulvescens, pulchri coloris, coralli æmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens
 * μῆλα πικρὰ & * cum aliquanto ferore astringens, aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis, Añs. i. cum multo. achy appellatur, ab Alexandriæ negotiatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Museletico blasto, id est germini, cognomen est. Reliquæ
 * Græcus viles, & quæ * aphemum dicitur, nigra, in-
 * αψυφhemon suavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca, & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocassia, quàm ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, herentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quedam fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans,
 sca

scabra, hircinum virus redolens, & quæ tenui fistula, & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad maculagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, cōtra viperarum ictus pota auxiliatur, aduersus intestinas inflammationes omnes & renum uitia, pota proficit. Fœminis in folio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilatationē vuluæ. Ea duplo pōdere medicamētis mixta, cinnamomi vicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquā uilis.

Cinnamomum.

CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti nomen est, aliāquam reseat effigiem. Sed in eo genere recās, nigrum, ex vinoso in cinereum vergens, leue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquā iucunde olens. Optimi ferè indicium, iucundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione quidamtenus salsum, quod nō citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, vellito ab radice stirculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscel-

lancæ

lancea quædam esse videntur. Quæ autem melius
 spirant, suo halitu cum nares primum consulun-
 tur, olfactum expleant, deterius dignotione im-
 pediunt. Est etiam montanum, crassum, pumi-
 lum, fulvescens admodum. Tertium à Mosyliti-
 co, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum,
 paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fune-
 gosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac fri-
 abile, magnam habens radicem, quæ cassiam pla-
 nè repræsentat. Quintum genus, odore nares fe-
 riens, subrusum, & cortice fulvæ cassiæ simile,
 tangenti firmum, minus nervosum, densa radice
 firmatum. Is quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amo-
 mi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deli-
 gito scabrum, album, rugosum : at læue, & ligno-
 sum circa radicem, ut inutile reijcito. Est etiam
 num simile aliud, cui pseudocinnamomo cogno-
 men est, vile, inualidi odoris, solutarumq; virium.
 Vocatur etiam Zingiber, cum tamen sit xylocin-
 namomum, præbēs quandam cinnamomi faciem.
 Est autem lignosum cinnamomum, sarmenta lon-
 ga robustaq; ferens, odore longè cinnamomo in-
 feriore. Sunt qui xylocinnamomum, à cinnamo-
 mo genere differre dicūt, quòd à natura eius ab-
 horreat. Cinnamomum omne excalfacit, emollit,
 & cōcoquit, urinam ciet : tam menses, quàm par-
 tus potum aut ex myrrha impositum pellit, con-
 tra bestias, quæ virus ei aculantur, venenaq; con-
 uenit : caliginem pupillis oculorum obuersantem
 discut

discutit, crassitiem extenuat, lentigines, & vitia
culis in facie ex melle illitum detergit: contra
tusses, defluxiones, aquam subter cutem fusam,
renum vitia, & vrinae difficultatem efficax est,
unguentis pretiosis inseri solet: & in summa, ma-
gni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, um-
braq; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

[Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui Desunt in
pseudocinnamomum appellant, perquam denso Græco.
atq; crasso sarmento, longè tamen inualidius cin-
namomo, & odore, & gustu.]

Amomum.

CAP. XIII.

A Momum exigue fruticat, ex ligno se con-
uoluens in racemi modum, flore, ceu candi-
da violæ, paruo: solijs * vitis albæ similibus. * bryoniæ.
Laudatur, quàm maximè Armeniacum * fuluo * χρυσίζον
auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medi- τῆς χροῶς, id
cum, quoniam in campestribus, & aquosis ena- est, colore
scitur, infirmius esse constat. Est autem ma- aurum ini-
gnum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, tans.
odore origani. Ponticum verò subrufum, par-
uum, fragile, racemosum, fructu turgens, & odo-
re nares feriens. Deligito recens, candidum vel
subrubrum, quod nec astrictum cohereat, nec
conuoluatur, sed solum diffundatur: seminis ple-
num, viuis paruis simile, graue, valde odoratum,
modò cariem non contraxerit, acre, gustu mor-
dens, simplici colore non euariante. Vim habet
calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum al-

B

licit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes, & meliceridis concoquit, discutitq;: inuat quos scorpium percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert, inflammationes oculorum, viscerumq; lenit ex vna passa, ad vuluarum vitia in pessis, aut in seffionibus vile est. Decoctum iocineri, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotus immiscetur, & pretiosissimis unguentis. Adulteratur amomum herba simili, quæ amomus vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia, flore origani. Quare in huiusce modi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice integros surculos emittunt.

Costus.

CAP. XV.

Precellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, levis, vber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, gravis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei excalfactoria, vrinā ciet, menses pellit, vitis quæ vuluam malè habent, tam impositu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat, latas ventris teneas ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium

brium accessiones, & nervorum resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admistis helenij comageni præduris radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est: siquidem neq; gustu fernet helenium, neque validum odorem vibrat, ut caput tentare possit.

Odoratus iuncus.

CAP. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa & Arabia ut Officinis scitur. Laudatissimus ex Nabathæa: prosequantissimus Arabicus, quem aliqui Babylomum cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rose odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim urinae ciunda habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcien-
tibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum, miscetur antidotis. Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desiderium fetus, utile est.

Calamus odoratus.

CAP. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur: melior est fulvus, dense geniculatus, & qui

assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentius in mandendo, & astringēs, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Vrinam potu ciet: quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subter cutem fuisse morbo, renum vitijs, stillicidio vrine, ruptusq; commodè bibitur: menses & potu & appositu pellit. tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagma- tusq; odoris gratia commiscetur.

Balsamum.

CAP. XVIII.

* Marcel-
lo locus
hic suspe-
ctus.

Balsamum, arbor * albæ violæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine conspicitur. Folium rutæ proximum: longè candidius, perpetuò virens: in Iudea solum quadam valle & Aegypto nascens. Ius differens modis: scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum vocant, quasi demessile: fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aestiuus sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem Opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillat, ut annis singulis, ne plures quidem quam seni septemve congij cogantur, imbiq; pondus duplo rependitur argento. Succus probatio est, ut sit recens, validi odoris, sincerus, non ad acorem vergens, dilui facilis, levis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè vitiatur, misto ubi aliq

aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item jussino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficium facile deprehenditur. Nanque merus in laneam vestem fusus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: vitiatum autem inheret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrime liquatur, coloreque lactescit: vitiatum vero olei modo innatat, se convoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorque redditur. Halucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant, probatur reces, sarmento tenui, fulvum, odoratum, quadamtenus opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus, quare eligatur flavum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modice opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignavia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & quammaxime calfaciens: abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt, medetur perfrictionibus vulvae cum rosaceo cerato appositus: menses quoque, secundas & partus extrahit, horrores illius discutit, ulcera sordida expurgat & cruda concoquit, vrienam potu ciet, agre spirantibus prodest: datur

in lacte contra aconitū haustum, aut serpentium
ictus: miscetur acopis, malagmatis, & antidotis.
In summa, praecipua auctoritas succo, secunda se-
mini, minima ligno. Semen commodè potui datur
doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, schiadi-
cis, comitialibus, vertiginosis, orthopneicis, urinae
difficultati, torminibus ac serpentum moribus:
ad muliebres suffitus perquam utile est: vulnam
aperit in defectionibus balnearum decoctum, &
humorem euocat. Lignum easdem habet vires,
aliquanto minores. Ex aqua potum cruditatibus,
torminosis, vulsis, venenatorum ictibus opitula-
tur, urinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Iri
conuenit, squammas ossium extrahit, & ad un-
guentorum spissamenta additur.

Aspalathus.

CAP. XIX.

** Ευκώδης* **A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est
** surculosus*, multis spinis horrens, nasci-
tur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum in-
sulis: quo ad unguentorum spissamenta pigmen-
tarū utuntur. Optimus est gravis, detracto cor-
tice rubens, aut in purpuram vergens, densus, odo-
ratus, gustatu amarus. Est & alterum genus
candidum, lignosum, sine odore: quod deterius ha-
betur. Vim calfaciendi cum astringitione obtinet.
unde decoctum cum vino ad tetra oris ulcera col-
luenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordi-
da ulcera infunditur: subiectum in pessore, partum
extrahit, alium sistit eius decoctum: & sangui-

1115

nis reiectionem potu colibet, urine difficultatem inflationesq; discutit.

Muscus.

CAP. XX.

BRyon, id est muscus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum, proximum populneum: in quo genere candidum & odoratus præstat, nigricans improbatur. Astringendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Agallochum.

CAP. XXI.

AGallochum, lignum est quod ex India atque Arabia deportatur, thuiæ ligno simile, gnũ aloës maculatũ, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantulum versicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori inspersum: pro thure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ unus pondere, humida stomachi vitia, & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iocinerisve dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum.

CAP. XXII.

NArcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomori libro: quod incidi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis com-

positus: constrictionibus vulvae suffitus prodest.

Cancamum.

CAP. XXIII.

Videtur **C**ancamum Arabici ligni lacryma est, myrrhæ quodammodo similis, virosi gustus. Lacca officinarum. quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, additis styrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur, lienosis datur, comitialibus, & suspensoriosis: menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat, vino madefactum medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gingivæ humore prægnantes, doloresque dentium, non aliud efficacius.

Cyphi.

CAP. XXIII.

Cyphi odorati suffimenti compositio est, dicta dÿs, qua abundè Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet, suspensoriosis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iunperi adultæ modo: ruæ passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duodecim: resine repurgatæ minas quinque: calamæ & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duodecim: vini veteris sextarios novem, cum duabus mellis minis: ruam passam detractis vinaceis tusam, cum vino & myrrhæ subigito: cætera tusa & cribrata adycito, die uno humorem conbibere finito, dein mel coquito donec

dum sibi glutinis asciscat crassitudinē, eliquatam resnam accuratē permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

CROCUM. CAP. XXV.

CRocum, optimum in medendi vsu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum à quo detractum est nihil, quod madefactum manus insicit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre: sin huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenicum & Centuripinum inter Sicilicæ omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleacea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris recensitatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immixto crocomagmate tuso, atque etiam sapisublitu: contrita, quò pòdus adijciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine: sed maleficium declarat insidens pulvis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet: vriam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passo

biberint, crapulam non sentiēt: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vuluæ etiam sedisq; cataplasmata, vtiliter induitur: vencrem stimulat, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, Auricularijs collationibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix ex passo pta. Fit etiam expressis riuuenti crocini odoramentus, & in formis digestis, quod crocomagma vocant. Optimū est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni expers, leue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehe-

* Rectius menter dentes ac linguam insicit, * multis durans annus, quale est quod à Syria deferitur. Habet aliquot horas permanente colore. suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersant: urinam cit, calfacit, concoquit, & emolli. vires croci proportionem quadamtenus representat, quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

Vulgò Elenium.
la cāpana.

Helenium. CAP. XXVI.

* ἐν ὁρῶν
τοῖς, καὶ
σπίοις,
est, in mon-
tosia ac opa
en.

Helenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emitit: radicem subalbidam, intermixtam, id dum subrusam, odoratam, subacrem, vegetam, ma- gnam, ex qua agnatæ propagines liliorū aut aristosis ac opa modo seruntur. * Montibus in vmbrosis, siccoq; solo provenit. Foditur æstate radix, particula- timq;

timq; dissecta siccatur. Potum radice decoctum
 menses & vrinas ciet. ipsaq; in eclegmate ex mel
 le prodest iusti, orthopnoe, ruptis, conuulsis, in=
 flationibus, & serpentium moribus. In summa
 excalfaciens. Folia ex vino cocta vtiliter ischia=
 dicis illinuntur. **Helenium** stomacho vtile in pas=
 so conditum: siquidem saig amarj paululum sic=
 catam radicem, mox decoctam, & frigida aqua
 madefactam, in sapam conijciunt, & ad vsus re=
 condunt. Trita potaq; ad cruentas excreationes
 efficax est. Alterum helenij genus in Aegypto gi=
 gni Cratenis tradit: herba est cubitalibus ramu=
 lus, serpilli modo per humum repentibus, solijs len=
 ticule circa ramos, sed longioribus crebrisq; radi=
 ce pallida, digiti minoris crassitudine, per ima te=
 nu, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in
 maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota,
 contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum oleumq;. CAP. XXVII.

Oleum quod ex immaturis oliuis exprimi=
 tur, ad multos vsus rectè valentibus accom=
 modatissimum: omphacinum id appellatur. Præ=
 stat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale
 vnguentorum compositionibus idoneum intelligi=
 tur. Stomacho vtile est quòd astringat: gingi=
 uas contrahit, dentes firmat, si cõtineatur in ore,
 sudores cohibet, & quò vetustius ac pinguius, eò
 ad medicamenta aptius est. Et (vt reliqua in com=
 mune dicantur) omne oleum calfacit, emollit ven=
 trem,

trem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; promptius ad obeūda munera reddit, alium emoluit, vlcérantium venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur, assidue potum redditumq; vomitionibus, soluit alium hemina mensura cum pari ptisanæ succo aut aqua potius, ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur, ventris animalia pellit, idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si vetustas non sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut vetustatem representet.

Oleum sylvestris Oliuæ.

C A P. XXVIII.

Oleum quod sylvestres oliuæ fundunt, vehementer astringit, & ad sanorum vsus secundum sibi locū vendicat. In doloribus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, furfures, vlcera capitis manantia, scabiem, leprasq; abstergit: tardius curationem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Albū colore, nec anniculo vetustius, in novum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaq; die concha refunditur: ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agitatum respumet: octaua die fœnum gracū mundū quinquaginta denariorū pondere, calida aqua madefact

factum donec emollescat, in supradictū oleū deij-
citur, ita ne extillet aqua: postea tēda præpinguis
piceæ, assulatim casæ æquale pondus adijciunt, &
transactis octo diebus, oleū concha mouetur. Vbi
candorem cōtraxerit, in vas nouum vetere vino
affusum recōdi debet, substratis sertulæ Campa-
næ corollis drachmas undecim pendentibus, cum
pari iridis pōdere: sin minus, rursus soli mandan-
dum, & idē munus obeundū, vsq; dum inalbescat.

Sicyonium. CAP. XXIX.

Sicyoniū componēdi ratio hæc est: In lebetem
oris lati stanno inductum, funditur olei al-
bi quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius vnus,
aquæ semicongius: leui id igne coquitur, leuiter
mouendo: at vbi bis efferbuit, & subtracto igne
refrixit, innatans oleum concha decapulatur, &
adiecta noua aqua conseruescit, & reliquis vt di-
ximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime
fieri consuevit, Sicyoniū inde accepto cognomine.
Calfactoriam ad quendam vsque modum vim ha-
bet. Febri ac neruorum vitijs prodest. fœminæ ad
commendandum faciei nitorem eo vtuntur.

Strigmenta balnearum. CAP. XXX.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, di-
scutiunt: ad sedis rimas & condylomata illi-
nuntur. Illa verò quæ ex palæstris puluerem sibi
asciuerūt, in sordis speciem redacta, articulorum
nodos imposita adiuvāt: ischiadicis in fœtus aut
malagmatis locum, calida commodè sufficiuntur.

Der

Deraſe gymnaſtorum parietibus ſimulacrisq; ſordes, calfaciunt: tubercula, quæ ægrè ad coctionem perducuntur, diſſipant: deſquamatis & vlceribus ſenum profunt.

Elæomeli. CAP. XXXI.

IN Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, oleum melle craſſius, ſapore dolci. Bilem, cruditatesq; detrahit, ſextario cum una aquæ hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcunt & viribus deſciuntur: quod minime vereri oportet, verùm crebro excitare, ne veterino preſſi ſomnos capteant. Fit & oleum è pinguitudine ſurculorum oleæ optimum vetus, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimq; caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

Cicinum oleum. CAP. XXXII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini qua voles quãtitate torrido ſole flaceſcunt, & vuarum more inſtrati tantisper inſolantur, dum veſtiës cortex fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: poſtea in lebetem ſtanno illito, qui aquam habeat, demittitur, ſubiecctoq; igni ferueſcunt: & ubi inſitum prorsus humorem reddiderunt, ſublato ab igni vaſe, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit uſus, longè ſecus fieri ſolet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accuratè molitos per ſpore

sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum cōtinentibus orbiculis exuntur. Ad psoras, & vlcera capitis manantia valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis atque præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum, potu aquam aluo extrahit, ventris animalia pellit.

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopium vocant, hoc sit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offis, aquæ quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitus hæsit, concha excipitur. Pressus nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus proseguendum. Singulis heminas reddunt singuli modij. Contra vuluarum dolores, strangu-latus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: vitij remum, calculosis, difficili vrine, suspiciosi, liensisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; disciuit: maculas & vitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lily & Cypria cera aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat, vlcera capitis manantia & fures cum vino abstergit.

Bal

Balanium. CAP. XXXIII.

Simili modo fit balanium oleum, quod repur-
gat maculas, lentigines, varos, & cicatrices
nigras. Alium soluit, stomacho aduersatur, cōtra
auriū dolorē, sonos, & tinnitus auxilio est, cum
anserino adipe instillatū. Similis sesamini ratio.
Fit etiam ē nuce iuglande oleum, quod caryinum
vocant. Eandem vim habet quam Balanium.

Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

Hyoscyaminum sic fit: Semen cādidum, re-
cens ac siccum tunditur, & calida asper-
gitur aqua, vt in amygdalino diximus. dumq; in-
solatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cum
reliqua massa permisceantur: hoc in ante fieri opor-
tet dum nigrescat & grauiter oleat: mox pres-
sum atq; excolatum reconditur. Ad aurium do-
lores efficax est, pēssis miscetur, ad emolliendum
utile. Fit & ē grano gnidio purgato & tuso. Vis
ei alium soluere potu. Non secus cnicinum oleum
temperatur: cui facultas eadem est quæ factō
ē gnidio grano, verum inualidior. Rhapsaninum
e raphani semine fieri solet, ceterorum more.
Phthiriasis mala valetudine contractas tollit, sca-
britias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtun-
tur Aegyptij. Melanthinum idem quod rapha-
ninum potest. Trilum sinapis semen, & calida
aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimi-
tur. Id ad diuturnos dolores efficax est, transfert
humorēs qui in aliqua parte concreuerunt.

Myr

Myrteum.

CAP. XXXVI.

Myrtei faciendi ratio hæc est. E Myrte nigra sylvestri, aut sativa, foliorum mollissima queque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt donec concoquantur, immatans oleum deraditur. Sed longè facilior hæc compositio: Tenera folia cõtusa coquuntur in oleo & aqua, & quod immatat eximitur. Præuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum inspissant malicorio, cupresso, cypiro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum. Astringit & indurat, ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt: prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudores compefcit, & omnia quæ astrictionem inspissationemq; desiderant.

Laurinum.

CAP. XXXVII.

Laurnum fit hoc modo: Lauri bæccæ cum maturæ sũnt, in aqua coquuntur: siquidem ex oblueto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta cõcha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypiro, iunco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquunt alij etiam bæccas, donec oleum odorem contraxerit. alij styracem & myrtum addunt.

C.

Optima laurus ad id latifolia & mōtana. Oleum laurinum vtilius quò recentius, quòque viridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excalfactoria, emolliens: venarum spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus nervorum vitijs, algoribus, distillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum non aliud iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

Similis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factus prius spissamentis, ut in laurino diximus. Hoc scabiē iumentorum canūq; sanat: vtilissimum pectus, acceps, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

Mastichinum è trita sit mastiche, quod contra omnia vulnē mala eff. cax est: mediocriter calfacit, astringit, & emolliit. Adversus prominentes stomachi duritias, celiacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum compositio. CAP. XL.

DE ratione vnguentorum consequenter tractandum existimauius, quandoquidē ea in nonnullis corporū vitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt. in quorum probationibus cōsule

re

renares oportet, an ea oleāt ex quibus tēperan-
tur. Optimum huiusmodi iudiciū, quod in qu-
busdam planè obseruari nō potest, propter ea quæ
admiscētur odore cæteris præualentia: vt in ama-
racino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cre-
bra circa hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum.

CAP. XLI.

Rosaceum sic fit: Iunci odorati quinque li-
bras & bessēm tundito, & subactis aqua
in viginti olei libris & quincūce subinde mouen-
do, coquito: dumq; percolaueris, in olei libras vi-
ginti & quincuncem, adycito rosas non madesa-
ctas numero mille, & manibus melle perunctis
identidem moueto, interdū premens, finito no-
cte tota macerari, postea exprimito: & vbi re-
cremētum pessum terit, mutato vase, in craterem
melle illitum recondito. Cæterum rosas quæ an-
tea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affu-
sis octo libris & quadrante spissati olei, iterum
premito, eritq; secundarium oleum. Quod si ter-
tias vsq; quartasve perfusiones infundens expri-
mere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quar-
tarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa
melle oblini debent. Si verò secundam infusio-
nem instituire libet, in expressum oleum, numero
pari recentes rosas, nullo humore imbutas inyc-
cito: manibus melle præmadesactis, agitando pre-
mito: & iterum, tertio aut quarto simili modo
exprimens facito, totiesq; recentes rosas detra-

C 2

Etis vnguibz immittito: fiet enim ita oleum multo validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nam si minimum quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibz, rosas tantum oleo macerant in s'clo hoc modo: Rosa quæ s'clibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & vsq; tertiam persusionē quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quò minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus vtile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit. vlcera cana replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque ferundis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitū efficax est, ad laceßita interanea & concutatas vulnus vtilissimè subijcitur.

Elatinum.

CAP. XLIII.

Fracula elate trisa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum pares esse debent vtriusq; portiones, dein mundo vase ad vsus reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet: aluum tamen non mollit.

Mei.

Melinum. CAP. XLIIII.

Melinum hoc modo temperatur: Olei cōgius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijci-
tur elatæ palmarum fractæ quadrans, & iunci
odorati uncia: quæ die vno macerata coquun-
tur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, &
indita arundinacea crate, aut vetustâ tegete,
cotonea mala superponuntur, & vestimentis
operta tâtisper imbi resident, dum malorum vi-
res ad se oleum alliciat. Alioqui cotonea, decē die-
rum spatio operimentis inuoluunt, vt contineatur
odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo ma-
cerata oleo exprimuntur, oleumq; reconditur. Id
vim refrigeratorem & astringentē habet. Con-
tra scabiosa vlcera & quæ serpunt, ac furfures,
perniunculosq; effectum præbet: exulceratis
vuluis infunditur, citatam vrinam sistit infusum,
sudores cohibet, contra cantharidas, buprestim,
pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quod
cotonea mala olet.

Oenanthini compositio. CAP. XLV.

Oenanthe è lambrusca, optimè olens post-
quam emarcuit, deiccta in omphacinum
oleum mouetur, voluiturq;: & cum biduo man-
serit, exprimitur, & reconditur. Astringit, pro-
ximum rosaceo effectum præbens: sed alium non
resoluit, aut mollit. Probatisimum est, quod odo-
re ananthen refert.

Telini componendi ratio. CAP. XLVI.

Foenigræci libræ quinque, calami libra una, cypri libræ duæ, olei libris novem, septem diebus maceratur, quotidie ter moventur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substituant, & cypri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnigræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit, omnibus vulnibus duritijs magnopere convenit, sceminis difficilè parientibus subicitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenesmo subditis prodest, ulcera capitis manâtia fursuresq; expurgat, ambustis, et perniciombus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recēs, quod non vehemēter fœnigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

Sampsuchini cōpositio. CAP. XLVII.

Serpilli, cassiæ, abrotoni, florum sifymbrij, frōdium myrti, sampsuchi singule portiones, quadam pro viribus ipsorum coniectione, unâ tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non evincat: hæc post quatrimum exprimuntur. Denuò nova alia, simili mensura, & equali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet

tet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus vuluæ præclusiones conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, vuluæ strangulatus recreat, lumborū inguinumq; dolores lenit: sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi astrictione locos inlurat. Lassitudines illitum discutit, in opiſthotonicorum, vulsorūq; cataplasmata vtilissime additur.

Ocimini compositio. CAP. XLVIII.

OCimum oleum fit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarū undecim, & bestis pōdo, die noctūque viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhausseris quallum, rursus partem olei modum funilito, exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertia perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit tertium aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio. CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce foliorum abrotoni libris octo die noctūq; madefactus, premito. Quod si in longum

gum tempus oleum velis asservari, eiectionis prioribus folijs, novam appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad vulvae duritias praeclosuremque; efficax est, mensura & secundas pellit.

Anethini compositio.

CAP. LI.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito & recodito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores consimiliter madesacito. Viduarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores februm circumta redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Susinum.

CAP. LII.

Susinum, quod alij lilinum appellant, sic temperatur: Olei librae novem cum quincunce, calami librae quinque & quadrans, myrrhae unciae quinque, permixto odorifero vino decoquuntur, & colato oleo, cardamomi tusi & caelesti aqua madesacti librae tres & semis macerantur, premunturque; tres librae cum semisse spissati olei assumuntur: mille lilia decerptis folijs, in latum, non tamen profundum, labellum demittuntur: injectum oleum, manibus melle peructis agitatur: die noctaque conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quae simul expressa fuerat, colo interni oportet: (non enim, ut rosaceum, moram tolerat: nam concal factum
fer

net & computrescit: quare sæpius decapuladum) vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odo ramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusis, rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusti drachmæ decem coniunguntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimū erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locum sibi vendicat, quod nouissimum prodit. Denuo in mille lilia euulsis folijs expressum primo oleum infunditur: tum eadem ratione proseguendum, idemq; faciendum, vt prius, addito cardamomo, dein expresso: & quo frequentius recentia lilia maceraueris, eo validius vnguentum efficies. Deniq; cum factum abundè videbitur, singulis compositionibus miscere cōuenit myrrhæ quàm optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinq; & septuaginta: croci vero et cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribratæ in lutrâ cum aqua demittuntur, expressumq; primò vnguentū infunditur, & paulò post excipiuntur vasculis siccis, myrrha aut gummi antea perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. Eadem sūt in altera aut tertia expressione. Aliquæ simplex ex balaino, aliòve oleo, & lilijs cōponit.

Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit vuluæ præclusiones, & collectiones aperit, vtilissimum ad muliebria mala: vlcera in capite manantia, feruidus eruptiones, varos, surfuresq; emendat: vibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum.

CAP. LII.

Narcissini olei spissamenta ita sunt: Sex libræ aspalathi cum sextante trunluntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncis quinque assumentur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinque libris, & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autem cum ijs efferverit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quamplurimi coniiciuntur, qui bidui spatio (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subiinde decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

Crocium.

CAP. LIII.

Cvm crocium componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies,
eisd

eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras
treis & semissem, croci unciam unam assumes,
identide quotidie moueto, & sexta die, quàm hoc
assiduo peregeris, oleum à croco colis incernito,
eidem croco partem olei modum adijcito, moue tri-
dno, dein contuse myrrhæ atque cribratæ dra-
chmas quadraginta permisceto, & in pila agita-
tum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cy-
prinum imbuto in crocini compositione viuuntur.
Optimum est, quod abundè crocum spirat, in me-
dendi usu expetitur. Proximum, quod myrrham
refert. Calfacit, somnum allicit, quare persæpe
phreniticis subuenit, perfusum, aut naribus admo-
tum, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat, con-
tra vuluæ duritias atque præclusiones, & vlce-
ra, quæ cacoëthe vocantur, prodest cum croco,
cera, medulla, duplicato olei pondere. Concoquit
enim, emollit, humectat, & permulcet: ad oculo-
rum glaucitates ex aqua illinitur. Hic autem
proportionem respondent butyrinū, onychinum &
styracinum: quæ & etsi nominibus distant, virtus
bus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum. CAP. LI III.

Olei omphacini eloti pars una, aquæ cele-
stis tantundem cum semisse, cuius una par-
te oleum diluitur, altera adijciendis odoris
admiscetur: dein assumptis asspalathi libris quin-
que, & semisse, calami libris sex, & semisse, myr-
rhæ libra una, cardamomi libris tribus, & do-
dran

drante, olei libris nouem, & vncijs quinque. Aspalathus tusus, & aqua assusus decoquitur in oleo donec conferuscat, myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immittuntur: & ubi efferbuerint, sublato alieno, oleū percolatur. Cardamomū tusum reliqua aqua aspersum infunditur, spatha agitur, nulla, dum refrixerit. interpellatione. Posthæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum simili modo prematur: & iterum aut tertio si quis velit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Alii qui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora venarum adaperit, vuluæ neruorumq; vitij conuenit, pleuritici, fractusq; per se vel cerato immissum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Irii spissamentum.

CAP. LV.

Spathæ quamminutissimè contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromati-

bua

bus imbuto oleo, irinū primò tēperatur, iride ex
oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia
est componēdi ratio: In olei septuaginta libris &
quincunce, xylobalsami (vt dictum est) contusi, li-
bras quinque & sextantem excoquito, postea de-
tracto xylobalsamo nouem libras & dextantem
adijcto, & myrrhæ glebam vetere vino odorato
perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuor-
decim libris, totidem tussæ iridis, binis diebus ac
noctibus madefacito, strenuè & vehementer di-
stringito. Quod si vis validius fieri, par pondus
iterum ac tertio similiter maceratum exprimito.
Longè optimum est quod solam irin olet, quale est
in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaiæ natum.
Vim habet calfactoriam atque emollientem, cru-
stas adimit, sordida vlcera & putrida purgat.
confert feminis vuluæ causarijs. item inflamma-
tionibus eiusdē atque præclusionibus, partus eij-
cit, hæmorrhoides recludit, contra aurium soni-
tus ex aceto, ruta & amaris nucibus, prædest:
diuturnis destillationibus, naribus illiū, & cōtra
grauolentia earū vlcera, quæ oxenæ vocant,
auxiliatur: aliū purgat cyathus epotus, facit ad
ilei cruciatu, urinam mouet, difficileis vomitio-
nes adiuvat, perunctis eo digitis & immixtus, vel
ijs quæ ad vomitū ciendum inclinantur: angine etiā
illinitur, aut ex aqua mulsa gargariatur: item
contra arteriæ scabritiam. datur etiam ijs qui ci-
cutam, coriandrū, aut venena fungorū hauserint.

Glen

Gleucinum.

CAP. LVI.

Gleucinum absolute constat omphacino oleo, Giunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, aspalatho, fertula campana, costo, & musco: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & nervorum vulnæq; vitijs auxiliatur, omni acopo inuanti, quippe quod emolliat.

Amaracinum.

CAP. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentum est xylobalfamo, iunco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, castæ, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quod pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, pituitaginibus ac fistulis perquam utile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata vocat, rumpit: difficili urinae, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vulnæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vulnæ tumores discutit, vulneratis nervis, & mus-

scis

sculis confert, laneo centunculo medicè madefactum & impositum.

Megalinum.

CAP. LVIII.

FActuabatur olim megalinum, sed nunc cōpositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad hystoriæ complementum meminisse non fuit alienum. Mīstura cum amaracino eadē erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neque tūc ele neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedychroum.

CAP. LIX.

Quod hedychroon vocant, in Co fieri solet: eisdem præditiū viribus & mīsturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

Metopium.

CAP. LX.

FIt in Aegypto vnguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani mīstionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galbano & resina. Probatum pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quā galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit, ora venarū aperit, vlcera purgat, extrahitq; : ad præcisos neruos, & musculos, ad
her

hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur, horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulis deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur: sudores ciet, vulvæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa, molliendi naturam habet.

Mendesium.

CAP. LXI.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, cassia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multò.

Stacte.

CAP. LXII.

Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tuse, & origano expressæ. Ea perquam odorata, ac pretiosa est: atque vnguentum per se facit, quod stacte nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mixturem admittit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum.

CAP. LXIII.

Cinnamominum confit è balanino oleo, & xylobaljami, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suavitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamominum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur.

Laud

Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adijcit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora venarum aperit, calfacit, discinit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, contra vitæ vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolefcit, & quædam emolliendi vis contrahitur. alioqui adurit, & præ omnibus crassis viuentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores tremores, gangrænasq; cū cardamodo: aduersus serpentium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum.

CAP. LXIII.

Ratio nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerumque autē balanino oleo, aut omphacino: iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, anomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aride aut anomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat.

D

Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, cala-
mo, costis & nardo.

Malabathrinum.

CAP. LXV.

Malabathrinum spissamenta nardini ha-
bet, insuper myrrhæ plusculum additur:
qua de causa calfacit, crocino aut amaracino vi-
ribus respondens.

Iasminum.

CAP. LXVI.

Apod Persas sit, quod Iasminum cognomi-
natur, ex albis floribus violæ: quorum sex-
tans, in Italicum sextarium sesamini olei demit-
titur, violis, ut in lilino diximus, vicissim permu-
tatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur
odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præser-
tim cum in balneas descensum est. Sed his opitu-
latur corporibus, quæ calfactione, laxationemq;
desiderant: grauius enim spirat, quam vi libenter
à plerisq; recipiatur.

Myrrha.

CAP. LXVII.

Myrtha lacryma est arboris, quæ in Ara-
bia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis:
cuius vulnere defluit lacryma in sub-
iectis tegetes, alia circum caulicem concrescit.
Dicitur ex his aliqua pediasmos præpinguis,
qua expressa, Stacte emittitur. Alia gabirca pin-
guissima, læto & pingui solo nascens, ea copio-
sam sudat stactem. Omnium prima est, quæ tro-
glodytica appellatur, accepto cognomine à loco,
in quo prouenit: splendens, subviridis, ac mor-
dens.

dens. Quintiã legitur tenuis quedam, quæ à troglodytica secundũ est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricus nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminnea cognomine. Ex q̃s p̃stilli sunt, sed è pinguibus pingues, & odorati: è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quæ oleum non admittit, cum in p̃stillos digerebatur. adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha inaduertit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, rubeque cõcolor, quæ confracta venas vnguium modo candidas & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: supernacua & inutilis est ponderosa, coloris picci. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccatur, astringit, vuluam emollit, & præclusam aperit: menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorij cremore, vel succo rutæ admota: tuberculo fabæ decoratur in vetere tussi, orthopnoea, in laterij p̃elorisq; doloribus, in alui profluvio, & dysenteria: horrores discutit, duabus horis ante febris accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua: subdita linguae liquataq; scabritiem arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum manditur, &

aduersus alarum tædia cum liquido alumine illi-
 ntur: gingiuas & dentes stabilit, colluto cum vi-
 no & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, me-
 detur fractis auribus ac ossibus nudatis, perim-
 etur cum cochleæ carnibus. Item purulentis auri-
 bus inflāmatīsq; cum meconio, castorio, & glau-
 cio: ad varos autē cum cassia & melle illinitur, im-
 petigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum
 ladano & vino myrteo illita, firmat: diuturnas
 destillationes lenit, illitis pēna naribus: oculorum
 vlcera complet, albugines tollit, caliginem discu-
 tit, scabritiem leuigat. Fit ē myrrha, perinde at-
 que thure, fuligo, &, ut postea ostendemus, ad
 eadem conueniens. Bæotica myrrha, dissecta ra-
 dix est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis.
 Melior est que myrrham odoris suauitate repræ-
 sentat. Vis ei calfactoria inest, emollit discu-
 titq; suffimentis commodissimè inseritur.

Styrax.

CAP. LXVIII.

Σtyrax lacryma est arboris malo cotoneæ si-
 milis. Præfertur * sordescens, flauus, resino-
 id est, pin- sus, albicantibus grumis, quāplurimum in sua
 gus. odoris gratia permanens: qui dum mollitur, mel-
 leum liquorem reddit: qualis ē Cataballis, Pissi-
 dia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursu-
 rosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum la-
 cryma inuenitur gummiū similitudine, perlis-
 cida, & myrrha emula: verum perpauca ma-
 nat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi ero-
 den

dentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, veniuntq; . Styracem hunc [quoniam in vermiculorum speciem contrahatur] scoleciten cognominant, tanquam syncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad precipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, rancidini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præclusæ duritiæve laboranti conuenit, cit menses potu appositusq; , alium leniter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmati, acopisq; . Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eandem cõueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq; , & soporem adfert.

Bdellium.

CAP. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelecon: lacryma est * saracenicæ arboris. Probatu- * vox adulterina
 gus-
 tur gustu amarum, translucidum, taurini glutinus in more. intus pingue, liquefcens facile, ligni
 ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui simile. Marcello.

D 3

Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, vberioribus glebulis in offis conuolutum, aspala-
thi odore, ex India adueclum. Desertur etiam à
Petra oppido siccum, resinofum, luescens, sed fa-
cultate secundum. Adulteratur gummi, sed ita vi-
tium non perinde gustu amaritudinem repræ-
sentat, nec vsque adeò suffitionibus odoratu. Cal-
facit & emollit duritias, & turgentia guttura,
humidasq; hernias discutit, cum ieiuna salua di-
lutum: vuluæ spiracula laxat appositus & suffi-
tu, & partus humiditatesq; omnes extrahit, cal-
culos potu comminuit, urinam mouet, tussientibus
& à serpente percussis, utilissimè datur: valet ad
rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spi-
ritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias
& nervorum nodos prosunt: contusum resoluitur
assiso vino aut aqua calida.

* ὀνείρις =
fos, id est,
subrasum
est.

Thus.

CAP. LXX.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurife-
ra cognominatur. Primum tenet in eo ge-
nere masculum, stagonias appellatum, suapte na-
* ὀ Agæ = iura rotundum: tale autem individuum est, candi-
Biacs ἢ ὀ dum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu sta-
ἐν Σμίλῳ, tum ardens. Indicum vero * fuluescit, & colore li-
id est, Ara = uet, sed rotundum industria factitant: nā in qua-
bus dictū, drangulares formas dissectum fictilibus versant,
& quod in donec rotunditatem contrahat: verum huiusmodi
Smilo pro- ihus tēpore flarescit, quod atomum aut syagrum
uenit. appellant. Secundum locum habet * Arabicum,

&

Et in Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocāt,
minus multò & fuluius. Est & genus aliud, cui
amomite cognomen est, alioqui candidum: quod
dum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adul-
teratur * in itinere, pini resina & gummi, quod * μεθοδὸς
facile deprehendi potest: siquidem suffitum gummi id
mi flammam non eiaculatur, & resina in fu- est, artifi-
cium euanesceat, thus verò statim ardet: idem ma- cioso cōfor-
licium odor prodit. Ad calfaciendum & astringe- matum. Sic
gendum pollet, oculorum caliginem discuit, caua Marc.

Ulcera complet & ad cicatricem perducit, cruen-
ta vulnera glutinat, infrenatq; cunctas sangui-
nis eruptiones, etiam si cerebri mēbris effluat:
ulcera quæ cacoēthe vocantur, & sedus & reli-
quarum partium permulcet tritū cum eo & lacte
linamentū, formicantes verrucas inter initia, ime-
petiginesq; ex aceto & pice illitum, tollit: ambu-
sta igni, pernionesq; cum sullo adipe aut anseri-
no, & ulcera in capite manātia cum nitro, si in-
fricetur, sanat: paronychys cum melle, auribus fra-
ctis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores
cum dulci vino infunditur, inflammata a partu
mamme cum cunctis & rosaceo magna utilita-
te perunguntur, additur ad arteria viscerumq;
medicamenta, prodest sanguinis excreationi po-
tum: sed in secunda valetudine haustū insaniam
mouet, & largius cum vino potū interficit. In si-
ctili mūdo thus crematur, flagrantē glebula succen-
sum à lucerna, donec exuratur: post perfectam

ustionem operire oportet, usque dum restinguatur: sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cavo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam novo vinacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporumve emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. CAP. LXXI.

Praefertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, levis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admixto pini aut nucis citius cortice, sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vitur, & vis eadem quae thuri, sed validior astringentiorque. Quare potius eruentis excretionibus, vulnus fluxione laborantibus in pectore confert, ad cicatrices oculorum, & caua sordesque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. CAP. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed invalidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant: sed haec igne deprehenduntur.

tas.

tur. Neque enim æquè suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suauolentiae halitus virus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensus singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauā imposito: & æreo vase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito: alteram admoneto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quaternū digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspicì queat, si vrantur: & quò locus capax fuerit, glebulas alias supponito. & antea quàm prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris coëgisse. Continuo tamē externæ eramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergātur: ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit: quæ alioquin per leuitatem decidua, thuris cineribus admisceatur. Derasa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi videtur, obuiandum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Picea & Pinus. CAP. LXXIIII.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierū distinctionem,

D 5

arbores vulgò cognita: quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, ulceribus summum corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna. Ulcera delicatiorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet, suffitu partus & secundas eijcit, potus aluum sistit, urinam mouet. Folia eorū trita & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant, trita autem & decocta aceto, feruētī collutione, dentium dolores mulcēt: hepaticis utilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idem præstant. Teda earum particulatim secta si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatula acoporum pessorumq; cōpositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectiōnem excipitur: ea circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mentiuntur, callibrephebra Græci vocant: arrosis oculorum angulus, callosis glabrisq; genis, & collacrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum piceæq; fructus, qui in comis inueniuntur. Vim astringentiam habent, & aliquantum excalesceniē: tussi & pectoris viijs auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces pineæ cum Strobili repurgatæ manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine

bib

Pityides.

bibuntur, urinam cient: acrimonias in renibus & vesica hebetant, stomachi rofiones leniunt: data cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborant, corruptorum quoq; humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passò franguntur, & decoctæ vetustæ tussi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. CAP. LXXV.

Lentiscus nota arbor est, cui toti vis inest astringēdi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liquamentum autē ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abundè cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item cōtra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia. In totum acaciæ & hypocistidis vicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Decoctum folu cana explet, & fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium colluione stabilit. Virentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricātur. Fit è semine oleum, * quod *τυπλινδρ*. prodest cum quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, Mastix of & ab aliquibus, * mastiche. Pota utilis est ficinis.

sang

sanguinem reijcientibus, & tussis veteri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentificia & illitiones faciei, ad nitore cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodis repleat, manducata halitum oris commendat, gingiuis contrahit. Optima & copiosissima in insula *Insertu* ab Chio prouenit. Præfertur [nitedulæ modo] re-
interprete. splendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem adens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinæq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadē ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptiæq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, urinam mouet, venerem excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia pætraea defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis: sed præualet candida, perlucida, vitreo colore & incæruleum vergente, odorata, terebinthum olens.

Officinis *Terebinthina resinas omneis antecedit: proxima lentiscina, & è pinu, & abiete: hæc sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, *urin*

urinam cient, cruda concoquant, ventrem emol-
liunt, palpebras commodissimè replicant, lepras
tollunt, cum arugine ac sutorio atramēto, nitroq̃;
atribus saniem emanantibus cum melle & oleo,
item in pruritu genitalium vtiles: malagmatis,
acopisq̃; admiscuntur. Laterum doloribus per se,
illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

Liquida resina è pinu & picea, à Gallia &
Hetruria conuehi solet, atque olim à Colo-
phone petebatur: hinc Colophonice sibi cogno-
mentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina:
quam vernaculo nomine Laricem appellant inco-
le. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest
iussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia
candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris simili-
tudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidā fun-
dit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ verò ari-
darum generi ascribuntur, quedam ex pineis nu-
cibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt.
Eligi debet longè omnium odoratissima, transluc-
ens, non retorrida, neque diluta, quandam ceræ
faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete re-
sinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq̃;
thus odore imitantur. Præstantiores a Pityusa
insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita
est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupresso
manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiun-
tur. Verumtamen eorundem gratia quorum &
illa

ille sumi solent. Lentiscina terebinthinae respon-
det. Vritur resina omnis liquida in vase quadru-
ple capacitatis ad humorem, qui infunditur: ita-
que resinae cōgius, in duobus aquae pluviae coqui-
tur, subiectis leuibus prunis, resina assidue moue-
tur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & re-
torrida reddatur, ac digitis cedat. Ceterum ubi
refrixit, in fictile non picatum, quod aconitū voc-
cant, id est nō illiū, reconditur. Fiet etiam eximij
candoris, si resina omnis eliquata praeoletur, quō
faculenta sordes excernatur. Vrantur quoq; sine
aqua, primum lento igne; & ubi coire coeperint,
maior carbonū strues supponitur, & triduo citra
intermissione discoquantur, usq; dum antedictas
naturae suae notas exuerint: mox, ut dictū est, re-
ponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse satis
est. Vtilē odoratis malagmatibus, & acris, &
unguentorum colorationibus magnopere utiles
sunt. E resina perinde atque thure fuligo excipi-
tur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras
fucant, & colorem mētiuntur. Prodest glabris ge-
nis, collacrymationibus, erosisque oculorum angu-
lis. ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, ē pin-
guissimis pini piceaeq; lignis congregatur.
Optima est splendens, sincera, laevis. Contra
venena, phthisin, purulentam excreationem, tuf-
ses, suspiria, & pectoris humores qui difficile ex-
tussunt

tussimur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vix inflammationes, anginaeque viliter pruruntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta verò paricera scabros ungues extricat, impetiginesque emendat: vuluæ diutius ac sedis tubercula discutit: cum farinaque hordeacea & pueri impubis vrina decocta, strumas rumpit: cohibet vlcera quæ serpiunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut surfuribus illita. Caterum cum thuris manna & cera to profundos vlcerum sinus conglutinat, rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vna pissina, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitque, erodentibus medicamentis, quas sepias vocant, probè immiscetur.

Picinum oleum. CAP. LXXIX.

E Pice fit quod pissileon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut seris lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoque hac delitu eius exprimuntur in vas. * Quis pix liquida, præbet utilitates. alopecias capillo replet cum ugi τδτο farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix αμ γίνετο medetur, iumentorum vlcera scabiemque emendat. ιφ δσομ

Fuligo liquidæ pici. CAP. LXXX. αμ χένον

F It hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna η πίαα ια ιονα que ellychnium habeat, nonnihil pici ψατο.

ιουα

incendito, lucernamq; fictili vase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibanus esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore novum infundito, quoad sufficiens usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Usui est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustat, & ad circumlitiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

Pix arida. CAP. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam: quo in genere quaedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus movet, tubercula pannosq; discutit, ulcera replet, vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt densam nambus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. CAP. LXXXIII.

Bitumen Indicum cæteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpura modo splendeat, sitq; ponder

ponderosum, ac validum odorem vibret. Nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliae, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Cerauijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuq; in litus exputur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignis rapax, ita vt ex spatio protinus in eam transfiliant. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vuluarum procidentia, stragulationesq; olfactu, suffitu, impositu, emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lipidis more: purgationes mulierum cum vino, & castorio potum elicit, tussim veterem & anhelitum aliuuat, serpentium moribus, coxendicum laterumq; doloribus auxilatur, datur celiacis in catapodio deuorandum, cum aceto potiù discutit sanguinem concretum, dysen-

E.

tericus cum ptisana liquatum infunditur, destillationibus suffitione medetur, mitigat dentium dolores oblitum, ceterum pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum: concalsactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

Cupressus.

CAP. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passo, & exiguo myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis, & urine difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex vino tusæ in dysenteria, alius fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdè præbet effectus: tusæ cum sico duritias emolliunt, nariumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues ejciunt, hernias intestinorum proapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstât. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere existimantur. Folia trita & imposita, vulnera conglutinant: sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingunt, illinuntur per se, aut cum polenta ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota cum cerato stomachum corroborant.

Iuniperus.

CAP. LXXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera mi-

nor.

nor, utraque acris est. Excalfacit, & urinam mo-
uet, accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ
nucis iuglandis magnitudine nonnunquam gran-
descere, aliæ * nucem Ponticam æquare inueniuntur: * *Auellanā*
tur: rotunda, odorata, in mandendo dulces, suba-
maræ, quæ arceuthides etiam, id est bacce iuni-
peri, nominantur. Modicè calfaciunt, & astrin-
gunt, stomacho vitales: cōtra pectoris vitia, tussim,
inflationes, tormina, & serpentium ictus effica-
cissimè bibuntur: urinam cient, unde ruptis, con-
uulsis, & vuluæ strangulati subueniunt. Folia
acrimoniam habent: ideo tam ipsa, quàm eorum
succus ex vino contra viperarū morsus illini aut
bibere prodest. Corticis cinis cū aqua illitus, lepras
eximit. Ramenta ligni demorata interficiunt.

Herba Sabina.

CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs cu-
presso similis, spinis horridior, grauiter olens,
acris et feruens: arbor est coactæ breuitatis, quæ
sepe magis in latitudinē fundit: huius folijs nonnul-
li pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio simi-
lis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones
illitis mitigant, & cum melle nigritias sordesq;
repurgant, carbunculos cum vino pota rumpunt,
sanguinem per urinam eliciunt, partus apposita
extrahunt, & suffitus idē præstant, vnguentis cal-
facientibus immiscentur, & priuatim gleucino.

Cedrus.

CAP. LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colli-

E 2

gunt, quæ cedria vocatur: iuniperi modo baccas
 parit: baccarum myrti magnitudine, rotundas.
 Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odo-
 ris: quæ dum effunditur, guttatim non dissipata
 coit. Cui ea vis inest ut defuncta corpora conser-
 uet, & viuientia corrumpat: quæ ex causa mer-

Cedrus tuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta
 mortuorum quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi
 vita dicta. dote, corrumpit: magni ad ocularia medicamen-
 ta vsus, quippe illita oculis claritatem affert, al-
 bugines cicatricesq; detergit, instillata autem cum
 aceto vermes aurium necat, cum hyssopi decocto
 infusa sonitus sibilosq; sedat, canum dentium indi-
 ta eos frangit, & dolores leuat. idem facit cum ex
 aceto collinitur: peruncto ante coitum genitali
 abortiuum fieri constat, angine ea perunguntur,
 tonsillarum inflammationibus auxilio est, lentes
 pediculosq; illitus enecat, cerastæ moribus cum
 sale imposita subuenit, contra hausta leporis ma-
 rini venena, in pulso sumpta, auxiliatur: in ele-
 phantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pul-
 monum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbea-
 ter, persanat: uermes & lineas subter indita ne-
 cat, & parius extrahit. Fit & oleum, à cedria
 separatum, dum coquitur, velleribus supra hali-
 tum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad omnia
 vsus: priuatim vehementer perunctum scabiem
 quadrupedum, canum, boumq; persanat: inheren-
 tes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura accepe-
 runt,

runt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocatur. Calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marini in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, cõgeri oportet, quæ eandem, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus.

CAP. XC.

Laurus quedam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, vuluæ & vesicæ vitis conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quæque ac trita vesparum aptumque; ichibus opitulantur, eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouet. Lauri bacce magis, quam folia calfaciunt: ergo in eclegmate triæ cum melle vel passo prosunt tabi, orthopnææ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpium iclus ex vino bibuntur, vitilignes emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori, & grauitati instillatur, cum vino vetere, et rosa-ceo. In medicamenta autem adiunguntur, qua nervorum lassitudines rescipiunt, acopa vocant: & ad vnguenta, quæ calfaciunt, & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis pro-

prodest, tribus obolis in vino odorato potus.

Platanus.

CAP. XCI.

TEnerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in vino potæ, serpentium morsibus auxiliatur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. infidens foliorum pilularumq; lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus.

CAP. XCII.

FRaxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scorbicmq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus.

CAP. XCIII.

Potus albæ populi cortex vnciæ vnius pondere, schiadicis ac vrinæ stillicidio prodest. Abortuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoq; cum vino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ, quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriæ prodiderunt, corticem albæ populi, & nigre particulatim cæsum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigre folia cum aceto illita, magnæ vtilitate pedagricæ

gricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lacrymam populorum cōmemorāt, quæ in Padum amnem defluat, De ortu ele durari, ac coire in succinum, quod electrum vo= ctri multa cant, alij chrysophorum. Id attritu iucundum odo= lib. vltimo, rem spirat, & aurum colore imitatur: tritum po cap. 3. et 4. tumq; stomachi ventrisq; fluxiones sistit. apud Plin.

Macer. CAP. XCIII.

MAcer ex Barbaria aduehitur, cortex fla= uescens, crassus, gustu perquā astringens: qui contra cruentas excreationes, dysente= rias, & alui fluxiones bibitur.

Vlmus. CAP. XCV.

VLmi & folia & cortex & rami, vim ha= bēi spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutinant, sed mul= tō magis corticis tilia, si fasciæ loco inorquea= tur: nam in lori morē flecti potest. Crassior cor= tex in vino aut aqua frigida vnciatim potus, pi= ritus trahit: fracta ossa celerius solidescūt, si de= cocto foliorū corticis aut radicis foveātur. Humor in folliculis enascens prima germis eruptione, cuti illitus nitore inducit, faciemq; splendidiorem præstat. Qui dum siccat, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenescunt cocta, olerum more ad obsoma usurpantur.

ELignorum marcor. CAP. XCVI.
EX caudicibus lignisq; veteribus caries cōge=

ritur, quæ farine modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: serpentina cohibet, si cum pari amfo & vino subacta, lineisq; imposita illinatur.

Harundo.

CAP. XCVII.

IN harundinum genere quedam nascos, id est farctior, vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia femina, qua tibiæ ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, syringias: cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud omnes nascens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. virentia folia iusa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere permixta cum aceto alopecie sanantur, paniculae lannugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

Papyrus.

CAP. XCVIII.

Papyrus qua chartæ sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vilitatis, ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, usque dum inaruerit: constricta enim atque immissa inhiatum, humore completur, & intumescendo fistula aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq;

Aeg

Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Ipsius radicibus pro ligno vtiuntur. Cremata papyri cinis depascētia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: verum melius id combusta charta præstat.

Myrica.

CAP. XCIX.

MYrica seu tamarix arbor vulgo cognita Officinis est, cum apud pigras & stagnantes aquas Tamariscuscatur, fructum quasi florem ferens compage scus. muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. Fructum parit gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu: quo conuenienter vtiuntur vice gallæ in medicaminibus oculorum orisq;. Datur cruenta excreationi in pitu, & cæliaci, & cōtra profluvia fœminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eosdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absorbit: ad dolorem dentium in colutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ opportunis in desectionibus, phibiriassi lendibusq; circumfusum prodest, abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lienosis moliuntur, quò datus in his potus proficiat.

Erica.

CAP. C.

Erica* fruticosa arbor, myrica similis, longè * Plin. fructu minor: cuius flore apes reprobis mel efficiunt, ticē dicit. tã flos quàm coma serpētiū ictibus illitus medetur.

E 5

Acacalis.

CAP. CI.

Acacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, seminis myricæ quadātenus similis: cuius aqua in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandā oculorū aciem conueniunt.

Rhamnus.

CAP. CII.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadātenus rubentibus: cuius rami quinnū ferē cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum edit *κοινὸς ἀ-
σφοδῆς, latum, cādīdum, tenuem, follicularij specie, *ver-
ticillo similem. Omnium folia igni sacro, & ser-
id est, a- pentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama
sphodeli frū est ramos huius valus fenestrisve impositos, ve-
ctui simile. nescia depellere.

Halimus.

CAP. CIII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus: nascitur in sepibus & maritimus. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix, conuulsa, rupta, torminēq; mitigat, drachmæ pōdere in aqua mulsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus.

CAP. CIIII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum in-
nen

uenitur: quod potum iussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astrictoriam vim habent: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita & imposita.

Acuta spina.

CAP. CV.

Acuta spina, quam pyrinam aut puyan= Officinariis
them aliqui vocant, arbor est pyrastro simili= Berberis.
lis, spinosa valde & minor, baccas profert myrti,
plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem
multifidam, aliè descendente. Huius baccæ potus
aut cibo, alui profluvium, & abundantiam scemi-
narum sistunt. Radix illita aculeos & spicula ex-
trahit, abortum fieri tradunt, si ter radice veteri,
aut sensim feriatur, aut perungatur.

Rubus canis.

CAP. CVI.

Rutæ est arboris instar, rubo longè ma-
ior: folia fert multò latiora myrto, robu-
stis circa ramos spinis, flore candido, fructu ob-
longo, nucleo olivæ simili, qui per maturitatem
fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus ex-
emptis interioribus floccis arefactus, aluum si-
stunt: serae facti enim in vino, mox poti, arteriam
infestant.

Ligustrum.

CAP. CVII.

Ligustrum arbor est olivæ folijs circum ra- Officinis
mos similibus, latioribus, mollioribus, & Alcanna.
colore

colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia astringentiam vim habent: quare commaducata ulceribus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisq; prosunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur, capillum rufant trita folia, quæ in radicle succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitq; nervos: si quæ feruenti natura prædita sint, assumat.

Tilia.

CAP. CVIII.

χρίων*. **Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus & latioribus, fructu* lenitisci, nigro, subdulci, racematim coherente, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem virilia ad quæ oleaster, cum astringente est opus: maximè ad oris ulcera, commaducata, aut si decocto colluantur: pota urinam ac menses cient.

Cistus.

CAP. CIX.

ῥοζή*. **Cistus, quem aliqui citharon, aut cissarion vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis. flos* masculino ut mali punice, femine albet. Vis astringens: unde flores in vino austero bis in die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illuti cohibent, vetustati ulcerum, & igni ambustus cum cerato medetur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cistideradi

*Vox ex
Plinio re-
posita.

radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractâq; macerant, & incoquunt, reliquaq; vt in Lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, verum aliquanto magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus: fæminarum proflusio & pota & induta.

Ladanum.

CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus: quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis astringens, ac eosdem quos cistus effectus præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis duris. cruribus adhærescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij verò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maximè probatur odoratum, subviride, facile mollescens, pingue, quod arænis non collegit nec squalore obsitum est, resinosum quale in Cypro gignitur. Arabicum verò Libycumq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit, capillum fluentem cōtinet, addito vino, myrrha, & myrteo oleo. cicatricibus decorem reddit, cum vino illi-

tum.

tum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundus eicit, pectus immisum vuluæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt, & malagmata utiliter inseritur: alium sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet.

Ebenus.

CAP. CXI.

Ebenus optima habetur æthiopica & nigra, nullos habens venarum discursus, fictitij cornus leuore: cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque leniter astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones, sine fumi tædio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad cotem rufescit. Altera est indica, internatis segmentis candicantibus, & modicè fulvis, item frequentibus maculis: ceterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consimilia pro ebena vanentur: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad veteres destillationes pustulasque mirum in modum pollet: si quis spiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentave vino Chio die noctuque macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prærita ipsa excolant, reliquaque eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vuntur. Vritur in fictili no-

HO 3

us, donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi
vlti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus
conducit.

Rosa.

CAP. CXII.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo
magis. Succus recentibus folijs exprimitur, de seclis forfice vnguibz (sic appellantur can- Quid vn-
didæ foliorum partes) reliquum in pila premi & guis in ro-
teri debet in vmbra donec cogatur, & ita ad o- sa.
culorum circumlitiones recondi. Siccamur etiam
num filia rosarum, continuo versata, ne muceant,
neve sitius in ipsis infideat. Aridis rosis & in vino
decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis,
aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intesti-
ni ac vuluæ, penna illitus aut infusus. Eadem sine
expresione iusa, precordiorum inflammationi-
bus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini pro-
dest: siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri
solent vulnerarijs antidotis, atque compositioni-
bus, quas antheras vocant. Folia vruntur in
calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur,
siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter in-
spargitur. Capita pota citam aluum, & cruentas
reiectiones sistunt.

Rosei pastilli.

CAP. CXIII.

Pastilli quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur: Rosarum viridium, quæ nul-
lo antea humore madefactæ extabuerint, dra-
chmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ de-
cem,

cem, myrrhae drachmae sex, trita digeruntur in pastillos, qui trium obolrum pondus aequent: siccati; in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricae totidem, & vinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad illitiones & diapasmata, quae fiunt ad sudores coercendos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium.

CAP. CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxi densis: fructu piperis, nigro, leui, amaro, densq; cortice pallido, non dissimili lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. Aspera loca amat. Succi extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi & anuè per multos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimè quod vri potest, restinctumq; rubetem spumam ostendit, glebis

bis extrinsecus nigris, intus, cum fregis, rufis,
 *odore minime viroso, cum amaritudine adstrin * Ita ex Plin
 gens, crocino colore (cuiusmodi Indicum est) cetero
 ris praestantius atque efficacius. Lycium adstrin
 git, caliginem oculorum discutit, genarum sca
 biem, pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad
 purulentas aureis, exulceratas gingivas, tonsil
 las, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illi
 tum: coeliacis, dysentericis, pituitum inditumque con
 uenit: datur sanguinem excreantibus & tussi, ex
 aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotto
 deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pi
 los: reduit, ulceribus quae serpunt aut putrent,
 medetur: feminarum profluvia appositum sistit:
 rabiosorum ictibus ex melle potum, aut vice ca
 tapotij deuoratum, auxiliatur. * Tradunt Indi * Videntur
 cum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato: Marcello
 ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos ha
 bens ternum cubitorum longitudine, maioresve, rari quibus, no
 bi crassiores, in radice numerosos. Fractus cortex iha.
 rubescit, folia oleae similia. Herba in aceto decocta
 proditur lienis inflammationibus & regio mor
 bo mederi, & feminarum purgationes elicere. * Non est
 Assuerat etiam crudam in potu, eosdem effectus genuina
 praestare. Semen cyatho dimidio pituitum officinarum
 expurgare: venenis quoque auxilio esse. Acacia,
 quauis ea
 dem via ac
 natura pre
 dita.

Acacia.

CAP. CXV.

A Acacia in Aegypto nascitur spina instar ar
 boris, fruticosa, non se in rectum attollens.

F

Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrisus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Mucat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandum; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum: ulcera quæ serpūt, pernioles, pleurygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimunt, mensum abundantiam sistunt, prociduum vuluam cohibet: citam aluum supprimit, aut potius aut subter inditus: capillos denigrat. Lantatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in crudis fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Spinae decoctum solutos artus fatis committit. Præferitur eius spinae gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum: sordidum verò ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustus ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acacie genus in Cappadocia Pontog; provenit, Aegyptiæ spine similitudine, longe minus, tenerius, humile: aculeorum vallo manitur, folia habens ruscæ. Semen lentiscula

ticula minus fert autumnis, in locis cōnexis, ternum quaternumve capacibus. Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Vitex.

CAP. CXVI.

Vitex siue lygos frutex est in arborem assur Barbaris gens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; agnus calicis, ac torrentium alueis: ramos gerit longos, frastus. Et pernicaces: folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius, una harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excalcifactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potius venenatis ictibus, aquæ quæ cutem subijt, lienosisq; auxiliatur: lac euocat, menses ciet, drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit, caput tentat & soporē affert. Decoctū herbæ & seminis in defensione, mulieribus vuluæ malo opportunis opitulatur, item inflammationibus: purgationes mouet semē cum pilulo potum, etiam suffitū vel appositū: capitis dolorem dissoluit illitū, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitū aut substratū fugant venenata: illita quoq; serpentium moribus auxiliantur: testium duritias cum butyro & folijs vitium emolliunt: rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, & cum folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui matuteneat dum iter facit, negatur intertriginē senis agni & lycire. Agnum, quasi dicus castum, vocant Græci ratio.

F 2

ci, quoniam matrone in thesmophorijs Athenien-
sium castitatem custodientes, folijs huius cubi-
tus sibi sternunt. & lygon quasi rimen, propter
inuictam ferè ramorum flexilitatem.

Salix.

CAP. CXVII.

Salix vulgo mita est: cuius semen, folia, cortex
& succus spissandi vim habent. Trita fo-
lia cum exiguo pipere & vino pota, ileosis subue-
nium: sumpta per se & cū aqua præstant mulie-
ribus ne concipiant. Salignum semen in potu san-
guinem expuentibus prodest: cortex eosdem præ-
bet effectus. Corticis cinis admisto aceto macera-
tus, illitus clauus & callus tollit. Ex folijs & cor-
tice succus cum rosaceo in calyce punici calfa-
ctus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eo-
rum podagras foueri utilissimum: furfures pur-
gat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea
cum floret, exciso cortice, in plaga enim concretus
humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant
oculis, suam vim præbet.

Syluestris olea.

CAP. CXVIII.

Syluestris olea, quam Latini oleastrum appel-
lant, alij Aethiopcam oliuam, filia astrin-
gunt: trita autem & impersita ignem sacrum, vl-
cera quæ serpunt, epimyctides, carbunculos, re-
dumas nomasq; cohibent: crustas emarginant
cum melle illita. Quinetiam sordida vlcera repur-
gant: inflammationes panisq; cum melle impo-
sita disciunt: cuem à capite vulsam congluti-
nant:

nant: oris vlceribus, & priuatim infantium, com=
manducata medentur. Succus & dec. Etiam eos=
dem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac mu=
liebre profluvium, admotus succus inhibet: vna
oculorum, pustulusq; prodest: vlcera & vete=
res defluxiones sistit, (quapropter in collyria ad=
ditur.) ad genarum erosiones perquam utilis. Ex=
primitur succus iustis folijs, affuso vino aut aqua,
siccatusq; sole in pastillos digeritur. sed longè va=
lidior ad recondendum succus habetur, qui cum
vino quàm cum aqua expressus est. Auribus sub=
uenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia con=
uenienter celiacis cum farina hordeacea illinun=
tur: vruntur cum floribus folia, ut spodiū vicem
cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, usque
dum figlinum percoquatur: restinctaq; vino &
rursus subacta, eodem modo vruntur, postremo
cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusce=
modi cinerem in medicamentis oculorum constat
spodio non cedere, sed eisdem viribus prædium
esse putandum est. Foliorum sativæ oleæ eadem
vis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde ocu=
laribus medicamentis ob suam mitiorem vim con=
venientior est. Sudor ligno virenti accenso ma=
nans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem.
Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, &
vlceribus quæ depasciū vorantq;: quod autem in=
tra nucleum est, ex adipe & farina scabros vi=
gues excutit. Colymbades trita & ambustus il=

lit. & pustulas gigni prohibent, sordida ulcera purgant, muria succus collutas gingivas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua flaua & recens stomacho utilior est, ventri diff. cilis: nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascemia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliue gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilit calfacti folus gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

Lacryma æthiopica olea.

CAP. CXIX.

Lacryma quam æthiopica olea stillat, scammonio similis quadamtenus est, fulua, stillis exilibus constans, mordax: quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, supernacua est. Nostrates olea, oleastrisq; similem lacrymā sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices albuginesq; illitu emendat, vrinam & menses ciet, cauis dentium impressa ad dolores efficax est: inter venena scribitur: partus pellit, lepras & impetigines sanat. Appellatur autem æthiopica & agrestis olea.

Amurca.

CAP. CXX.

Amurca (expresse oliue recrementum) decocti

cocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros præbens lycij effectus. Insup-
 dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino
 aut mulso commodè illinitur: additur in medi-
 camēta ocularia, & meatus inductu suo obstruen-
 tia. Vetustate meliorem fieri constat. Utiliter
 infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcera-
 tioni. Si verò cum omphacino recoquatur ad mel-
 lis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumen-
 torum scabiem cum decocto lupini, & chamæ-
 leonte illitu sanat. Cruda & recenti amurca po-
 dagras articularesq; dolores foueri, vtilissimum:
 peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposta,
 tumoris molem reprimi.

Quercus, glans, fagus, ilex.

CAP. CXXI.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet,
 præsertim liber qui cortici & ligno in-
 tercedit: quin etiam tunica putami-
 ni glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysen-
 tericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in
 pesse, feminis fluxione vuluæ laborantibus subij-
 citur. Glandes eosdem effectus exhibent: urinam
 ciunt, capitis dolorem & flatu in cibum sumptæ
 parant, resistunt esitæ venenatorum ictibus.
 Decoctum earum & corticis cum lacte vaccino
 potum, prædest contra toxica: intrita cruda, in-
 flammationes illitu leniunt: ad duritias quas ca-
 coëthe vocant, & malefica vlcera cum salsa axum

gia conueniunt. Iligneæ glandes viribus quernus antecellunt. Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneæ radicis cortex cum aqua coctus, dum mollitus in aëbeſcat, & tota nocte illutus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castanex.

CAP. CXXII.

Sardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut slopima, aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesq; effectus præbent: præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercurſat. Carolus qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla.

CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusque vis vehementer adstringere. Tritæ excrescetiæ in carne, fluxiones gingivarum & vix, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus, dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida iuria extinctæ, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulnus procidentæ, fluxionesq;. Capillos denigrant, aceto aut æquis maceratæ, dysentericus coeliacusq; cum vino
aut

aut aqua trita conuenienter illuminatur, aut bibuntur: obsonijs addi debet, aut integra in aqua præcoqui, in qua nihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his utendum ad adstringenda, et siccanda quæ opus sunt.

Rhus. CAP. CXXIIII.

RHUS quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Officinis erythros appellata, semē est coriarij fructus sumach, cis, sic vocati, quoniam coriorum infectiores eo utuntur Arabum, ad inspissandas pelles. Arbuscula in petris more nascens, binum ferè cubitorum altitudine, folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acinorum graciliū denso, magnitudine terebinthi, quadamtenus lato; cuius corticosa tunica perquam utilis est. Folia vim habent adstringendi, & acacie effectus præbent. Decoctum capillos denigrat, dysentericis insunditur, & in potus eorum infususq; adijcitur: instillatur auribus purulentis. Gangrenas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liguamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctus, ad eadem, ut lycium, conueniens. Semen eosdem effectus exhibet: celiacorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: lingue asperitates cum melle abstergit, candida foeminarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur contig; effica-

F 5

cior ipso semine. Gummi defert, quod dentium ca-
vus imprimatur, ad dolores finiendis.

Palma. CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio matu-
ritatis vigore, autumno decerpi solet, Arabi-
ci myrobalani similis. primatis cognomine, colore
viridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturi-
tatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet.
Palma acerba est & adstringens: contra alui
fœminarumq; profluvia, in vino austero bibitur:
hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illitu. Phœ-
nicobalani recentes plus siccis adstringant, capi-
tus dolorem afferunt, copiosiores in cibo inebriant,
sicciores sanguinem excruciantibus, stomachicis, &
dysentericis utiles in cibo: illinuntur cum coto-
neo & cerato ananithino resicæ vitis. Cariotæ,
præsertim esu, faucium asperitati medentur. The-
baicarum decoctum potu æstuationem sedat, vi-
res recreat cum hydromelite veteri sumptum: ci-
bo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem con-
ueniens. Decoctum per se potu & gargarizatio-
ne magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei pal-
marum, cæterorū more, cremati in crudo sicili,
& vino restincti, cinere loti, spodij vice efficiunt:
miscenturq; in calliblephara. Quod si non iustam
ustionem acceperint, denuo cremandi. Vim ad-
stringendi habent, & spiracula cutis obductis suo
claudunt: contra oculorum ruam & pustulas,
palpebrarum desinua, cum nardo effectum præ-
bent:

bent : corporis excrescentias cum vino reprimūt, vlcera ad cicatricem perducūt. Sed inter primas viles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

Palma elate. CAP. CXXVI.

Palma, quam aliqui elaten aut spatham appellam, fructus palmarum adhuc florentiū, involucriū est calyxq; quo in spissamēta vnguentarij vniuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria : sistit vlcera quæ depescunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis : prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat : datur bibendum congruè, renum, vesicæ, & viscerum vitijs : vuluæ ac ventris fluxiones sistit : scabiem cum resina, & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Involutusq; in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit, quæ borassus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

Malum punicum omne boni succi est, stomacho Vulgò malcho vtile, perexiguum sufficiens alimentum granatum. Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed tum aliquantulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, vnde in febre abdicantur. Acida adstringit

stringunt, æstivanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac urinam cient. Ora gingivæq; ledunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccant, & obsonijs insparsi, concoctive, fluentem alium stomachumq; sistunt. Cælesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad desessus dysentericorum, scæminarumq; fluxione vulvæ laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis ulcera, nomias, redivuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores, & narium vitia: præsertim acidorum.

Cytinus.

Huius flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant, quas punicum, præstant virilitates: humida gingivarum vitia mobilesq; dentes decocto colluuntur, herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. memoria tradunt, qui tres, quàm minimos cytinis deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum: eliquatur hypocistidis exemplum.

Malicorium.

Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui sidion appellant. Id spissandirum habet, & quos cytini, præbet usus. Decoctum radicis potius latus ventris tinea pellit, &

Balaustium.

easdem euocat. Balaustum sylvestris punici flos est, cytino similis, cuius complura genera reperiuntur: candidum, fulvum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstr

adstrictoria vis inest, eadem faciens, quæ hypoci-
stus, & cytinus.

Myrtus. CAP. CXXVIII.

MYrtus sativa nigra utilior est medicina
quàm candida, & in hoc genere multò
magis montana: semen tamen imbecillius parit.
Vis & myrti & seminis adstringit. Semen viri-
de aut aridum in cibo datur sanguinem excreanti-
bus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus
baccis expressus eosdem effectus exhibet: stomaz-
cho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij
morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis de-
coctum capillum tingit, ius decocti in vino ulcera
in extremis membris nata sanat, oculorū inflam-
mationes illitum cum polline polentæ lenit, cōtra
ægilopæis illinitur, crapulam arcet præsumptum
vinum, quod feruefacto aliquantum eius semine
exprimatur: aliàs enim acorem cōtraheret. Præ-
stat idem seminis effectus. Utile procidentia vul-
narum in desessionibus, sedis vitijs, & fœminis flu-
xione vulvæ laborantibus: purgat furfures, ulce-
ra capitis manantia, atque eruptiones papularū:
fluentes capillos continet. Additur quoque in me-
dicamenta, quas liparæ vocant, uti oleum quod
ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad
desessiones balnearum convenit, & contra laxa-
tos artus, & malè solidescences. Eo fracta ferru-
minationi repugnātia utilissimè foveantur, vitili-
ginem emendat, purulēis auribus infunditur, &
capi

capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis ulceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, celiacisq; profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arenium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumq; perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Ex primitur folijs succus adfuso vetere vino aut aqua celesti, cuius recens usus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidænum dicitur, adnatum inæquabile, verrucosum intumescensq;, & concolor: quod perinde quasi manus myrti caudicē amplectitur. Magis quàm myrtus adstringit: tusum addito austero vino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra, multò efficacius, & folio & semine, cerato, pessus, infusionibus, cataplasmatibus admistum, ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia. CAP. CXXIX.

Cerasia alio utilis sunt, si viridia sumantur: eadem siccata, illam sistunt. Gummi quod cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetustæ medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Siliq

Siliquæ. CAP. CXXX.

Silique recētes stomacho aduersantur, alium Græcis Cēs-
solum: eadem siccata sistunt, stomachoq; ratia: arbor
vtiliores sunt. Vrinam ciunt, sed præcipue, quæ autem ipsa
vinaceis conduntur.

Galeno ce-
ratoria di-

Mala. CAP. CXXXI.

Folia, flores, & germina cum omnis mali, citur.
tum maximè cotonea adstringunt. Pomis
acerbis adstringendi vis inest: maturis verò longè
secus. Eæ ijs vernabilem gignunt, nervos omnes
lædunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho
vilia, urinam ciunt: verum tosta mitiora habentur.
Prosunt coeliacis, dysentericis, purulenta ex-
tussientibus, cholericis, præsertim cruda. Mace-
ratorum liquor commodè in stomachi aut ventris
fluxionibus, potui datur. Succus crudorum as-
sumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fo-
uentur vuluæ, & sedes si procidant. Cotonea quæ
melle conduntur, urinam mouent: mel autem si-
bi constringentem illorum vim, & inspissantem
adsciscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho at-
que ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cru-
da cataplasmati adijciuntur, ad cohibendam
alium, aut si stomachus æstuet, aut in vomitio-
nes effundatur, ad mammarum inflammatio-
nes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum
ex ipsis tasis expressisq;: sed quò perduret, quin-
decim sextarijs succi vnus mellis adiungitur, alio-
quin in acorem degenerat. Prodest ad omnia,
quæ

quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod melinæ vocauimus, quo vtimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata: quæ verò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vtilia. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderat, inflammationibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis. Contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent. Aestiuosa. Ea multis dulcia mala vocantur. Epitrotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia: sistunt aluum, urinæ euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Persica poema matura tam stomacho, quàm vètri vtilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui stomachiq; fluxiones sistit.

Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora.

Medica mala Persicæve aut cedromela, quæ Latini citria vocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum, semen habet pyri. Id in vino potum venus resistit. aluum mouet, oris suauitatem commend

mendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiarijs impositum ab erosione vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra. CAP. CXXXII.

PYrorum multa genera, quæ tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esuiata ledunt.

Achras pyrastræ genus est, quod tardissimè ematurescit. Vim pyro adstringentiore habet, & ad eadem conuenit: stringunt etiã eius filia. Ligni pyrorum: cuius efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Mespilus. CAP. CXXXIII.

MESPILUS, quæ à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyxacanthæ: fert pomum suauis, exiguo malo non dissimile, tribus intus ossiculis: quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. Tardè maturescit, esui adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit. Alteriõ mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui setanum, alij epimelida vocant. Arbor folijs mali, sed minoribus: pomum fert rotundum esui aptum, umbilico latiore: quod adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. CAP. CXXXIIII.

LOTUS arbor est vastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibus gra-

G.

tam, stomacho facilem. Alium sistit baccis. Ramen-
torum ligni decoctum siue potu, siue infusione
dysentericis ac foeminis fluxione vulvae laboranti-
bus, auxilio est: rufat capillos, citam alium cohibet.

Cornus. CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oliuae
modo oblongas, quae primum viret, dein per
maturitatem rubescunt, aut cerae colorem reprae-
sentant. In cibo adstringunt, profluvio alui atque
dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in desuto
exhibeantur. Muria, ut oliuae, condiuntur. Sanies,
quam virentia folia torrendo resudarunt, impeti-
gini convenienter illinitur.

Sorba CAP. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referentia prius, quam
maturescant, dissecta & sole siccata mandun-
tur, ut album sistant. Eadem est functio molitorum
farinae, si polleta loco sumatur: quod & decoctum
eorum in potu praestat.

Prunus. CAP. CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed
stomachum male habet, alium mollit. Syria-
ca prima, & praecipue quae Damasci gignuntur,
exiccata stomacho utilia sunt, alium adstringunt.
Folia pruni in vino decocta collutione, & gar-
gariatu ruam, gingivas, & tonsillas fluxione la-
borantibus reprimunt. Praestant idem sylvestrium
prunorum baccae, post maturitatem exiccatae: cum
sapa verò decocta, stomacho utiliores redduntur,
alium

aliumq; magis adstringunt. Gummi primorū agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus.

CAP. CXXXVIII.

ARbutus siue vnedo arbor est cotoneæ malo nō dissimilis, tenui folio: *cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic mem. cc. ylo cognomen est: maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisq; dolorem mouet.

*Prunis magnitudi-
ne quidē
hic fructus
nequaquā
cedit: cæte-
rū effigie
adeo ex-
pressè re-
fert fraga,
ut nil que-
at expres-
sius.

Amygdalæ.

CAP. CXXXIX.

AMygdalæ amaræ radicū tritarum deco-
ctum vitia cutis in facie corrigit: illitæ nu-
ces idem munus præstant, menses admotæ ciunt,
capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut tempo-
ribus cum aceto vel rosaceo: epimyctidas sanant
ex vino, item putrescētia vlcera, & quæ serpunt,
& morsus canū cum melle: earum autem esu do-
lores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt,
vrinam cient, contra sanguinis reiectiones cum
amylo assumuntur, renum vitijs, & pulmonū in-
flammationibus ex aqua in prui aut eclegmate
cum resina terebinthina dantur: calculosis diffici-
liq; vrinæ in passo auxiliantur, & illinctu cum
melle, & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus co-
li, nucis auellane magnitudine: quinis septenisve
presumptis ebrietatem non sentiunt potiores: vul-
pes si cum quadam esca eas vorauerint, emorimur

tur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijciēti-
bus sanguinem, potius auxilio est: impetigines quæ
summum corpus occuparunt, illitum cum aceto
collit: tussi vetustæ cum diluto vino potum mede-
tur: calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus
græcis, dulces cibo idoneæ, sed multo minus valent
in remedijs, quàm amaræ: attamen extenuant,
vrinam ciunt, recentium esu cum suo putamine,
humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia.

CAP. CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis
nucibus similia sunt, & stomacho amica: tri-
ta cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue
edantur, siue bibantur.

Nux iuglans.

CAP. CXLI.

Nuces iuglandes, quas nonnulli Persicas vo-
cant, sunt difficiles concoctus, stomacho inu-
tiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussienti-
bus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ.
Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo
cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni hauri-
stu comedantur: largius esitata tinea latas pel-
lunt, illinuntur mammarum inflammationi, ab-
scessibus, luxatisq; cū mellis exiguo, & ruta: cum
cepa autem, sale & melle, canis hominisq; morsui
proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, &
umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum
tritumq; in oleo, & vino, infantium capite permi-
sto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistit men-
ses

ses nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur: ydem e veteribus, illiti carbunculis, gangrenis, & agi-
lopijs medentur: alopecijs commanducati, & im-
positi presenti sunt remedio. Nucibus tussis oleum
exprimitur. Recetes stomacho innocentiores sunt,
vt pote suauiores: itaque allio mista eximunt acrim-
oniam. Liuires in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanae. CAP. CXLII.

Nuces auellanae, quas & leptocarya vocant,
stomacho infesta sunt: ipsae tamen tritae, &
in aqua mulsa potae, tussi veteri medentur: tosta
& cum exiguo piperis pota destillationem con-
coquunt, crematarum cinis cum axungia aut
adipe vrsi perunctus alopecijs capillum reddit.
Aunt nonnulli vsta earum putamina, & in ci-
neris speciem redacta, cum oleo, caesiorum oculorum
pupillas infantibus denigrare, persuso sincipite.

Morus. CAP. CXLIII.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum
soluit, stomacho inutilis est, & facile cor-
ruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus:
decoctus autem aereo vase atque insolatus, ad-
stringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas,
& tostillarum inflammationes, addito mellis exi-
guo. Sed inolefcit vis eius, adiecto scissili alumine,
galla, croco, & myrrha: item myricae semine, iri,
& thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq;
acinorum rhois vice obsonijs miscentur, vt coelia-
cos inuēt. Radicis cortex decoctus in aqua & po-

tus aluum resoluit, latas ventris tineas excutit, his quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustus igni medentur, tinguntq; capillum, vitium & fici nigrae frondibus simul coctus in aqua celesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruifacili corticis & foliorum iure dentes apertissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie coëcretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

SYCOMORUS.

CAP. CXLIIII.

SYcomorum aliqui etiam sycaminum, id est, smorum, vocant, cuius fructus sycomoru etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans: folijs mori, pomis ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico non dissimile, dulcius grossus, sine granis interioribus: quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus: ubi prouentu fecundo restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonae caritas premit. Pomum alio utile est, sed perquam exilem prabet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructu ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga viol

violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. Celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit ulmus, prædita tamen est folijs sycomori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supra dictis cætera similis.

Fici.

CAP. CXLV.

Fici maturæ recentes stomachum ledunt, aluum solvunt: sed facile contracta ab eis fluxio sistitur. sudorem euocant papulasq; sitim sedant, calorem restinguunt. Siccis natura excoquendi, vires alunt, sed sitim magis stimulant aluo viles, rheumatismis ventris & stomachi contraria: gutturi autem, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ: seruefactæ cum hyssopo & potæ, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conueniunt: aluum molliunt tussæ cum nitro & cnico, dein manducatæ. Decoctum arteriæ & tonsillarum inflammationibus gargariæzatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmati miscetur, & in muliebres fatus cum fenogrecæ & pisana. Cæterum cum ruta coctæ tormini-

bus infunduntur. Coctæ illitæq; duritias discutit,
 parotidas & furunculos emolliunt, panos ad ma-
 turationem perducunt, maximè nitro, iri aut cal-
 ce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, ea-
 dem efficiunt: cum malicorio, pterygia purgant:
 cum atramento sutorio, deploratis ferè tibiæ
 fluxionibus, & cacoëthis ulceribus medentur:
 quin & cum vino decoctæ addito absinthio &
 hordeacea farina, utilissimè hydropicis illinuntur,
 Crematæ cum cerato sanant periuones, prurigi-
 nes, sonitusq; si crudæ terantur, & sinapi liquo-
 req; aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam syl-
 uestris, quàm sativæ fici lacteus succus coaguli
 modo lac contrahit, concretumq; dissolvit, ut ace-
 tum: exulcerat corpora, meatus aperit, solvit al-
 uum, vulnam recludit cum detrita nuce græca
 potus, menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut
 Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatibus
 cum farina fornigræci & aceto utilis: lepras, li-
 chenas, vitiligenes, vitia cutis in facie, psoras, ul-
 cera in capite manantia, cum polenta expur-
 gat: instillatus plagæ, percussis à scorpione,
 venenatorum ictibus & rabiosi canis morsibus
 auxiliatur: prodest dentium dolori lana exce-
 ptus, & canis eorum additus: verrucarum in-
 formicationes tollit cum adipe, circumlita in am-
 bitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris
 ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, si-
 lente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & sic-
 cat

catus in umbra reponitur. Et lac & succus impo-
nuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum
bulbulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt
decoctionē. Lac efficiūt quod magis soluit, si inter
coquendū ficulneo surculo spathæ loco moueatur.

Grossi.

CAP. CXLVI.

Grossi, quæ crinei nonnullis vocantur, coctæ,
illitæ strumas nodosq; omneis emolliunt: cru-
de formicas, verrucas & thymos, nitro farinaq;
additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sa-
le & aceto vlcera in capite manantia, epinyeli-
das, & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes,
& genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus
folijs, cauliculisq; candidæ vitilignes peruguntur,
faciūt ad canū morsus, & vlcera quæ ceria, id est
fauos, vocant. Grossi cum syluestris papaueris fo-
lijs ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiūt,
contra muris aranei morsus, & scolopendræ vene-
na, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur. Fit ex ci-
nere ficus tam syluestris quàm sativæ lixiuiū, cre-
matis ramorū cauliculus: quod subinde macerari
opus est & inueterascere: siquidem inter caustica
intelligitur. Gangrænis prodest: nanque ex-
purgat & consumit, quæ excrescūt: eoq; sic uten-
dum est: Spongia assidue hoc lixiuiū imbuta su-
perponitur. Interdum dysentericis, & in fluxio-
nes vetustas, & sinus cuciculatim exedētes, ma-
gnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, con-
gluminat, carne replet, & oras cōmittit, non secus

G s

atq; emplāstra quæ cruentis vulneribus inijciuntur, enema vocāt. Bibitur ad discutiendū sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, cōulsa, cum cyatho aque recentier colatū: addito olei exiguo, cæliaci, dysentericis per se cyathus datus prodest: nervorū vitijs, convulsionibus com-
modè illinitur ex oleo, utpote quod sudores moveat: aduersus gypsi potum, & phalangiorū morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt.

Persea. CAP. CXLVII.

Persea arbor est, in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho vilem: in quo phalāgia cranocolapia nomine inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinā redacta, illitu sanguinis eruptiones sistūt. Arborem hanc prodiderūt aliqui in Perside exitiosam esse, trāslatāq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. CAP. CXLVIII.

Iberis siue cardamantica, folia habet nasturtij, vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorem: in incultis nascitur, æstate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurētes: ipse enim ischiadicis cum salsa axungia emplastri modo viiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locis perungatur.

PRIMI LIBRI FINIS.

PEDANII

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

*Medicinali materia,**Liber II.*

Ioanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



In primo charissime Aree libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lacrymis, seminibusq; disseruimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexus herbaceis quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cum ipsius cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires dis-iunxisse videamur.

Echinus siue crinaceus. CAP. I.

Marinus echinus stomacho ventriq; utilis
Mest: urinam cit, huius testa cruda inas-
sata commodè medicamenti admiscetur, quæ
psoras abstergunt: cremata verò cinis sordida
ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit.

Terr

Terrestris erinacei corium combustum alopecij
cum pice liquida aptissime illinitur, assiccatum
corpus & cum aceto mulso potum, renum vilijs
auxilio est: item aquæ quæ cutem subijt, conuul=
sionibus, elephantia, & malè habitis, quos cache=
ctos vocant: viscerum fluxiones exiccat. Eiusdem
iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem
usus utilissime reconditur.

Hippocampus.

CAP. II.

Hippocampus marinū animal est exiguum.
cuius cremati cinis exceptus cum liquida
pice, aut axungia seu amaracino unguento illitus,
alopecias replet.

Purpura, buccina, eorumq; volutæ.

CAP. III.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, ex=
crescentias in carne cohibet, vlcera purgat,
& ad cicatricem perducit. Eadem præstant con=
cremata buccina, sed vehementius vrunt: si quis
salis plena, fictili crudo adurat, dentifricio conue=
niunt: ambustus vtiliter illinuntur, quibus solui
medicamentū non oportet: nam postea quā vul=
nus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum
induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx è
buccinis, ut in eius mentione demonstrabimus.
Cionia vocantur purpurarum buccinorumq; me=
diæ partes, circa quas testæ volumen clavicula=
tim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem
purpuris buccinisq; facultatem vrendi cōsequun=
tur.

tur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ sunt, & stomacho utiles: sed aluum non molliunt.

Mituli.

CAP. IIII.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinus effectum præbent. Priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: genarum crassitudines absumunt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt: carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

Recentes tellinæ alio utiles, sed maximè ius earum: salitæ vruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, amulos pilos * renasci * τὸ βαλεφά- non patiuntur. πωρ.

Chamæ.

CAP. VI.

Chamarum conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur.

Vnguis odoratus.

CAP. VII.

Vnguis siue onyx conchylj tegumentum est, ei simile quo purpura integitur: quod in Indiæ nardi feris lacubus inuenitur. suauem ideo spirans odorem, quòd conchylia inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaquàm stagnantes aquæ æstius squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur.

citur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquā-
nus castoreum olent. Idem suffitu excitant fœ-
minas vuluæ strangulatu oppressas, comitialesq;
poti ventrem molliunt. Crematum conchylium
eadem efficit quæ purpura & buccinum.

Cochleæ.

CAP. VIII.

Terrestris cochleæ stomacho utiles sunt, &
non facile corrumpuntur. Optimæ Sardoni-
cæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia, ac
Chio gignuntur, & quæ in Liguria alpibus, po-
matia, id est operculares, cognominatæ. Marina
stomacho idonea, & facile alio excernitur: fluui-
tilis virus olet. Quæ verò repribus fructusq; glu-
tinata coheret, quam vocant nonnulli sesilon,
ventrem & stomachum turbat, vomitiones exci-
tat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & vren-
di naturam sortiuntur: purgant lepras, vitiligi-
nes, dentesq; : emendant oculorum cicatrices, &
vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudi-
nes, si cum carne sua vstæ tritæq; ex melle illinan-
tur. Crudæ cum tegumentis impostæ, aquæ inter
cutem tumores exugant: sed non ante soluantur,
quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflam-
mationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ
euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes ea-
rum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera a-
lia, tum maximè quæ nerui acceperunt, congiuti-
nant: tritæ in aceto, sanguinè naribus erumpentem
infrenant: viua corpus, & præsertim Aphrica-

na

na cum aceto deuoratum, stomachi dolores miti-
gat, trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum
inde bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanat. Terre
stris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu
lentore eius, pilum attingat.

Canceri.

CAP. IX.

Cancrorum fluuiatiliū exustorum cinis
qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio
radicis gentianæ modo, triduo potus cum vino,
magnopere predest canis rabiosi morsibus: ri-
mas pedum sedisq; perniunculos, & carcinoma-
ta, cum decocto melle lenit: triti crudi, poti-
q; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium pha-
langiorumq; morsus, atque scorpionum ictus: de-
cocti autem & cum iure esitati, ijs prosunt qui
tabe consiciuntur, aut leporem marinum hause-
runt: necant scorpiones triti, & cum ocimo admo-
ti. Possunt eadem marini, verum inefficacius o-
mnia præstant.

Terrestris scorpio.

CAP. X.

Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ
plagæ remedium est: quin estur assatus,
ad eadem.

Marinus scorpio.

CAP. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones
oculorum, albugines, & hebetudines.

Draco marinus.

CAP. XII.

Draco marinus dissectus & apertus imposi-
tusq; ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

SCO

Scolopendra.

CAP. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos: sed contactu pruritus facit.

Torpedo piscis.

CAP. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet: eadem appposita eversam sedem prociduamq; coërcet.

Viperæ.

CAP. XV.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, nervorum vitijs auxiliantur, incrementum strumas reprimunt: detracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne vacant, amputari debent. quippe commentitium est quod precipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. Reliquum verò corpus exëptis interaneis elotum dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs qui viperas escent, pediculos procreari: quod planè à veritate abhorret. Adyiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viva autem vipera in fictile nouum demittitur, adyiciuntur salis caricarumq; tritarum, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris facië, reconditur. Plerumq; ut ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

Senect

Senecta anguium. CAP. XVI.

Senectus anguium in vino decocta dolori aurium, infusus. & dentiū collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè viperinam.

Lepus. CAP. XVII.

Lepus marinus loligini parua similis est, quæ per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui valetudine contracti sunt: affricus aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulatum post triduum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vulnæ & alui fluorem sistit, comitiales iuuat, cōtra venena ex aceto bibitur, præsertim aduersus cōcretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginesq; sanat.

Pastinaca. CAP. XVIII.

Marine pastinacæ radius, quæ eius caudæ Menatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nā eos frangit, & euocat.

Sepia. CAP. XIX.

Sepiæ cocta dum estur atramentum agrè concoquitur, aluum mollit, collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritia perficitur.

ritum in sua testa donec id quod crustosum est
abscedat, postea tritum, expurgat vitiligines, fur-
fures, dentes, & vitia cutis in facie: elotum in me-
dicamenta oculorum addi solet: contra albugines,
oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia
oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

Mullus piscis.

CAP. XX.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorum he-
betari constat. Is marini draconis, aranei,
ac scorpionis morsibus medetur, si crudus atque
dissectus admoveatur.

Hippopotamus.

CAP. XXI.

Hippopotami testes exsiccati ac triti contra
serpentium morsus bibuntur.

Fiber.

CAP. XXII.

Fiber ancipitis vitæ animal, plerumque cum pi-
scibus & cancris ex aqua victum capessit.
Huius testes serpentium venenis adversantur, ster-
mistamenta mouet, & in vniuersam varios obtinet
usus: siquidem menses ac partus ciunt, duabus
drachmis cum pulegio poti: partus secundasque ei-
ciunt: contra inflationes, tormina, singultus, ve-
rena, ixiāque ex aceto bibuntur: lethargicos, &
victumque veterino obdormiscentes excitant infusi:
cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odore sus-
fitu, idem faciunt: poti & illi profunt tremulis,
convulsionibus, & omnibus nervorum vitis. In
summa, calfactoriam vim habent. Eligi debet te-
stes qui ex uno ortu conexi sunt (fieri enim non po-
test,

test, vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui & virus redolente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quæ fraude aliqui corrumpunt, coniungentes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, quæ renatu vrgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, vt in sue, substricti. Opera autem pretium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiète tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris.

CAP. XXIII.

Mustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccat. Ea binis drachmis cum vino pota, aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius ventriculus coriandro factus inueteratusq; percutus à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in sicili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine peructe stramine, iuuantur: comitialibus etiam prodest.

Ranæ.

CAP. XXIIII.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusq; earum itidem sorbeatur: contra inueteratos tendinum rigores pollem. Illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit: exple-

H 2

dis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illi-
nitur. Viridium ranarum cruor auulsos genis pi-
los renasci prohibet, in vestigia emulforum instila-
latus: decoctæ in aceto & aqua, denium dolores
collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXV.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem præ-
bet aluum: sale verò conditus, minimū suppe-
ditat alimentum. Arteriam expurgat, & vocem
expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpo-
ri spicula extrahit. Muria eius incipientibus dy-
senterijs prodest, si in desidentium fetus adijcia-
tur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit:
ischiadici infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVI.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes
ulcerum oras puluillosq; reprimat: nomas co-
hibet, thymos clauosq; absument. Caro non secus
atque salsamentum prodest à scorpione percussis,
aut à cane demorsis.

Mænar.

CAP. XXVII.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur,
callosas sedis rimas abolet. Eius etiam ga-
rum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius.

CAP. XXVIII.

Gobius recens in fœillum ventrem comectus,
si cōsuta rima in duodecim aquæ sextarijs,
donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub
diu refrigeratus potui detur, aluus sine molestia
deijc

deicitur. Illius contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

Thunnus.

CAP. XXIX.

Conditanei thumi caro, quam omotarichon vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinum quamplurimum subinde cogantur haurire, ita ut vomitione reddatur. Contra acrimonijs esitatorum maxime valet, canis moribus vilissimè illinitur.

Garum.

CAP. XXX.

Carum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fatus fiat, depascētia vlcera sistit: morsus à cane medetur, dysentericis atque ischiadicis infunditur: nonnullus, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad lacefenda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium.

CAP. XXXI.

Recentium piscium ius, modo per se, modo ex vino potum, alium subducit. Præsertim ad hunc usum conficitur è phrycidibus & scorpionibus, & iulide: è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec virus respicientibus, simpliciter cum aqua, oleo & anetho.

Cinices leſtularij.

CAP. XXXII.

Cinices qui in cubilibus enascuntur, canis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussus ab aspidē profunt: vuluarum examinationes olfactu reuocant: poti

cum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti & vrinaria fistulae impositi, vrinae angustias leuant.

Millepeda.

CAP. XXXIII.

Millepeda, quae sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quae contacta manu contrahuntur in orbem: haec ex vino potae difficili vrinae, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cum melle vtilissimum. Trita, & in cortice mali punici calfacte, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blata pistrinaria. CAP. XXXIII.

Blata eius quae in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillati mitigant.

Pulmones.

CAP. XXXV.

Podagras pernionesque emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus. Suillus & agninus vrsinusque; pulmo impositus attritus a calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus vero si arefactus bibatur suspiciosos adiuuat. Adeps quoque liquefactus, infususque, auris dolorem finit.

Genitale cerui.

CAP. XXXVI.

Genitale cerui tritum & in vino potum, a vipera demorsi auxiliatur.

Vngula asini.

CAP. XXXVII.

Vngularum asini cinis per dies multos bibis

ms

nis cochlearibus potus proditur comitiales adiuuare, eadem oleo subacta strumas discutunt: & illita per nionibus medentur. Caprinarum cinere peruncta ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & * su = * κατ' ἐπι
per ungulas in flexu harum partium indu- γναφλὸν νό
rati calli: qui triti & in aceto poti, comitialibus ἐπι γα-
mederi traduntur. φλὺ.

Iocinera.

CAP. XXXIX.

Asim iecur inassatum esu comitialibus prodest, veruntamen ieiunus edendum præcipitur. Caprae verò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius vaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex vino potum contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur, tostum & in cibo ab emorsis sumptum, ne tentetur metu aque tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pavores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à cane, qui momordit exceptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum, secundis pellit.

Coria veteramentaria. CAP. XL.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum

atritus sanat.

Gallinæ.

CAP. XLI.

Dissectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur cōtra serpentium morsus, sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquendum abiici solet) siccat, tritaq; in vino cōuenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è vetere gallinaceo aluum deiecit. Abiectis itaque interaneis salem conijci oportet, & confuto venire decoqui in viginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur: totū id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt plus marinum, mercurialem, cucurbitam, aut sili culam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

Ouorum natura.

CAP. XLII.

Ovum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores vtile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomatus, cum meliloto: cum vna autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat: per se etiam offerri solet.

Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta

entis

cutis occludit, inflammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tuetur, fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertitq;: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & vino, mitigat: vtiliter contra hemorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Cicadæ. CAP. XLIII.

Cicadæ, quæ in assatæ manduntur, vesicæ doctoribus prosunt.

Locustæ. CAP. XLIIII.

Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates adliuant, præsertim quæ feminas malè habet: earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus locustæ, quæ asiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abundè vescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

Osisifragus. CAP. XLV.

Venter eius avis, quam Latini osisifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

Galerita. CAP. XLVI.

Galerita anicula est parua, apicem in ver-

rice, pavonis modo, gestans: que assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuvat.

Hirundines. CAP. XLVII.

Dissectus crescente luna pullus hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore varium, alterum purum eximes: ij priusquam terram attigerint, in iuventa corio, aut cervina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & saepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedule, in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam puliorum, quam matrum in fistili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginae eo commodè perunguntur: vix & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipse & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuvât, qui anginae morbo conflantur.

Ebur. CAP. XLVIII.

EBoris scobe illito paronychia sanatur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. XLIX.

Svis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus inflationibus coli, longusq; torminibus medetur.

Cervinum cornu. CAP. L.

Cervini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, coeliacis, regio morbo, & vesicae doloribus

bus cum tragacantha: feminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, vruiur donec albescat: id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum, & de fluxionibus salutare est: infriçtum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: seruefactum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Eruca. CAP. LI.

ERUCIS, quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestijs feriri negantur.

Cantharides. CAP. LII.

EFRUMENTIS congestæ cantharides ad reconduendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro lineo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis, quam accerrimi halitus, donec æstu exanimantur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in penis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ ac blattarij modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

SIMILI modo recoduntur buprestes, genera quædam cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere,

dere, ulcerare, calorem elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis quæ lepras, ferasq; lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui cantharidas antidotis impostas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quòd urinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Salamandra. CAP. LIIII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfacturiam, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem vsum.

Araneus. CAP. LV.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est lupum vocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; vtriusq; temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamq; telam orditur: quem in alut a ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lac

Lacerta. CAP. LVI.

Lacerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: varos, formicantes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum dolores finit. Si diuulsa admouetur, ictus à scorpione leuamentum præstat.

Seps. CAP. LVII.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus. CAP. LVIII.

Scincus aut Aegypti, aut India, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nascitur. Aunt *ἰδιόργωνες* carnes, quæ renes amplectantur, id sibi virium *ταρταρόν* vendicasse, ut si dracma pondere bibantur, vene *μύλον* rem accendant. Verum decocto lentis cum melle *ναρδάμω*, aut semine lactucæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

Terreni vermes. CAP. LIX.

Terreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutunt: decocti cum anserino adipe, & infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillentur, dentium doloribus præstant auxilium: triti in potu ex passo urindam ciunt.

Musaraneus. CAP. LX.

Mus araneus dissectus, & impositus, sui mor

morsus veneficia lunt.

Mures. CAP. LXI.

MVres, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, in confesso est: si inassatos infantes ederint, oris salinum exiccati promittunt.

Lac. CAP. LXII.

LAc generatim omne boni succi est: corpus alit, aluum emollit, stomachum & intestina inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstius habetur, & è viridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, equali crassitudine, quod rugui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Omillum autem dulce, crassum, & præpingue, non vsque adeò utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, ventri magis idonea: sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scammoniam, veratrum, clematidè, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrè & stomachum subvertit, quale in Iustinis montibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capræ, quibus candidum veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt: & eorū lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Ventrem adstringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exustum.

& in summa, omnibus auxiliatur internis exulce-
 rationibus, præsertim faucium, pulmonis, intera-
 neorum, vesicæ, & renū: foris verò contra pruri-
 tum cutis, eruptiones papularū, & vitiatos corpo-
 ris succos, recens cum melle crudo, addito sale, da-
 tur exigua aqua dilutū. Minus inflat quodcumq;
 semel feruefactū. Decoctum cum calculis marinis
 ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuvat.
 Lac quodcumq; serum continet implicitum, quod
 ubi discessit à lacte, multò potentissimum ad pur-
 gationes redditur. Datur quibus sine acrimonia
 volumus deiectionem moliri, ut melancholicis, co-
 mitialibus, lepris, elephātijs, & erūpentibus toto
 corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistū,
 id est scissile, appellant. Lac autē fictili nouo fer-
 uet, ramq; ficulneo recenti monetur, insparsis,
 postquam bis aut ter efferbuerit, totidem acetū
 mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis: ita enim
 ferescens liquidū ab eo diuiditur, quod in caseum
 concreuit. Sed cum feruet, ne supersundatur, con-
 ueniet sponsia ex frigida continuo fictilis labrum
 detergere, sextariumq; argenteum frigida aquæ
 plenum demittere. Bibitur heminis per intervalla
 singulis, vsque ad quinās, ita ut intercedentibus
 spatijs, potantes ambulent. Lac autem recens ef-
 ficax est contra rosiones vstionesq;, ab exitiali-
 bus medicamentis factas: uti à cantharidibus, aut
 salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyo-
 scyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero: præfer-
 tim

tim bubulum ad id eximiè confert. Gargarizatur autem exulceratus faucibus, tonsillisq;. Asinum peculiariter collutos dentes gingivisq; stabilis. Fluxiones alii, si ulcera sentiantur, tenesmosq; ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem & cum hordeacea ptisana aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorum rofiones mitigat: exulcerata & vulua immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maximè alit: mammis autè exuctum, prodest tibi, & stomachi rofionibus: contra haustum leporem marinum praesidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum praebeat. Primiparae canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra venena antidoti vicem obtinet. abortus mortuos expellit.

Caseus. CAP. LXIII.

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, & facile in membra delegatur: corpus auget, aluum modicè emollit: alius tamen alio praestantior, pro natura lactis à quo conficitur. Decoctus autem, & expressus, deinde infusus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens salit

salutis est, minus alimēti præbet: corpus ap' e' minuit, stomacho aduersatur, negotiū ventri interaneisq; exhibet: vetustiore sistitur alius. Sero quod à caseo manuit, quamoptimè canes alit' ur. Quod hippacē vocant, caseus est equinus: ea virus redolet, magnopere alit, bubulq; proportionē respondet. Nec desunt, qui hippacē, equinum coagulum appellarint.

Butyrum & eius fuligo. CAP. LXIII.

E Lacte pinguisimo probatū sit butyrū, quale ouillum est: sit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est & emolliens: unde largius epotum, ventrē resoluit: prodest, ubi oleum non adsuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuvat: gingivarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec vetustatē sentit, butyrū eff. cax est: dysentericis, & colli exulcerationibus infunditur: in medicamenta addi solet, quæ pus mouet: utile præsertim cū nerui, aut cerebri mēbranæ, vesicæ ceruicæ, vulnera acceperit. Id autem purgat, replet carnem creat, ab aspidē percussis vtilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernā no-

nam ingestum accenditur, fœtilique operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exicare & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

Medicina lanarum. CAP. XLV.

Succidæ lanæ molles, è collo feminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, obstibus fractis, aceto, oleo aut vino imbutæ: siquidem facile succos combibunt quibus immerguntur, & ob pecudum sordem (sic enim asypum vocant) emolliunt: capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Munde autem & carptæ, in fœtuli crudo, cæterorum more, vruntur. Nec secus simbricati marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanis carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo vrunt. Alij in fœtuli oris patuli, verucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permuta-
tim

tim interstratis, leuiter succedunt, & vstas tollunt: quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta recoditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considere patiuntur: idq; sepius, mutantes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum.

CAP. LXVI.

Oesypum vocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinē. Cuius parandi ratio hæc est: Succida molles, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscumque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, vii respumet, agitur, aut lignea rinde validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: confidente pingui quod supernatabat, collectoq; in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterum mari persunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum oesypum manibus emollitur, & si qua incedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum lingue oesypum adstringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur: tum in fictili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigi-

da aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, conficiant: ita enim candidius redditur. Alij elotus lanis & sordibus quibuscumq; exemptis, ac lento igni in cneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satius crassum. Alij bidui spatio aquam effundunt, novamq; adducunt. Melius est læue, radícula non curatum, quod succidarum virus oleat, & si manus in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens: veluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit: præsertim sedis ac vulvæ, cum melibito & butyro: invellere appositum, menses & partus evocat, ulcera non aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genus quæ occalluerunt, & ciliorum defluvia, efficax est. In testa nova torretur, donec reductum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstravimus: quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

Coagulum. CAP. LXVII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum morsibus, cæliacis, dysentericis, & fœminis fluxione vulvæ laborantibus, ac reicellionibus à pectore, auxiliatur. Sanguinē in grumos

mos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant: potum verò partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocant, priuatim celiacis dysentericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubaliq; coagula similes naturas sortiuntur: contra aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires re præsentat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit syncerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata coigit, & coacta dissoluit.

Adeps. CAP. LXVIII.

Adeps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligen-

ter vase, flagrantissimo soli exponitur: elique-
 scens inde humor in fictile alierum excolatur,
 donec adeps omnis absumatur, mox loco vehemen-
 ter frigido reconditur, & ad vsus digeritur. Alij
 fictile fulcium super aquam calidam, aut tenuem
 & elanguidam prunam, quæ solis vicem pen-
 set. Est & alia curandi ratio: Exemptis mem-
 branis teritur, coniectusq; in ollam eliquatur,
 adiecto minuti salis momento: mox lineo colo-
 transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta
 additur, quæ lassitudines & suigationes leuant.
 Suillus adeps & vrsinus hoc curantur modo: Re-
 cens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in
 largiore aqua celesti & quam frigidissima, exē-
 pius tunicis, diligentissime manibus confricatur,
 & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua
 aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis dupla
 inditus, in aquam demergitur, & subditis leui-
 bus prunis spatha mouetur: eliquatusque, colo-
 trāsfunditur in aquam: ubi verò refrixit, & gut-
 tatim aquam omnem exclusit, in prælotum ficti-
 le demittitur, & insusa aqua leniter eliquari de-
 bet, & manu deprimi, quo facilius feculentum vi-
 rus pessum eat: postea in pilam spongia madesa-
 clam transfunditur. Vbi coire cæpit, residens in
 imo sordes eximitur. Tertio citra aquam eliqua-
 tur, repurgatusq; fictili benè operculato, perquam
 frigidis locis reponitur. Hircinum semur, ouillum,
 ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcumq;

tunicis, (vt in suilli mentione dictum est) exemptis, pile emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquid innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollâ fictilem conijcito, & adiecta aqua vt superemineat, leui prima liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. Tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratūq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maxime detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est: mox in pile tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, & marina aqua, quæ non minus dedrante superemineat, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticis minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum: operatumq; soli interdum credendum, vt ad candorē reducatur, & odoris virus euanescat. Præsertim taurorum pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum sale inasperferis, liquefacito: dein in nitentē aquam excolato, & ubi concrefcere cœpit, manibus ite-

rum confricando vehementer lauato, aqua sepius infusa refusaq; donec quamoptime elotū videatur: rursus in olla cum pari modo vini odorati decoquito, & cum iterum efferbuerit, depto ab igni vase, ibidem finito pernoctare: postridie si grauer adhuc oleat, noua olla repetitū, vino odorato perfundatur: eadem quæ prius fiant, dum omne virus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratum non magnopere albescit. Eodem modo pardorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem & vitulinum pingue, necnon ceruinum, atque etiam huius animalis medulla, odorem imbuatur, hac ratione: Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quæ diximus modo, membranis, elotum & vino quam odoratissimo, nulla maris aqua diluto, feruesactū, pernoctare finitur: alterū id genus vinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur: nouemq; eius hemini, iunci Arabici septem drachmæ adiunguntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casia modis adduntur: & xylobalсами, aspalathi singulæ drachmæ: cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie: omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit ter efferuescunt, & semoto ab igni vase inibi pernoctant:

stant: post die vinum effunditur, aliudq; generis
eiusdem adijcitur. Ter simili modo bene conserue=
scat. Deinde matutinis exempto adipe vini effun=
datur: & abluto vase, si quid imo subsidens hæsit,
detergatur. Postremò eliquatum pingue & exco=
latum, ad vsus reconditur. Hoc autem modo odora=
mentis imbuitur, quod antea curatum est. Verum
antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi
oderamentorum vires adsciscant. Itaque assinnens
quodcumq; horum viles, cum vino feruesfacito, im=
positis vni myrti ramulis, serpillo, cypero, item
aspalathi plenius tuso. Aliqui tamè ad hunc vsu,
vno duntaxat horum contenti sunt. Cum autem
ter efferbuit, exemptum leniter, & luteo colatu,
aromatus, uti expressum est, imbuitur. Adipibus
spissamenta sic fiunt (quemcumque acceperis, opor=
tet ut recens tundatur) Syncerus & sanguinis
expers adeps, reliquas habens notas quas sæpe
retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso vino
albo, vetere, odorato, quod semipedis altitudinem
superet: lento igni feruescat, dum vernaculus
odor aboleatur, planeq; vinum redoleat. At
ubi deposito vase refrigit, duæ adipis minæ in ol=
lam mittuntur, & duo vini eiusdè sextarij, & se=
minis loti, eius inquã cuius è ligno ludicræ tibiæ
facilitantur, tusi minæ quatuor adijciuntur: lento
igni subinde miscendo decoquuntur: cumq; odo=
ris virus euauerit, excolatusq; adeps refrixe=
rit, vna confusi aspalathi mina, cum amaraci=

ni floris minus quatuor, & vetere vino subigitur.
 Nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntve.
 Postridie in fictilem ollam tricongiam ea omnia
 cum adipe inuncta, additis sextarijs tribus vini,
 una feruescunt, quousq; & vim & odorẽ spissamentorum
 adeps ipse contraxerit: qui eliquescens colatur,
 & reponitur. Quod si maiore odoris fragrantiam
 efflagites, drachmas octo quam pinguis-
 simæ myrrhe vino macerata, quod multos in
 annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus anse-
 rinusq; sic odoribus imbuti solent: Cuiusvis eorum
 percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur: ery-
 siceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami
 planè contusi, singulorum sescuncia admiscetur:
 vini Lesbij veteris ciathus unus adiicitur: ea ter
 effervescunt prunis, mox vase sublato ab igne, die
 noctuq; refrigerantur: postridie liquata per lin-
 teum crassum, mundis in vas excolantur. Vbi ve-
 rò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo
 densius operto perfrigidus locus reponitur. Hyber-
 no tempore id instituere oportet: æstate siquidem
 pinguis non coguntur. Nec desunt qui Tyrrhe ni-
 cæ ceræ momentum adiciant, quò facilius in
 unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione
 suillus adeps & ursinus cæteri q; id genus, odora-
 mentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorẽ adeps
 ipse representabit hoc modo: Curati quamopti-
 mè adipis, præsertim taurini, mina una, tēpesti-
 uq; sampsuchi exquisitè cōfracti sesquimina mi-
 scen

ſcentur, & in ſperſo largiore vino digeruntur in offas, quæ in vafe cooperto nocte quieſcunt: matutinis in fictili olla leuiſculo igni, affuſa aqua, leuiter coquuntur: dumq; ſuum adeps odorem exuerit, defecatus ac bene opertus, nocte tota permanet: poſtero die deterſa ſorde quæ poſſum terat, ſam-
pſuchi, vt dictum eſt, cõuſi iterum ſeſquimini prio-
ri paſtillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogi-
tur: alijs quæ diximus peractis, decoquitur & co-
latur: & ſi qui fundo hæſit ſpurcitia, deraditur,
& frigido loco reconditur. Si quis tamen incurra-
tum adipẽ anſerinum, gallinaceũ, aut vitulinũ, à
putredine tueri velit, ita faciundum eſt: Quemvis
adipẽ diligẽter elotum & ſiccatum in vmbra ſic-
per cribrũ, per lintea munda manibus vehemen-
ter exprimat, linũq; conſutum vmbroſo in loco ſu-
ſpendat, & poſt multos dies noua charta inuolu-
tum, frigido loco recondat. Pingua autẽ indito
melle vindicantur à putredinis vitio. Vis omnium
eſt excaſfacere, mollire, rarefacere. Taurinus a-
deps, bubulus, & vitulinus aliquantum adſtrin-
gunt: earundem virium cõpos leoninus: nam reſi-
ſtere eũ aiunt ijs qui inſidias moluntur. Ceruino,
elephantinoq; perunclos, ſerpentes fugiunt. Ad-
ſtringentior eſt caprinus: qua ex cauſa decoctus
cum polenta, rhoẽ, & caſeo, dyſentericis datur, &
cum ptisanæ ſucco inſunditur. Ius decocti phthi-
ſicis in ſorbtionibus prodeſt. Datur quoque utili-
ter ijs qui cãtharidũ venena hauſerũt hircinus, vt
qui

qui validissimè discutiatur: podagricis auxiliatur, cum simo caprae & creco impositus: huic proportionem respondet ouillus. Suillus verò cōtra vulnē & sedis vitia idoneus est: ambustus igni medetur. E sue vetustissimus quisque sale conditus excalscit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus gallinaceusq; conveniunt mulieribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangoniꝝ andam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinū constat raptos vitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluviatilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Viperae adeps contra oculorum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alius emulsos perunctis radicibus recens & per se illitus oblitescit, atque renasci non patitur.

Medulla.

CAP. LXIX.

Laudatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, nisi quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullæ molliunt, calfi-

calfaciunt, rarefaciunt: vlcera explent, ceruina
perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes,
adipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossi-
bus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, do-
nec aqua sincera emanet: & deterfa sorde pēna,
si qua innatet, liquatæ in duplicato vase in pilam
exprimuntur: & ubi coire, omni fece, quæ ad ima
sedit, derasa, sictili nouo reponuntur. Quod si libet
incuratas repnere, facito omnia quæ de anserum
& gallinarum adipe demonstrauimus.

Fel.

CAP. LXX.

FEl omne curatur hoc modo: Recens præli-
gato ore folliculi lino tandiu demissum in fer-
uente aquam, dum quis spatium trium stadiorum
percurfaret, mox exemptū siccatur vmbroso lo-
co, asperginem non redolente. Sed quod ad oculo-
rum medicamenta adijci solet, ligatum lino in
vitreum vas, quod mel habeat, immittitur: cir-
cumuoluto ad os vasis lini principio, & operto
vase recōditur. Est enim vis omnium acris & ex-
calfaciens: intensis tamen & remissis viribus dif-
ferunt: siquidem præstantius in effectu esse vide-
tur fel marini scorpionis, & piscis qui calliony-
mus appellatur; marinæ testudinis, hænæq;
item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & sylue-
stris capræ: quod priuatim prodest contra suffu-
siones incipientes, & oculorū caligines, argemas,
& genarū scabritias. Onillo, suillo, hircino, atque
ursino, taurinū multò efficacius. Felle omni perfa-
cil

cilem, præsertim infantibus, deiectione quis molietur, si intinctum eo tomentum aut simbram sedi subiiciat. Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractus, & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur: & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur. Phagedenicis ulceribus, colis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quamoptime purgat. Ouillum & ursinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstāt. Ursinum eclegmate comitiales adiuvat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Sylvestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus, thymia abolet, & luxuriantes elephantorum extuberationes illius reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia, magno usu assumitur.

Sanguis.

CAP. LXXI.

Sanguis anseris, anatis & hædi, vilissimè in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbæ, necnon perdix, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisque illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cervi & leporis sanguis inassatus sartagine,

ne dysenterias & celiacorum profluvia sistit: in
vino potus contra toxica efficax est. Leporinus
sanguis ita ut tepet illitus, vitia cutis in facie, len-
tignesq; emaculat. Caninus commodè ab his bi-
bitur quo sefferata in rabiem bestia momorde-
rit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudi-
nus terrestris sanguinem epotum tradunt prodes-
se comitialibus. Marina autem testudinis cum vi-
no & leporis coagulo cum unoq; contra serpentium
morsus, & hausta rubet & venena, conuenienter
bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias
discutit, emollitq;. Sanguis equarum quæ admissu-
ram expertæ sunt, in medicamenta additur quæ
erodunt septica vocant. Sanguine chameleons ge-
narum palpebras euelli creditum est. Hoc enim
viridium ranarum sanguine præstatur. Mēstruus
sanguis foeminarum, circumlitus conceptum inhi-
bere existimatur, aut si omninò mulier menstrua
supergradiatur, leuat podagra dolores & ignem
sacrum illitus.

Fimium.

CAP. LXXII.

ARmentariæ bouis fimium si recens admo-
ueatur, vulnorum inflammationes mitigat:
folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere fer-
uenti superponitur. Coxendicis cruciatus fotu
compescit: illitum ex aceto duritias, panos, &
strumas discutit. Priuatim suffitus fimi, quod à
masculo bove redditum est, procidentes vuluæ
reprimuntur: accensi nidore culices abiguntur.

Fim

Fimum caprarum, præsertim in montibus de-
gentium, potum in vino, regium morbum emen-
dat: menses cit cum odorem haurit, &
partus euocat: tritum in farinam, & impositum
lanis cum thure, feminarium profluvia sistit, cæ-
terosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet: me-
detur alopecys exustum, & cum aceto aut oxy-
melite illitum: cum axungia verò impositum, his
qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum
in aceto decoctum imponitur serpentum morsi-
bus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & paro-
tidibus. Utilem ischiadici vñtionem hunc in mo-
dum accipiunt: In eo interstitio vbi pollex bra-
chiali committitur, cana veluti lacrima subsidet,
in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigil-
latim feruentes stercore capri pilulæ imponun-
tur, dum vapor per brachium ad coxam sentitur
peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adu-
stio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex
aceto illitum sanat epinyclidis, clauos, pensiles
verrucae, thymos, & ambusta igni, rosaceo cera-
to exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in a-
qua aut vino potum, reiectiones sanguinis sistit:
vetustum lateris dolorē mulcet, adrupta & con-
uulsa ex aceto bibitur, luxatis cum cerato rosaceo
medetur. Tam asinorum quàm equorum finum
siue crudum siue crematum, addito aceto, sangui-
nis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba
pascitur, siccum finum liquatum in vino, mox
potum,

potum, contra scorpionum iclus magnopere auxiliatur. Columbinum vehementius & excalfacit & urit, cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini semine & oleo: ambustus igni medetur. Gallinaceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen contra venena fungorum, & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. Ciconiæ finum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini finis nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis snyderæ fuerit exceptum, cum vino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginae perungi commodissimè traduntur. Terrestrius crocodili finum, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minimè pôderosa, in humore statim eliquescens: quæ cum teritur, fermèli acorem quadàmtenus refert. Adulterant eam sturnorum fino quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile vendunt. Alij amylium aut cimoliam miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paula-

K

tim expriment, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea vaneunt. Inter omnes consensire inuenio, humanum stercus caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Urina.

CAP. LXXIII.

Humanam urinam suam cuiq; bibere, contra viperæ morsus, ac venena, incipientemq; aquam inter cutē proderit: scorpionis, viperæ manuum, draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est: pruritus & ieprus nitro addito expurgat, sed velus vlcera capitis manantia, furfures, psoras, & fruidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus infusa manans pus supprimit: decoctaq; in calyce mali puuci, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in aereo vase cum melle emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illius ignem sacrum mitigat: feruesfactum cum cyprino, inditumq;, vuluæ dolores mulcet: strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina viribus eisdem prælita est: priuatim comminuit vesicæ calculos, & potum expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamq; per aluum extrahit.

extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renū vitæ mederi. Lyncis urinam, quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coirève in calculi duritiâ, vulgo creditum est: quare quod de ea proditum est, vanum esse convincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua stomacho alioq; fluxione laboranti convenit. Asinæ urina potu renum vitia sanari traduntur.

Mel.

CAP. LXXIIII.

P Rincipem locum obtinet mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratus Mellis pretius, subflavum, nec humectum, grave, & minime fluxum, quod ob sequacem lenitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida ulcera sinusq; commodissime infunditur. Decetum atque impositum, abscendentem carnem glutinat, medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum, item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lentes & sæda capitis animalia illitum necat, nuxlam glandem recutitis operit, præsertim quæ circumcissione aperta non est, si melle præputium à balneo triginta diebus emollatur: oculorum calis-

K 2

ginem discutit, faucibus, tonsillis, angine col-
lutum gargarizatumve medetur: urinam ciet, au-
xiliatur tussi, & à serpente percussus: contra hau-
stum mecumium, cum rosaceo calidum assumitur:
aduersus venena fungorum, & rabiosi canis mor-
sus linclum aut potum proficit: crudum tamen
aliu inflat, tussim lacescit, & ea de re despuma-
ti vsus aptior est. Primatum tenet in mellis gene-
re vernum, deinde aestiuum: hybernium verò, ut
pote quod crassius constet, deterrimū repulatur,

Mel Sarcaginus halitum expirat. Quod in Sardinia gi-
dum amagitur mel, amarū est: quoniam apes inibi absin-
rum. ilio vescantur: quo vitia cuius in facie & maculae

aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto qui-
busdam anni temporibus, propria quorundam flo-
rum dote, mel conflatur: quod qui edere, mēte ab-
alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt,
esitata ruta, & salsamenta, aut epotum mul-
sum, resumpta, quoties vomitione reijciuntur. a-
cre autem est, & olfactu sternutamenta mouet.
Quod cum cōsto illitum, fœminarū cutem emen-
dat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud

Saccharū. concreti mellis genus, quod saccharon nominatur.
In India verò, & felici Arabia in arundinibus
inuenitur: salis modo coactum est, dentibus, ut sal,
fragile, aliud idoneum, & stomacho utile, si aqua
dilutum bibatur: vexata vesicae renibusq; auxi-
liatur, illitum ea discutit, quae tenebras oculorum
pupillis offundam.

Cera.

Cera.

CAP. LXXV.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitum quadātenus mel-
leum referens, natione Pontica, aut Cretica. Se-
cundum locum obtinet candicans, & suapte natu-
ra pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt
album syncerumq; atque transfundunt in vas,
quod suis habeat marine ex alto petite, insper-
soq; utri momento, decoquunt: cumq; iterum ter-
tione inferbuit, separatim vas refrigerant, ac ce-
ræ pastillum eximunt, deterſa ſorde, ſi qua foris
adheſit: tū deſus indita noua maris aqua feruet,
vbi retulimus: & vaſe dempto ex igne, fundum ol-
lulae nouæ aqua frigida madefactum, in ceram
ſummam ſuſpenſa manu intingunt, quo celerius
concreſcat, & quamminima portio extrahatur.
Suſcepto primo ceræ orbiculo, iterum vaſis immum
aqua refrigeratum, tātisper in ceram immitti de-
bet, dum tota excipiat. Orbiculi lino cōſuti, in-
teruacatē ſpatio, ſuſpenduntur, & interdū, conti-
nuò ſub ſole, noctu ſub luna aſperguntur, vſq; dum
perfectè albeſcant. Verum ſi eximius ille candor
deſideretur, eadem factitari, & identidem reco-
qui operæ pretiū eſt. Nec deſunt, qui pro marina, in-
muria quā acerrima ſemel aut iterū excoquāt:
dein laguncula tenui, rotunda, anſam habēte, ex-
trahūt: poſtea orbiculos, ſubſtrato affatim ceſpi-
te herboſo, inſolant, donec candorem ſummū con-
traxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus vere,

cum sol remissa vehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modice explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac milij magnitudine decem grana ceræ haurita, lac in nutritibus non patimur coagulari.

Propolis.

CAP. LXXVI.

Propolis eligi debet flava, odorata, styracem referens, in vehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit, & euocat aculeos, & omnia infixæ corpori extrahit, in vetere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit: ea in alueariorum foribus, cerose nature inuenitur.

Triticum.

CAP. LXXVII.

Oprima è tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recetia, & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum morsibus prosunt, mansa & imposita: confectus eorum similagine panis, plus alit, quam cibarius: è trimestrium farina panis leuiorẽ cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus nervorum fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Item contra interaneorum inflationes, lentigines ex aceto misce tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentis mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur, & torminosi proficiunt.

sunt. Farinaceum fermentum calfaciendi, extrahendiq; vim habet: priuatim callos pedū, clauosq; extenuat, & cetera tubercula furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitamorum farina, contra venenatos ictus cum aceto aut vino, cōmodissimè illinitur: eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excreationibus proderit: contra tussim, & exasperatas arterias, cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsā, aut hydrelæo decoquatur, omnē discutit inflammationem. Panis & crudus, & coctus cū aqua mulsā inflammationes omnes illius mulcet: cū emolliat, & quadātenus refrigeret: sed herbis succis, & huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis cōuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus, illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine, & polline, quo chartæ glutinātur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidus ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum.

CAP. LXXVIII.

Hordeum optimum est candidum purumq; id minus quā triticū alit. Pīšana tamen ob cremorem in decoctione redditū, plus alimenti præbet, quā polenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atque gutturus scabritias, exulcerationesq; pollet: quibus etiam triticea pīšana præsidio est: sed plus alit, magisq; vrinam mouet. Lac abundè suppeditat, si cum fœniculi semine deco-

K 4

Et a sorbeatur. Hordeum absterget, urinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsu aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; discutiat: duritias cum resina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum lini semine, fenogreci, & ruta, illini iuuat: strumias cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinae ex aqua, atq; cum pice, & oleo decoctus, puri mouedo est: cum aceto subactus itidem, & cum pice, contra articulorū fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum.

CAP. LXXIX.

EX hordeo potus sit, cui Zytho nomen est. Is urinam cit, renes & nervos tentat, membranis, praesertim cerebrum vestientibus, officit: inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasin gignit: persusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi.

CAP. LXXX.

FIt & ex hordeo potus, quē curmi nominant, coq;

eoq; sepe potu, pro vino vtuntur: verum dolorem capitis mouet, malum succum gignit, nervus nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zea, seu semen. CAP. LXXXI.

ZEa duorum generum est: una simplex, al= Vulgò spelta. Altera in geminis putaminibus grana bina coniuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quam hordeum alit, ori grata: digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Crassior farina. CAP. LXXXII.

Crimmon crassior est ex Zea triticoq; farina, ex qua pulcem faciunt. Abundè alit, facile conficitur, alium vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreatur.

Siligo. CAP. LXXXIII.

Eidem generi siligo adscribitur, sed minus alit, quanto nutrit: in panes, vt Zea, cogitur. Fit quoque è siligine crassior farina, quam Græci erimmon vocitant.

Athera. CAP. LXXXIII.

Athera ex Zea fit tenuissimè molita: est autem sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus continens, & cataplasmatibus efficax.

Tragos. CAP. LXXXV.

TRagos quandam halicæ frugis figuram gerit: multò minus, quam Zea nutrit, quod multum aceris habeat: quare agrius conficitur.

aluumq; magis emollit.

Auena.

CAP. LXXXVI.

AVena genicula quædam habet, folio & sti-
pula triticum imitatur, & in cacuminibus
dependentes, paruulas veluti locustas bipedes ge-
rit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplas-
mata, vti hordeum. Pulle huius aluum sistitur,
prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza.

CAP. LXXXVII.

ORyza frugum generis est, in palustribus ri-
gusq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum
supprimit.

Halica.

CAP. LXXXVIII.

Halica sit ex Zea, quam dicoccon appel-
lauius: plus alit, quam oryza: aluum
magis cohibet, stomacho longè vtilior. decocta in
aceto illitaq; lepras tollit, vnguium scabritias ex-
tricat, incipientibus ægilopys medetur. Decoctum
dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, ido-
neum est.

Milium.

CAP. LXXXIX.

Milium in panes coactum, minus cæteris fru-
gibus alit, sistit pulle sua aluum, urinam
cit. Torretur milium, feruensq; in sacco poni-
tur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si fovea-
tur, auxilio sit.

Panicum.

CAP. XC.

Panicum frumentaceis seminibus annume-
ratur, milio simile, eodemq; modo in panes
sub

subigitur: eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesama. CAP. XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus, halitus graui statem facit, quoties inter mandendū cōmissuris dentium inhaesit: nernorum crassitiem illius discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasa morsibus: capitis dolores, qui aestuatione concitantur, ex rosacea lenit: eadem efficit herba decocta in vino, praesertim inflammationibus oculorū doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vituntur.

Lolium. CAP. XCII.

Lolium quod inter segetes nascitur, molitum, illud nomas, putrescentia vlcera, gangraenasq; emarginat: sanat cum raphanis, sale & aceto feros lichenas: & ex aceto, & sulphure viuo, lepras: strumas quoque discutit, cum simo columbino, & lini semine decoctū in vino: rumpit, quae aegrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa, utilissime ischiadicis illinitur: si cum pulenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

Amylum. CAP. XCIII.

Amylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli haec est: Purgatum trimestre triticum madescit quinq; die, & si fieri potest, nocte: cum
emol

emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quò minus cremor utilis vnà excludatur, vbi mollissimū esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enutantes ibi furfures incerniculo eximēdi, reliquumq; quallo sportusq; siccatum tegulus nouus confestim torreatur flagrantissimo in sole: n. ique si paulisper vnum maneat, acorem cōcipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; vlcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperatas fauces lenit, lacti atq; obsonijs admisceatur. Fit etiam amyllum ex Zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & subactæ farinae modo manibus subigitur: pressaq; feruētissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnumgræcum. CAP. XCIIII.

Fœnigræci farina vim habet emolliēdi discutiēdiq;: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflāmationes, efficaciter illinitur: lienē cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius foeminarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, foventur, & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus
ten

tenefmos, fetidamq; dysentericorum proluuiem.
Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos
& genitalium cicatrices absterget.

Linum. CAP. XCV.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdem
quas foenumgræcum vires habet. Discutit,
& emollit omnē intus forisq; inflammationē, cum
melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle co-
cto exceptum: vitia cutis in facie varosq; crudum
tollit, illitum cum nitro & ficulneo cinere, paroti-
das duritiasq; discutit: vlcera quæ serpunt, fa-
uosq; cum vino decoctum expurgat: vngues sca-
broso eximit, cum pari modo nasturiy & mellis:
vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis
vicem substituitur: tussim lenit, venerem stimu-
lat: si farina piperis, & melle exceptū, pro placen-
tia largius adsumatur. Huius decoctū interaneo-
rum vuluæq; erosionibus immititur, alui excre-
menta euocat, ad vuluæ inflammationes in desef-
sionibus perquàm vile.

Cicer. CAP. XCVI.

Cicer satium alio idoneum est, urinam ciet,
inflationem parit, colorem commēdat, men-
ses ac partus expellit, lac auget, cum eruo deco-
ctum illinitur ad inflammationes testium, verru-
cosas informicationes, ad scabiem, vlcera capitis
manantia, impetiginesq; contra carcinomata, &
vlcera, quæ cacoëthe vocantur, cum melle & hor Cicer arie-
deo prodest. Alterum genus arietinum nomina-
tur.

tur: utrunque cit urinas, dato, cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decoctis. Lædunt ea exulceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se præcipiunt, ita decidere eas arbitramur. Sylvestre cicer, selijs satiuo simile est, odore acris, sed semine discrepat: idem quod satium præstat.

Faba. CAP. XCVII.

Faba inflationem excitat, ægrè concoquitur, tumultuosa somnia facit, tussis confert, carnem gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & cæliacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maior remq; flatum parit. Lamentum eius & per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cõcolores facit, turgentes grumoso lacte mammæ, etiã si inflammatione tententur, adimat: lac restinguit, furunculos, sugillata, parotidasq; cum feniigræci farina & melle discuit: cum rosa autem, thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, vuasq; reprimat: subactum vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in

vino

vinò testium collectiones sanat: quò tardius pu-
bes erumpat, pueris imò veniri illinitur: vitiligi-
nem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui
post euersionem renascuntur, gracilesunt, & mi-
nus alimenti capeffunt: cum polenta, scisso ali-
mine, & vetere oleo impressi cortices, strumas di-
scutiunt: decocto earum lane inficiuntur. Faba
dempto cortice in illas parteis diuisa, in quibus sua-
pte natura scinditur, imponi solet sanguinis de-
fluxionibus ab hirundine concitatis: nanque eas
supprimit, si semisecta apprimatur.

Faba Aegyptia. CAP. XCVIII.

AEgyptia faba, quam aliqui Ponticam vo-
cant, in Aegypto * plerunque provenit: in * $\pi\lambda\alpha\gamma\epsilon$ &
Asia etiam Ciliciæ; lacubus, inuenitur. Folia id est, plu-
habet ampla * etiam si ad arborum frondes com-
parentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine: * Sic Plin.
florein roscis, dupla papaueris amplitudine: & ubi lib. 21. cap.
flore exiit. fert folliculos vesparii fauis similes, 15. Græcis
in quibus faba supra operculum, bullantis ampul-
le modo, prominet. Ciborion aut Cibotion ideò $\pi\epsilon\tau\alpha\sigma\sigma\upsilon$,
nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, id est instar
humenti glebæ madata, & ita in aquam demissa. galeri.
Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda
coctivæ estur: ei colocasie nomen est. Faba vi-
rens manditur, & exiccata nigrescit, vulgare ma-
gnitudine superat. Adstringendi facultatem ob-
tinet, & stomacho utilem: dysentericis, celiacisq;
prodest, insparso, polentæ vice, lomento: datum
quoq;

quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio ride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

LENS. CAP. XCIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, agre coquitur, stomachum male habet, eumq; & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accurate, primaq; aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumultuosa excitat, capiti, nervis, ac pulmoni inutilis: melius suo fingetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris: quæ post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhos quæ obsonis insparguntur: verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis delibrata deuorari proderit: decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, vlcera purgat, decocta in
aceto

aceto duritias & strumas discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac siccis rosis, adiecto melle, decoquitur: nomus quæ in gangrænam euaferunt, adiuncta maris aqua, pustulus, & his quæ serpūt, igni sacro, perniciibusq; ut antea dictum est: cōtra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Phasioli.

CAP. C.

Phasioli inflāt, spiritus cient, agrè coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum.

CAP. CI.

Eruū parvus frutex omnibus cognitus, an-
gusto folio, tenuis, semina in valvulis habens, orobus, græ
è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi ca appella-
usus conueniens. Eruū capiti onerosum est, aluum tione voca-
esu turbat, sanguinem per vrinam extrahit, elixotur.
boves saginantur. Paranda farine ratio hæc est:
Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen-
doq; aqua respergunt, donec sufficienter combi-
bant: postea torrentur, vsque dum hians cortex
disrumpatur: molitaq; furinario cribro incernun-
tur, postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis
est. vrinam ciet, meliorem colorem efficit, sangui-
nem per vesicam aut aluum cum torminibus eli-

L

cit, si largius in cibo aut potu assumatur: ulcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculis totumq; corpus emendat: nomas, gangrenas, duritiesq; serpere non patitur: marum durities emollit, atra ulcera quae theriomata vocant, fluosq; emarginat, carbunculos rumpit: cum vino subacta illius morsibus viperarum, canum, hominumq; medetur: urinae difficultates tenesmosq; ex aceto mitigat. Erum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumq; conuenit. Eius cremor peritiones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini.

CAP. CII.

Satius lupinus notus est: cuius farina cum melle delincta, aut potu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem minus praestat, cum ruta & pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quae theriomata vocant, gangrenas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fovere utilissimum. Menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit, inflammationes cum polenta & aqua mitigat, tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit, strumas in aceto cocta illitaq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti celesti aqua,
don

donec in cremorem lentescant, faciem abstergiunt:
medetur pecorum scabiei, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut tepente decocto abluantur. Cit
urinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi
maceratu dulcescere coeperint, cum aceto poti,
fastidium detrahunt, & cibi aviditatem faciunt.
Gignuntur & sylvestres lupini, sativus similis, sed
omnino minores, qui eadem quæ sativi possunt.

Rapum. CAP. CIII.

DEcocta rapi radix alit, inflationem parit,
humentem ac fluxam carnem creat, venerem
stimulat: decocto podagra, pernionesq; foveantur,
contritoq; rapo atque impoſito iuvantur: si exca-
vata radici rosaceum ceratum adigatur, & fer-
uenti cinere eliquescat, exulceratis perionibus
proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & uri-
nam ciunt. Semen antidotus & theriacis, præser-
tim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant,
idoneum est: potum contra venena salutare est,
venerem concitat. Rapum muria conditum, mi-
nus alimenti sufficit: sed mulio magis appetentiam
recreat. Sylvestre rapum in arvis nascitur, * fru- * Vox ex
ticosum in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, Plinio ad-
lere in cacumine folia fert levia, digitali latitu- iecti.
dine, aut maiora: & fructum in siliquis calycula-
tis: cumq; eorum involucria aperiantur, alia intus
siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem
præbet, in qua semina parvula concipiuntur, fo-

ris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, utimur: præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus. CAP. CIIII.

COcta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix. CAP. CV.

Radix (quæ Græcis raphanus dicitur) ex-calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciēt, urinam pellit, alio aptior: summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuvet. quum autem præsumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissimè datur ante cibum. Sensuum aciem excitat: decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissimè illinitur, lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea farina emendat, his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit, urinum mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrenas validissimè emarginat: coctum cum aceto mulso anginis perquã utiliter gargarizatur, contra cerastis morsus, potum ex vino, auxi-

lia

lio est. Sylvestris raphani, quam Romani armo-
raciam vocant, folia satiuo similia, sed magis lam-
psanam imitantur: radix gracilis, * tenera, sub= * μαλακή.
acris. Tam folium quàm radix in olera recipitur: id est, mol-
sed hæc excoctâ facit, urinam concitat, æstiosa est. lvs.

Sifer.

CAP. CVI.

Sifer vulgo cognitum, cuius radix decocta ori-
grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, &
appetentiam inuitat.

Lapathum, siue rumex. CAP. CVII.

EX generibus rumicis, oxylapathum vocât, Officinis
quod in acutum tendit, dura habens extre-
ma, in palustribus nascens. Alius est satiuus, illi
dissimilis. Tertium genus sylvestre, paruum, plan-
tagini proximum, humile & molle. Quartum est
quod alij * oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon * Acetosa.
vocant. Folia eius sylvestri ac exiguo rumici si-
milia, caule non magno, semine subacuto, ruben-
te, acris, in caude & agnatis appendicibus, emicâ-
te. Omnium decocto olere aliis emollitur. Crudi
illitu, melicerides, rosaceo aut croco adiecto, di-
scutiuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius quam
oxalida nominant, semen ex aqua aut vino uti-
liter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum
affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod
si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu pa-
tietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, le-
pras, impetigines, & scabrosos vngues persanant:
sed antea locus aceto & nitro in sole perfrican-

olus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foveatur, aut in solijs balnearum confricetur. Coctæ in vino & instillatæ, aurium dentiumq; dolorem mulcent, strumas parotidasq; discutunt, lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicem gestamine utuntur, eas collo appendentes. Tritæ & admotæ feminarum profusua sistunt, cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ comminunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Lampsana.

CAP. CVIII.

Lampsana sylvestre olus est: plus alit quam rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesq; coquantur in cibo.

Blitum.

CAP. CIX.

Blitum estur oleris modo, alio vile est, nullius in medicina usus.

Malua.

CAP. CX.

Malua sativa esui longè aptior sylvestri: stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, egilopas ex melle sanant: verum cum cicatricem trahere coeperint, ea demum citra salem utendum est. Contra aculeatos apium vesparumq; ictus, illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti, non
fer

feriuntur. Vlcera manantia in capite, fursuresq;
cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis de-
cocta folia, tritaq; vtilissime ex oleo imponuntur.
Eius decoctum vuluas in seffione mollit: prodest
erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, se-
disq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice
sua, contra omnia venena auxiliatur, si continuo à
bibētibus reuomatur. Cōtra phalangiorū morsus
remedio est, lac euocat. Semen in vino potum ad-
dito loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

Atriplex. CAP. CXI.

A Triplicem aliqui chrysolachanon vocant,
cognitum olus est. Duo eius genera, syluestre
& satium. Coctum estur, vt olus. Aluum mollit,
panos discutit, siue crudum siue coctum illina-
tur. Semen cum aqua mulsa potum, regium mor-
bum sanat.

Brassica. CAP. CXII.

B Rassica satia aluo est idonea, si modò leui-
ter feruesfacta edatur (nam percocta alimen-
sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixi-
uo coquitur) stomachum autè malè habet: acrior
est æstua. In Aegypto propter amaritudinem non
estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest:
summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini no-
xam restinguit. Melior stamacho cyma, sed a-
crior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condi-
ta stomacho inimica est, aluum conturbat. Cru-
dus succus cum nitro & iri deuoratus aluū emol-

lit: cum vino quoque epotus viperarum morſibus auxiliatur: cum ſemigræci farina podagris & articularum vitijs illinitur: prodeſt & ſordidis ulceribus & vetuſtis illitus: caput purgat naribus infuſus: menſes extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per ſeſe illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignem ſacrum, leprasq; ſanant: carbunculos ex ſale rumpunt: fluentes capillos retinent: cocti, addito melle, aduerſus depaſcētia ulcera, gangrenasq; valēt: lienofisq; ex aceto cruda proſunt. Manſa, deuorato ſucco, reuſam vocem inſtaurāt. Decoctum eius potu, alium & menſes ciet. Flos poſt conceptionem in peſſo ſubditus, partum abortu vitiat. Semen eius, præſertim quæ in Aegypto naſcitur, potum tineas repellit: in antidota iheriaca additur. faciei cutem lētiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetuſto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

Brasſica ſylueſtris. CAP. CXIII.

Sylueſtris brasſica, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur: ſatiuæ ſimilis, ſed capdidior, hirsutiorq; amara. cuius cyma in luxuria cocti, ori non inſuauis. Folia illitu vulnera conglutinant, & inflammationes tumoresq; diſcutiunt.

ANNOTATIO.

Contendunt doctiſſimi quique eam eſſe
her

herbam, quam vulgò Soldanam aut Soldanellam vocitant: quæ certè aristolochiâ rotundam, vt à Dioscoride hîc depingitur brassica marina, foliis adamussim repræsentat. Quòd autem in descriptione prælonga quoque adiiciatur, mendosum planè suspicamur, ac fortè pro *μακρὰ*, vt Græci codices habent, legendum *μικρὰ*, id est, parua: quod & ipsum Soldanæ nostræ pulchrè respondet. Quomodo enim folia Brassicæ marinæ prælonga rectè dixeris, si aristolochiæ rotundæ foliis similia? quæ cùm ex eius descriptione, tum oculata fide non in longitudinem protensa, sed circinata ferè esse rotunditatis, sæpe comperimus. Suum tamen cuiq; in hac re esto iudicium.

Brassica marina. CAP. CXIII.

Marina brassica à satina prorsus abhorret, quòd folia ferat rotundæ aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, vt hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciens, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta.

CAP. CXV.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cū lenticula, vt ventrè sistat: quod ma-

L 5

* Antiqui ^{gis radice eius præstat.} Candida alius vilis
hoc genus ^{est.} Vtraque tamen propter nitrosum humorem,
betæ, vt au ^{quem habet i. f. m. xij succi est.} Vnde succus ea-
thor est ^{rum, cum pelle naribus inditus, caput purgat, au-}
Theophras- ^{rium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis &}
tus, Sicut ^{foliorum, sursum lentesq; deterget, peritiones fo-}
lum voca- ^{tu mitigat. Crudis folijs vitiliginis, nitro anlea-}
runt: quo- ^{perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello prius}
rum exem- ^{ta vna tan}
plo extri- ^{de. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambu-}
ta vna tan ^{stisq; cocta medetur.}
tum litera ^{die dici-}
Sicla ho- ^{tur.}
die dici-
tur.

Portulaca.

CAP. CXVI.

Portulaca vis adstringit: capitis doloribus,
inflammationibus oculorum, ceterisq; cum po-
lenia imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni,
vesicæ doloribus, auxilio est: commanducata, den-
tium stupres sedat: stomachi & intestinorum
æstuatione, fluxionesq; mulcet: renes & vesicam
adiuvat, etiam si erosionem sentiât: veneris impe-
tus exoluit: succus epotus simili effectu prodest,
in febribus valens. Contra teretes ventris tineas,
cruentam excreationem, dysenteriam, hamor-
rhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medi-
camentis utilissimè commiscetur, interaneis flu-
xione laborantibus, atque vulvarum erosionibus,
in funditur: contra dolores, quos æstus excitauit,
caput ex rosaceo & oleo fœuetur: eruptiones pa-
pularum in capite, cum vino emēdat: vulneribus
quæ

que ad syderationem spectat ex polenta illinitur.

Asparagi.

CAP. CXVII.

Corruda siue syluestris asparagus vulgaris Officinis
est notus. Huius cauliculi in cibo cocti sparagus.
ventrem emolliunt, urinam cient. Radicis deco-
ctum contra urine difficultatem, regium mor-
bum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in-
potu proficiunt: cum vino autem, phalangiorum mor-
bus auxiliatur. Si decocti succus super dente con-
tineatur, eius dolori medetur. Semen potius ad ea-
dem valet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant,
emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodide-
runt, arietis cornibus confusis, atque defossis: quod,
quantum equidem sentio, plane à veritate abhor-
ret. * Altilis autem asparagus multis ramis fru-
ticat, folijs feniculi, longis, numerosis: radice ro-
tunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri
cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant.
Assus autem coctus ve, urine stillicidium, diffi-
cultatēq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vi-
no aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta
cum ficis aut ciceribus sumpta, regium morbum
sanat: coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat.
Alligata radix, aut haustum eius decoctum, con-
ceptum adimit, & sterilitatem adfert.

*In greco
codice hec
ad sylue-
stre quoq;
asparagū
referuntur,
nec sit alti-
lis mētio.
Marcello
autem vi-
dentur a-
dulterina.

Plantago.

CAP. CXVIII.

Dvo plantaginis genera: minor folia habet
angustiora, minora, molliora, leuora, &
tenuiora: cauliculo anguloso in terram inclinato:
flo

floribus pallidis: semine summis caulibus emicāte.

Altera maior, lætior, virentiorq; , latis constans

* Oleris folijs, *oleracei generis: cuius caulis cubiti altitu=
nomine p dinem petit, angulosus, subruber, à medio ad ver=
antonoma ticem tenui semine circumdatus: radicibus nititur
siam Bras- teneris, hirsutis, candidis, digitorum crassitudine æ=
sicā intelli quantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis
ge. Nec e- humidis. Multò vtilior magna est. Vim habent fo=
nim simpli lia exiccatoriam, cōstringētem: quare omnibus
citer ad malignis vlcerebus, & fluxioni opportunus atque
quælibet elephanticis, sordidisq; illita profunt: profluua
olera quo- sanguinis, vlcera quæ serpūt, epinyctidas, carbun=
rum diuer culos, nomasq; cohibent: vetera vlcera & inequa
sa admo- lia cicatrice obducunt, chironia sanant, sinus con
dū facies, glutinant: morsibus canis, ambustis igni, inflam=
folia plan mationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilopys,
taginis re- illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale
ferri pos- olus, dysentericis, celiacisq; sumptum subuenit.
sunt.

Datur & in locum betæ cum lenticula coctum.
Et ad aquam inter cutem cui leucophlegmatia
nomē est, datur & herba decocta post aridas epu
las, sic vt media antecedit: comitialibus & su
spiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta
subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut ce
rusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest,
lippitudinibus & aurium doloribus idem succus
instillatur. Additur quoque in oculorum collyria.
Gingiuvis cruore suffusus, & sanguinis reiectioni
bus, potu cōfert: clystere dysentericis infunditur,

6013

contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subicitur, etiã si vuluæ fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducata, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renum & vesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radicis gestamine, discutiendis strumis vtantur.

Lauer seu Sium.

CAP. CXIX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, Officinis folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, Berula. & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu, calculos rum-punt, atque excernunt: vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliatur. De sio Crateus tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quàm menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium.

CAP. CXX.

Sisymbrium (alij serpillum syluestre vocant) Officinis in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Balsamita. Calfaciendi vim habet: contra stillicidia vrinæ, calculosq; semen ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur: item contra vesparum a= Vulgò napiumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Alte= sturtiū a= rum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, quaticum. alij

aliij sion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eis= dem in locis, quibus sion, prouenit: quæ ideo non= nullis cardamina nominatur, quod gustu carda= mum, id est nasturtium, repræsentet. Folia pri= mum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo fin= duntur. Id excalfacit, urinas mouet, crudū estur, purgat lentigines, cuiusq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Crithmum.

CAP. CXXI.

Crithmum, seu potius, ut aliqui, crithamon, fruticosa & vndique foliosa herbula est, cu= biti altitudinem ferè petens. Nascitur in mariti= mus, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albi= canibus, veluti portulacæ, latioribus, & longio= ribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nu= cleum: radices digiti crassitudine, tres aut qua= tuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & fo= lia incocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctumve in olerè, seruatur etiam in muria.

Fuchsio

Cornus cer= ui vulgò di= ctum.

Coronopus.

CAP. CXXII.

Coronopus oblonga herbula est, per terrā * repens, sissis folijs: coquitur in olerè: radicem * ἰσχυρὴν habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cælia= von, id est, cis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, strata. & secus vias.

Sonn

Sonchus.

CAP. CXXIII.

Sonchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinis horret: * alter teneritate * Vulgò ro quadam mollescit, cibus expetitus, anguloso caule, * inam, interdum rubente: folijs in ambitu per cinum. interualla disiectis. Vtriusque vis refrigerat, mox * Vox ex dicè adstringit: unde aestuanti stomacho & in Plinio re- flammationibus illi profuit. Succus eorum stoma- posita. chi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit, in vellere appositus sedis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba quàm radix illa vibratis a scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs: eandem in ramos ex- euntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

ANNOTATIO.

Non video, quamuis & Græcus codex sic habeat, quomodo Seris satina hortensi, quod planè est idem, stomacho utilior dica- tur, vt subesse errorem non parum suspice- mur. Marcellus, qui aut integriori vsus fuit exemplari, aut locum, quem & ipse corru- ptum iudicabat, restituere conatus est, sic vertit, Latioribus folijs altera, satina & in ci- bis gratior.

Seris siue intybus. CAP. CXXIIII.

Seris duum generum est: altera syluestris, quæ spicris & cichorion vocatur: * altera satina, * Officinis latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensi scariola. sis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur:

vna

una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho utilissima: alium sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem aestuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis, per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla.

CAP. CXXV.

CHondrilla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia: qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciem esse pronuntiarunt, verum tenuior tota est: in cuius ramulis, gummi mastiches simillimum * *μυρ. θει. rha* tuberculo fabæ inueniri solet: quod cum myrrina tritum, & linteo appositum, instar oliuæ, fecid est, maminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos. qui nitro admisti vitilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoneatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per sese potus, alium sistit. Aliud habetur chondrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caulem succo madentem lateo:

Cleo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis, & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Nascitur in latis, & cultis.

Cucurbita.

CAP. CXXVI.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus cōtra capitis ardorem, quam syriasin vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes podagrasq; refrigerant. Succus ē ramentis iusis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat: totius seruefactæ, & expressæ succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatā infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

Cucumer satiuus.

CAP. CXXVII.

Satiuus cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, corruptionem non sentit, vesicæ prodest, olfactu remocat, quos animus liquerit. Semen modicè vrinam mouet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinyctidis, cum melle. Peponis caro in cibus, vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionē infantium, quam syriasin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum

M

semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in
 smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem af-
 ferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drach-
 me pondere, vomitione mouet. Si quisquam mode-
 ratè secundum coenā vomere cupiat, geminis obo-
 lus sit contentus. Sanat quoque illula cum melle vl-
 cera cōcreta in modum favi, quæ ceria vocant.

Lactuca.

CAP. CXXVIII.

Lactucæ sativæ, quibus natura refrigeratrix
 inest, stomacho gratæ habentur: somnum
 conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum
 decoctæ magis alunt. stomachicis illotis esse pro-
 dest. Epotum semen, assiduus libidinum imagi-
 nationes in somno, compescit, & veneri refraga-
 tur. Ipse verò frequentiores in cibo, claritati ocu-
 lorum officium: inflammationibus, & ignibus sa-
 cris opitulantur, muria conduntur. Cum in cau-
 lem exierunt, vim quandam nanciscuntur, succo
 aut lacti syluestris lactucæ similem.

Lactuca syluestris. CAP. CXXIX.

Syluestris lactuca sativæ similis est, sed lon-
 gior caulis, & candidiora folia, graciliora,
 & asperiora: amaro gustu est, & viribus aliquan-
 tum papaueri similis: unde lacteum eius succum
 aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum
 elicit, potus in aceto misce succus ad duos obolos:
 argema caliginemq; repurgat, contra adustiones
 eff. caciter illinitur, cum lacte mulieris. In summa,
 somnum allicit: doloris lenamētum præstat, men-
 ses

ses trahit, contra scorpionum & phalangiorum
ictus bibitur. Semen, non aliter, quam sativæ, libi-
dinum imaginationes in somno amolitur, ac vene-
rem arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus in-
firmior. Reponitur in sicili non lac eius, antea,
ut in alijs liquaminibus moru est, insolatum.

Gingidium.

CAP. CXXX.

Gingidium, aliqui lepidion, in Syria, & Ci- Nostrum
licia* plerumque nascitur: herbula sylvestri Ceresolii.
pastinacæ similis, tenuior, & * amarior: radice * πλεῖστον
parva, candicante, subamara. Oulus hac crudum, id est, plu-
coctum, conditumve estur magna stomachi utili-
tate: urinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ * πικρότε-
prodest.

Scandix.

CAP. CXXXI.

Scandix, sylvestre olus est, amarum, subacre: Scandix,
quod crudum coctumve manditur, stomacho
& ventri vile. Decoctum in potu, vesicæ, reni-
bus, & iocineri confert.

Caucalis.

CAP. CXXXII.

Caucalis, quam alij sylvestre ducum vocat,
cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhir-
suto: folijs apio similibus, fœniculi modo per ex-
trema multifidis, hispidisq;: candida in cacumine
umbella suaviter olente. Crudum coctumve ole-
um modo estur, urinam movet.

Eruca.

CAP. CXXXIII.

Ruda eruca venerem largiore cibo cõcitat.
Semen eadem effectus prodest: urinam cit.

concoctioni prodest, alio perquam commodata. Semina ad condimenta vtuntur: quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo satina acrior.

Ocimum.

CAP. CXXXIII.

Officinis
Basilicon.

OCimum vulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit, sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quãdoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conflictari dolore.

Orobanche.

CAP. CXXXV.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum verg

vergēte: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strangulare: unde orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Barbula hirci.

CAP. CXXXVI.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina: magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum.

CAP. CXXXVII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus agnatis: à quibus flores prodeunt foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta mādatur.

Tubera.

CAP. CXXXVIII.

Tubera rotunda radices sunt, sine caule, sine folijs flauescens: vere fodimur, cruda & cocta eduntur.

Smilax hortensis.

CAP. CXXXIX.

Hortensis smilax, frutex, cuius semē à nonnullis lobia vocatur: folia habet hederæ, molliora tamē: tenues caules, & capreolos vicinus

* Gracè est, fruticibus circumuolutos: qui tantum adoleſcunt, in *μίσσῃ* ἢ ut topiarias ſcenas repræſentare videantur: ſili- *ἰσπυγί* quas ſenigræci proferunt longiores & toroſiores, in *ζοῦλα*, quod quibus ſemina renum ſimilia, ſed inequali colore reſtius for recluduntur, * que quadam ex parte fulueſcunt. ſitan reddi Siliqua coſta, cum ſemine in oleribus, aſparagi deris: que modo, eſt. Urinam ciet, & tumultuoſa ſomnum magna ta- facit.

me ex par- Medica.

CAP. CXL.

te fulue- **M** Edica cum recenter prodijt, folijs & cau- ſcunt, ut in- **M** le trifolio pratensi ſimilis eſt: procedens telligamus, verò folia contrahit, caules edens trifolij, & ſili- Smilaca quæ corniculorum modo intortas, in quibus ſe- hâc diuerſi men lentis magnitudine dependet. Id ſiccatum, quidem co- iucundi ſaporis gratia, conditaneo ſali admiſce- loris ſemi- tur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illi- na, magna ſuffragatur. Herba tota pro gramine viuitur, qui tamen ex pecora alunt.

parte fulue Aphaca.

CAP. CXLI.

ſcētia pro- **A** Phaca in aruiſ naschitur, altior lente, tenui- creare. **A** bus folijs: ſiliquas lenticula maiores fert, in Eſt quam quibus terna quaternarie ſemina nigra, lente mi- rura Viciâ nora, continentur: que adſtringendi vim habent: ſylueſtrem quare torrefacta, ſtomachi aliq; fluxiones ſi- vocitant. ſunt, ſi freſa lentis more decoquantur.

Porrum capitatum. CAP. CXLII.

C Apitatum porrum inflationem facit, no- xium ſuccum creat, tumultuoſum ſomnum parit, urinam ciet: alio accommodatur, extenuat, oculo

oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed ledit
 exulceratam vesicam, renesq;: cum plisana verò
 coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma eius in
 aqua maris, & aceto cocta, in desessionibus, ad
 præclusiones vuluæ, & durities, utilis habetur.
 Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida ma-
 ceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen
 acrius est, & quãdam adstrictoriam vim habet:
 quare succus cum aceto, addito thure aut manna,
 sanguinis profusio sistitur, maximè si naribus erui-
 pat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vi-
 tia tabemq; pro delinctu efficax est: arteriam esu
 purgat, sed si assidue estur, visus obscuritatem
 inducit: stomacho aduersatur. Succus ex melle po-
 tus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio
 est: ipsum quoque cum aceto aut thuris polline,
 lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus, & so-
 nutui instillatur. Varos tollunt folia illita cum
 rina rhois, quæ ad obsonia vtuntur: epinyctidi me-
 dentur, crustas ex sale illita rumpunt, veteres san-
 guinis reiectiones cohibent, si binis drachmis, &
 equali baccarum myrti pondere bibantur. Am-
 peloprasum stomacho magis aduersatur, & plus
 porro excalfacit: urinam & menses vehementius
 ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cepa.

CAP. CXLIII.

CEpa longa acrior est, quàm rotunda, item
 fiana quàm candida, & sicca quàm viridis,
 & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes ta-

M 4

men mordent, flatus gignunt, appetentiam inui-
tant, sitim mouent, & extenuāt: fastidium pa-
riunt, & expurgant: aluo utiles sunt. E& detra-
ctis purgamentis in oleum coniecta, hemorrhoi-
das, reliquosq; excretionum exitus referant, sub-
dita pro balanis. Succus cum melle illitus, oculo-
rum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & inci-
pientibus suffusionibus auxiliatur: angina eodem
perunguntur: suppressos menses pellit, caput pur-
gat naribus infusus: canis morsibus cum aceto, ru-
ta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas
in sole, vitiligines sanat: & cum pari spodio, sca-
bris lippitudines sedat: varos cum sale reprimi-
t: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo
adipe utilis est: cit& aluo prodest: in auribus so-
nitum, ac grauitatem emēdat: ad purulentas au-
reis, & eliciendum earundem aquā, valet: alope-
ci& earum succo perfricantur, qui celerius, quā
alcyonium pilos euocat: largiore cibo cepa capitis
dolores ciet, cocta q; vehementius vrinam pellit: eos
lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea
etiam cocta, plus equo vescantur: elixa, & cum
passis uuis, & fico illita, tubercula concoquit, &
celerrimē rumpit.

Allium.

CAP. CXLIIII.

Allium quodulam satiuū atque hortense ha-
betur, quod in Aegypto, singulari, vt por-
rum, capite cōstat, dulce, in purpureū vergēs, par-
uum: reliqua vērē magna, & cādida, ex pluribus
coag

coagmentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Græci nominant. Aliud est sylvestre, quod Ophioscorodon, id est anguinum, vocant. Vis ally acris est: excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet anguinum, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris tineas in cibo sumptum abigit, vrinas detrahit: contra viperarum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita vt nō aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabiosorum morsus & illitum, & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates contra aquarum mutationes: vocem clarificat, veterem tussim crudum coctumve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos, & lendes enecat: cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecijs cum nardino vnguine, medetur: eruptiones papularū cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentigines, vlcera capitis manantia, lepras, & surfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineat: contra venenatos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Feruesactæ comæius, scæminarum desesectionibus additum, menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo, & nigra olina intritum, quod myttoton vocant,

esucit urinam, ora venarum patefacit, hydropi-
cis utile. Scorodoprasum magnitudine porrum
aquat, qualitatum porri, & alij particeps: unde
promiscuas sibi vires ex utroque vendicavit, effe-
ctus alij, & porri praebens: inefficacius tamen.
Coctum, porri modo, dulcescit, & in oleriam vi-
cem transit.

Sinapi. CAP. CXLV.

Sinapi hortense, aliqui napi vocant. Eligi de-
bet adultum, valde rufum, non magnopere sic-
cum, sed quod fractum internè virescat, & velu-
ti quodam succo madeat, caesium colore: siquidem
recens id genus, tempestivum habetur. Ad calfa-
ciendum, extenuandum, extrahendum, efficax
est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur:
contra praeduros tonsillarum tumores, ac veterem
callosamq; arteriae scabritiem, succus ex aqua, &
melle, convenienter gargarizatur: sternutamen-
ta ciet, tritum & naribus admotum: comitialibus
quoque auxiliatur. Foeminas vulvae strangulatas
oppressas excitat: lethargicis, de raso capite, illini-
tur. cum sicis admistum, donec rubescat locus, &

* κ' σπλῆν- ad coxendicum cruciatus impositum, * ad lienes,
vas κ' κα- & omne genus dolores confert, cum permutandae
δέλου εἰς valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt.
πᾶν χρο- Alopecijs illitum medetur, faciem purgat, sugilla-
τιον ἄλ- ta cum melle, adipe aut cerato rapit. Feræ impe-
γῆμα. tiginēs & lepræ, eo cum aceto perunguntur: con-
tra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui,
pol

polentæ modo, inspargitur: extrahentibus em-
plastris, scabiemq; extenuantibus, vtiliter admi-
sceri solet: tritum, grauati aurium & sonitui,
cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudi-
nes oculorum & genarum scabritas magna vti-
litate illinitur. Expressus recenti semine succus,
in sole siccat.

Nasturtium. CAP. CXLVI.

Nasturtium optimum constat esse Babyloni-
cum. Omnium semen est acre: excalfacit,
stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
excudit, lienem imminuit, partus examinat, men-
ses cit, venerem stimulat, sinapis & crucæ simile
intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Al-
litum cum melle, lienem extenuat, fauos ex-
purgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus
incoctum. Serpentium venenis potum resistit, at-
que eas suffusus fugat: capillorum defluuia cohi-
bet: carbunculos ad suppurationem perducit, &
rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex
aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit,
emittit furunculos, illitum cum muria. Herba ad
omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. CAP. CXLVII.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali lon-
gitudine, in terram versis, suppinguibus, in
cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo,
tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu cir-
ca ipsum totum, ab extremo in latius se panden-
te:

* *Διονοει* te: semine nasturtij incluso * lenticulae vasis effi-
dis, id est, gie, nisi quod infringitur (vnde nomen accepit)
 disci figu- flos allicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fos-
 ra. sisq; Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem
 vtrinq; extrahit, potu acetabuli mensura: prodest
 ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, inter-
 nas suppurationes rumpit: menses ciet, sed par-
 tus enecat. Alterum thlaspi tradit Cratenas,
 quod aliqui Persicon sinapi vocant, latius folijs, ra-
 dicibus magnis: vtile ischiadicorum infusioni.

Draba. CAP. CXLVIII.

Alij arabis. *Draba* herba ad cubiti altitudinem assur-
 git, tenuis spargens * ramos, & ex vtroque
 id est, vir- latere folia, ceu lepidij, sed molliora, & candidic-
 gas. ra: in cacumine verò sambuci umbellam gerit,
 candidos flores habentem. Herba hæc cum pisa-
 na coquitur, in Cappadocia maximè. Semen ari-
 dum pro pipere obsonijs admiscetur.

Irion. CAP. CXLIX.

*E*rysimum, Latini irionem vocant, iuxta vr-
 bes, rudera, hortosq; nascitur, folijs cruce syl-
 uestris: cauliculis in lori modum lentis & obse-
 quiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gra-
 culibus, vt fenograceo, cornicularis: semine na-
 sturtij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis flu-
 xiones efficax est, & purulenta extusuntur:
 regio morbo, & coxendicibus prodest: contra
 venena in delinctis cum melle datur: illinitur
 ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus,

p.r

parotidibus, duritys mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatum, pinsita farina oblitum perassetur.

Piper. CAP. CL.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, veluti siliquam promit. quod longum piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus dehiscens, pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cōtra venenata parantur: theriaca vocant. Longum verò vehemētius mordet: & quoniam prius quàm emature scat decerptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrum verò, utpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratiū esse cōstat, cādido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad cōdimenta vtilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antè dictis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenū, nigrum, sine multis rugis, recens ac minimè furosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimiq; ponderis, quod vocant brasma. Vis omnium exca facit, vrinam ciet, cōcoquit, extrahit, discutit,

tit, absterget caliginem que oculis obuersatur.
 Piper, febrium horroribus circuitu repetentibus,
 siue potu, siue illitu, subuenit: serpentium morsi-
 bus auxiliatur, partu extrahit conceptu adime-
 re creditur, statim a concubitu suppositum: tussi,
 omnibusq; pectoris vitijs, siue eclegmate, siue po-
 tu, succurrit: angine eo & melle conuenienter per-
 unguntur: potum cum recentibus lauri folijs, tor-
 mina discutit: cum riuo passa manducatum, pi-
 tutam à capite elicit: valetudinem tuetur, dolo-
 res finit, appetentiam mouet: concoctionem adiu-
 uat, ad intinctus esculentorum additum: strum, &
 cum pice discutit: vitiligines ex nitro emaculat.

* φαν. γ, nō
 φασίρ.

Ficili non, ut * lenticula, motum torretur. Non
 est huius arboris radix ginger, ut aliqui exi-
 stimare, sicuti paulò post ostendemus. Nanque
 piperis radix costo similis est, ora gustantium ac-
 cendit, saluam ciet. Hec lienem reprimit, cum
 aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, mandu-
 cata cum semine pedicularis herbe, quam staphi-
 dem agriam vocant.

Gingiberis. CAP. CLI.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglo-
 dytica Arabia magna ex parte nascens: quæ
 virente, ad multa, perinde atque nos rista, vrin-
 tur, & primis potibus & eduljjs admiscunt. Hu-
 ius radices, cyperi modo, parue sunt, candican-
 tes, & odorata, atque piper sapore imitantur. Eli-
 gi debent quæ teredines non nouerunt. A multis
 tamen

tamen ob id *condiunt, quod celeriter cariem *ταριχοβε
sentiant, at sicilibus in Italiam asportatur. Gen= ται δια το
giberis cibo conueniens est, & cum condimento οβονπ/ον,
assumitur. Excalfactoriam vim & excoquem id est, sale
habet: alium leniter emollit, stomacho utilis est, conspergun
efficax aduersus ea quæ oculis caliginem offun= tur, quod
dunt. In antidota addi solet. In summa, piperis vi= facile pu
ribus respondet. tescant.

Hydropiper. CAP. CLII.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ sta=
gnant, aut pigro lapsu repunt: caulem ædit
geniculatum, *prædurum, multis alis concanum: *ταριχοβε id
folia mentha, maiora, molliora, candidioraq; gu= est, solidū.
sti piperis, acri, citra tamen vllam odoris gra=
tiam: fructum acrem, in surculis paruis, prope
folia racematim coherentem. Folia cum semine
illita tumores veteresq; duritias discutunt, sugil=
lata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro
piperis in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nulu
lus in medicina momenti.

Ptarmica. CAP. CLIII.

PTarmica exiguus frutex est, surculos ha=
bens paruos, multos, & rotundos, abrotono
non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa,
multa, & in cacumine capitulum, uti anihemi=
dis, paruum, rotundum, quod suo acri odore ster=
nutamentum excitat: unde nomen accepit. Folia
cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores
sternutamenta efficacissime mouent. Nascitur in

12013

montibus & petrosis.

Radicula seu lanaria herba.

CAP. CLIIII.

Cēsetur ea
quam vul-
gò saponaria
dicunt.

STruthium herba vulgò nota, qua purgandus la-
nus vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est
acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, or-
thopnoæ ex melle sumpta, cochlearis mensura:
aluum soluit. Eadem cum panace & capparis ra-
dice calculos frangit, & cum vrina exturbat. du-
ritiam lienis absomit: menses imposita trahit,
partus efficaciter enecat. Cum polenta autem &
aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum
farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur &
malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis cau-
sa. Sternutamēta mouet, per os purgat, trita cum
melle, & naribus infusa.

Cyclaminus. CAP. CLV.

Cyclaminus folia habet hederæ, purpurea,
varia, in quibus suprà infraq; albicant ma-
cule: caule nudo, quaternos digitos æquante: flo-
ribus in eo * purpureis, rosarum effigie: radice
* πορφυρί = ribus in eo * purpureis, rosarum effigie: radice
ζοῦτα, pur = nigra, & aliquantum lata, vt rapum videri pos-
purascenti = sit. Quæ cum hydromelite pota, pituita aquamq;
bus. detrahit: menses potu appositūve ciet. Tradunt,
si prægnaans radicem transgrediatur, abortiū fie-
ri. Partum appensa accelerat: contra venena,
præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illita
contra serpentiū iclus, remedio est: immista vi-

na

no inebriat : regium morbum disculit , tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contectum, loco calido, & à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet: eiectionem autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur : ad deicienda quoque alia excrementa, in vellere sedi subicitur : illito vmbilico & imo ventris coxarum tenus, aluum emollit, & abortum efficit : suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absumit : vitia cutis in facie, & alopecias emendat : eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, perniciosesque foueri congruum est : ipsa quoque in oleo vetere feruescens, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicae cerae momento, ut strigmenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile perniciosis. Radix, scillae modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

N

Altera cyclaminus. CAP. CLVI.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthe=
mon aut cissophyllon vocant: folijs hederæ,
sed minoribus: gemculatis caulibus, crassisque, cir=
ca vicinas arbores, capreolorum modo se voluen=
tibus: flore candido, odorato: acinus hederæ mol=
libus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice su=
peruacua: nascitur in asperis. Huius acini, dra=
chmæ minus pondere poti, cum vini albi cyathis
duobus, quadraginta diebus, lienem per urinam
& aluum absuunt. Ad orthopnoeam bibitur. re=
liquias à partu purgat.

Dracunculus. CAP. CLVII.

Dracunculus folio constat hederaceo, ma=
gnus, candidis notis insigni: caule recto, bica=
bitali, versicolore, maculis resperso purpureis, ita
ut anguem planè referat, baculi crassitudine:
fructus summo caule racematim coheret, colore
primum herbaceo, & cum ematuruit, croceo, gu=
stu feruens, mordaxq;: radice aliquantulum ro=
tunda, bulbosa, aro non absimili, tenni obducta
cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis suc=
cus cum oleo instillatus, aurium dolorem miti=
gat: naribus etiam ex lana impositus, polypum
absumit: carcinomata illita sistit: triginta eius
grana, si in p̄sca bibantur, abortus inferunt:
odorè aiunt posteaquam flaccidi flores emarcue=
runt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix ex=
calfacit: orthopnoeis, ruptis vulsis, tussis, destilla=
tion

tionibus, auxiliatur: humores pectoris excreati
facile reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per
se edatur, siue farina eius ex melle delingatur:
urinam pellit, venerem excitat, cum vino pta:
phagedenas ulcerum, & quæ cacoëthe vocantur,
trita cum melle & bryonia alba expurgat, &
ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistu=
las & eijciendos partus fieri solent: qui radice
suas manus perfricauerunt, à viperis feriri negan=
tur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia re=
centibus vulneribus, linamentorum vice, conue=
nienter imponuntur: decocta in vino permionibus
apposuisse predest: casus folijs inuolutus, à putre=
dine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, al=
bugines, & oculorum caligines conuenit. Radix
cruda coctave, ad sanorum vsus, pro olere recipi=
tur: in Gymnesijs insulis, quæ Baleares vocantur,
coctam radicem cum melle mulio, in conuiuijs pla=
centarium loco offerunt. Radix messibus effoditur,
lotaq; frustatim conciditur, & lino traecta, sic=
catur in umbra, & ita reconditur.

Arum. CAP. CLVIII.

ARum, apud Syros luphæ vocitatum, folia Iarus offi=
emittit dracunculi, sed longiora, & pau=
cioribus distincta maculis: caulem suppurpu=
reum, dodrantalem, pistilli specie, à quo croceū se=
mē exit: radice dracunculi alba, quæ decocta estur,
utpote cum minus acris sit. Folia ad esum cōdiun=
tur, & arida per se, decocta manduntur. Radix,

semen & folia, dracunculi vires habent. Priuatim radix ex simo bubulo podagrus illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiore eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum. CAP. CLIX.

Arisarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quàm aron acrimonie: vnde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radicis, genitale animalis cuiuscunque in perniciem agitur.

Hastula regia. CAP. CLX.

Officinis
Aphrodisi-
cos.

Hastula regia vulgaris notitiæ est, folijs maioris parri: caule leui, ferente in cacumine florem, quæ anthericon appellant: radices subiacent oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt: urinas & menses epotæ ciunt: lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex vino, medentur. Ea verò vomitiones adiuvat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, verum trium drachmarum pondere, folijsq; floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera sordida & depascentia, maniarum quoq; & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; , decoctis in fece vini bulbis, recētibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquitur, sitq; per quam vtile oculis

lis medicamentum: ad purulentas aureis per se, & cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, *dentium dolorem *ναδ' αὐ. mitigat. Cuius è radice illitus, alopecias ad pilum τὸν ἑγχο. reducit. Oleum in excanatis radicibus igni deco= δαίς. Etum, illitus exulceratus pernionibus & ambustis igni, conducit: & surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam vitiliginem, *linleo antea *προαυα. perfrictam in sole, illita radix emendat. Semē slo= τεύχευτα resq; in vino poti, scolopēdræ & scorpionū vene= ἐν ὀδονίφ. nus, mirum in modum resistunt: aluum purgant.

Bulbus esculentus. CAP. CLXI.

Esculentus bulbus vulgo cognitus, à nobis estur: stomacho & aluo utilis rufus, & qui ex Aphrica defertur. Amarum verò & scillinum, stomacho aptior est, & concoctionem adiuvat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt: venerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimēti præbent, carnes creant, inflationem pariunt: luxatis, fractis, articulorū doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorū tumores, & canū morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures & ulcera quæ in capite manāt, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata varosq; per se aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant: fractis auriculis vnguibusq; ex polenta medentur: ydem

calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: itē cum cinere ē manarū capitibus, impositi: cremati verò & cum alcyono misti, vitia cutis in facie, atque; cicatrices, in sole illi, emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius. CAP. CLXII.

Bulbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quā bulbus esculentus: radicem similem, * cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicae malis medetur: vomitiones mouet.

Scilla. CAP. CLXIII.

Squilla, Var. Officinis Scilla vim acrem atque feruentem habet: assata ad multa vtiliorē esse constat. Polline ad ronis more. crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter inusta fuerit: qua exempta, si nō emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quae prius sunt: nam quae ita non assatur, interaneis maximē noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quae in furnū demittatur. Sumi etiam solet quod maximē est medium, direptis vinctenus tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat: traiecta; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidē parte se contingat: his scillae segmi-

mb

nibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum uti-
mur. Ad rimas pedum, interna pars crude scillæ
in oleo feruescens, aut cum resina liquefacta im-
ponitur: decocta in aceto demorsis à vipera, cata-
plasma est. Ad singulas assæ partes adiectis octo-
nis tostæ salis, cochlear vnum aut alterum damus
ieiunus, ad emolliendam aluum: in potu autem &
odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere
volumus, hydropicusq; & stomachicis, quibus in-
natat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vete-
re, suspiriosis, & ore reijcientibus tres obolis, in-
delincta ex melle sumpsisse satis est. Coquitur cum
melle, & estur eorundem gratia, maxime ut con-
coctionem adiuvet. Strigmenta per aluum extra-
hit. Cocta & simili sumpta modo, eosdem præbet
effectus: sed cauendus scillæ vsus, his qui intesti-
num sentiunt vlcus. Ad pensiles verrucas & per-
niones, tosta efficaciter illinitur. Tertium semen,
& in carica aut melle deuoratum, aluum emollit.
Scilla tota in limine ianue suspensa, mali medi-
camenti noxam arcet.

De Pancratio.

CAP. CLXIII.

Pancratium, quod aliqui scillam appellant,
radice est magni bulbi, subrufo colore aut
suppurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs li-
lij, sed longioribus. Scillæ vires & præparatio-
nem habet, eodemq; pondere in morbis efficaciter
assumitur: cui tamen mitior quàm scillæ facultas
inest. Radicis succus cum erui farina digeritur

in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydro-
melite, commodissime dantur.

Capparis.

CAP. CLXV.

CApparis aculeatus frutex est, qui in terra
stratus, magis in orbem euagatur: spinas,
ut rubus, habet, in hami modum aduncus: folia
mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui
cum deluscentis panditur, florem candidum pro-
mit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figu-
ra inuenitur, quod apertum grana acinus puni-
corum similia ostendit, parua, rubicunda: radices
lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui ple-
runque solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta ru-
dera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia con-
diuntur: alium turbat, stomacho aduersatur, sitim
gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda utilior
est. Fructus drachmis duabus in vino potus, qua-
draginta diebus, lienē absument, & urinam cruen-
tumq; excrementum emittit: bibitur utilissime in
coxarum doloribus, & nervorū resolutione, item
ruptis & cōuulsis: menses ciet, caput purgat. Den-
tium dolorem sedat semen ex aceto decoctū, collu-
to inde ore. Aridus radice cortex ad eadem pro-
ficui: ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ oc-
calluerint, expurgat: lientis cum farina hordei il-
linuntur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum
aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix fo-
liaq; intrita, strumas ac duritias discutunt. Au-
rium vermiculos infusus succus enecat. Aphri-
ca,

ea, & præsertim Marmarica capparis, vehementer inflat. Apula vomitus facit. & quæ à Libyco, & quæ Rubro mari defertur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingivasque osse tenus exest: quare in cibis non abire damnatur.

Lepidium.

CAP. CLXVI.

Lepidium aliqui gingidium vocant, herbula Censetur
vulgo nota: muria cum lacte seruatur. Vis piperitis oc-
foliorum acris & exulcerans: quapropter ischia- litorum.
dicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum
helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lieno-
sis simili modo prodest. lepras eximit. Radix ap-
pensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

Ranunculum.

CAP. CLXVII.

Complura ranunculi genera. vis tamē omni- Vulgò Apium
bus una, acris, & vehementer exulcerans. risus.
Nam unum coriandri folijs constat, latiori-
bus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, inter-
dum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radi-
ce alba, exigua, amaraque, multis capillamentis,
hellebori modo, fibrata: nascitur in limitibus hu-
midis. Alterum lanuginosius, longiori caule,
pluribus foliorum incisuris, *plerumque in Sar- *πλῆθος,
dinia proueniēs, quam acerrimum, quod syluestre id est, copio
apium appellant. Tertium minimum, odore gra- sum-
ui, flore aurco. Quartum huic simile, flore lacteo.
Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulce-
rant, & crustas non sine dolore gignunt: quare

ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent: formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasq; paulisper illita tollunt. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix, tritaq;, stermentamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Anemone.

CAP. CIXVIII.

DVo anemones genera, vnum syluestre, alterum in cultis nascens. Cuius multae species: una phoeniceum florem profert: altera candicans, aut lacteum, aut purpureum. harum folia coriandro similia, ceterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaueris & in medio capitula nigra, aut caerulea: radix oleae magnitudine, aut amplius paulo grandescit, ac veluti geniculus quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus, & multis radicum capitamentis. Acrior est, quae nigra habet folia. Vis utriusque acris: ea de causa succus naribus insusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passō & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis praebent: menstrua ciunt, vellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemone nomina-
ri eup

ri eupatorium putent : quoniam à syluestri anemone, argemonem & papauer, quod rhœada appellât (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papauer & argemone colore minus saturato spectâtur, & utraque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succû, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrè. Insuper anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculû, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sepius enascuntur.

Argemone.

CAP. CLXIX.

Argemone in totum syluestri papaueri similis est: folia habet anemones, diuisa: florem puniceû: caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem, dimittit. Argema & nubeculas expurgat. Folia illius inflammationes compescunt.

Anagallis.

CAP. CLXX.

Duo anagallidis genera, quæ tantum flore distant. Nam quæ cœruleo flore est, femina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxinæ folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi

vini

vim habet: inflammationem arcet, adactos corpo-
ri aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput
gargarizatu purgat: & naribus infusus, dolo-
rem dentium lenit, si in aduersam narem injcia-
tur: argema cum melle Attico emendat: reusæ
oculorum aciei auxiliatur: contra viperarum mor-
sus, iocineris & renum vitia, si ex vino bibatur,
prodest. Tradunt eam quæ cœruleum ædit florem,
prociduam sedem reprimere: quæ verò phœniceæ,
illitu euocare.

Hedera.

CAP. CLXXI.

Hedera differentias multas in specie sorti-
tur, summas autem genere tres. Nā quæ-
dam candida est, altera nigra, tertia helix. Can-
dida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut
croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat:
helix fructum non gignit, sed albas habet viticu-
* οὐβυμῶν las, & folia parua, angulosa, & * concinniora.
* τῶρα, non Hedera omnis acris est, & adstringens: nervos
ἐρυδρά. tentat. Flos trium digitorum carptus, facit ad dy-
sentericos, in vino bis die potus: ambustus cum ce-
rato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto co-
cta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Fo-
liorum & corymborum succus, cum irino vnguento,
melle aut nitro, naribus infunditur, & contra ve-
* ἀρμόζει. teres capitis dolores * caput eo cum aceto, & rosa
* κε. ceo perfundi vtile est: purulentis auribus, aut do-
lentibus, cū oleo medetur. Nigræ hederæ succus,
aut e poti corymbi, corpus infirmat, mentemq; tur-
bant

bant largius sumpti. Acini quinque triti, calfa-
 cliq; in punici mali cortice cum rosaceo, si instillen-
 tur à contraria aure, dolore dentium mitigant. De-
 nigrant capilli, illiti corymbi. Folia in vino deco-
 cta, illuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoë-
 the sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti
 antea diximus, decocta. Mouet menses triti et sub-
 diti corymbi: idem poti, post purgationes feminarum,
 drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pe-
 diculus foliorum melle irrigatus, ac vulnere indi-
 tus, menstrua & partus extrahit. Instillatus suc-
 cus putrida tedia narium, graueolentiamq; emen-
 dat, & sanitati restituit. Lacryma hederæ psic-
 lothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum
 in aceto potus, contra phalangia prodest.

Chelidonium. CAP. CLXXII.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubi-
 tali aut altiore, agnatis foliosis: folijs ranunc-
 culi, mollioribus tamen, & colore caesijs: flore vio-
 læ albæ, secundum singula folia prodeunte: in eo
 succus croci, mordax, acris, & aliquantulum sub-
 amarus, grauitè olens: radix supernè singularis,
 infernè in multa crocea capillamenta fibratur: si-
 liqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ
 figuram longa: in qua semen papauere maius re-
 cluditur. Succus in æreo vase, cum melle prunis
 decoctus, oculis claritatē adfert. Folijs, caule, ra-
 dice, succus exprimitur in uentè estate, & siccatus
 in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso

¶

& vino albo pota, medetur regio morbo, & ulce-
ribus quæ serpūt: imposita cū vino, aut māducata,
dentiū dolorē sedat. Hoc nomen sibi videtur vēdi-
casse, quòd aduētū hirūdinū exoriatur, & disces-
su emarcescat. Sunt qui narrā, hirūdines matres
excacatis pullis, admota herba visum restituerē.

Chelidonium minus. CAP. CLXXIII.

Vulgò Scro-
fularia mi-
nor.

Chelidonium minus, quod triticum sylvestre
aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab ra-
dice pendens, sine caule: folijs hederæ, multo rotun-
dioribus, & minoribus, teneris, & suppinguibz:
radices habet ex eodem callo complures, pusillas,
in granorum tritici modum acervatim cōgestas:
quarum tres aut quatuor in longitudinem exeūt.
Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & a-
nemonēs modo, summam cutem exulcerat: pforas
& scabros vngues eximit. Succus radicibus ex-
pressus ad purgādum caput, naribus infunditur.
Decoctum eius cū melle gargarizatū, magnificē
id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. CAP. CLXXIII.

Variæ de
Othonna
sententiæ.

Othonnā aliqui maioris chelidoniæ succū
esse aiunt, quidam glaucij. Alij succum flo-
ribz corniculati papaueris expressum. Alij per-
mixtos cœruleæ anagallidis, hyoscyami, & papa-
ueris succos, esse contendunt. Alij troglodyticæ cu-
iusdam herbæ succum, quæ othonna vocatur: na-
sciq; eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum
spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribri-
mo

modo, & veluti à tineâ derosis, squalore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamenti adijcitur, ubi expurgare est opus: mordet enim & absterget omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

Auricula muris. CAP. CLXXV.

Muris auricula, quæ myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: solijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sūt qui alsinen, muris auriculam vocitant.

Glastum. CAP. CLXXVI.

Satium glastum, quo infectores lanarii utuntur, folium habet plantagini simile, verū pinguius nigriusq;: cuius caulis duum cubitorum altitudinem exedit. Illita folia tumores omnes discutunt, cruenta vulnera glutināt, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescenti

scientia vlcera, & quæ serpant, sanant. Sylue-
stre glaſtum ſatiuo ſimile eſt: folia fert maiora,
* λεπτοτέ = lactucaceis proxima: caules * prætenues multiſi-
gis, id eſt, doſ, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine
tenuiores. folliculi multi dependent, quandam linguarū effi-
giem referētes, in quibus ſemen: flore tenui, luteo.
Eadem quæ & ſuprà dicta præſtat: potu & illi-
tu lienosis auxiliatur.

Telephium.


CAP. CLXXVII.

Vulgo
Crassula
Telephium herba portulacæ ſimilis eſt, &
caule, & folijs: alus binas in ſingulis folio-
maior, & rum geniculis annectit, ramuli à radice ſeni ſe-
ſaba inuer- ptenī ve prodeunt, folijs referti cœruleis, craſſis,
ſa. lentis, ac carnoſis, flore luteo, aut candido. Naſci-
tur in uer vites, & locis cultis vere. Folia ſenis
horis illuta albam vitiliginem ſanant:
ſed poſtea hordeacea farina illini
debet. perunctam ex aceto
etiam in ſole vitiligi-
nem tollunt, ſed
ubi inaruerūt,
abſtergun-
tur.

SECUNDI LIBRI
FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS
 A N A Z A R B E I, D E
Medicinali materia,
Liber III.

Ioanne R V E L L I O Sueſſionenſi
 interprete.



V P E R I O R I B V S chariſſi-
 me Aree commentarijs, tradidi-
 mus de aromatibus, vnguentis,
 oleis, arboribus, earum fructibus
 & lacrymis, item de animalibus,
 cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia
 præditis. In hoc autem tertio radices, succos, ſe-
 mina, herbas, & quæ vernacula & inter ſe co-
 gnata cenſentur: quæq; pluribus ſcatent remedijs,
 proſequemur.

Agaricum.

C A P. I.

A Garicum radix fertur laſerpitijs ſimilis, ſed
 facie ſumma ſolutior, & rariore ſungo-
 ſiq; tota cōtextu. Duo eius genera: ſæmina, quæ
 præfertur, reclus intus venarum diſcurſibus con-
 ſtat. mas rotūdus eſt, & vndiq; compaſſior. Vtriq;
 guſtus in initio dulcis, mox ex diſtributione in
 amaritudinem tranſit: gignitur in Sarmatiæ re-
 gione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem

O

esse planta affirmentialij vi fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringēdi calfaciendiq; naturam habet: efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso, febrim non sentientibus: febriculosus verò, in aqua mulsa. Arquetus quoque, suspiriosus, iocineris, remumq; vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina egrè reddatur, si vulue strangulatus vrgeat, si pullor membra decoloret, drachma vna dari solet: si iabetes infestat, ex passo: si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo acida ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptū. Facit ad coxendicum, & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: feminis, quas inflatio vulue vexat, vtiliter equali modo datur. Horrores soluit datū ante febrim accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum: si serpentes ictum vibrarūt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus vitijs cōuenit, pro viribus, & etate datum, nunc ex aqua, nunc

ex

ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum.

CAP. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhaponticum vocatur. Ignoratur. cant, prouenit in ijs, quæ supra Bosphorum Nec enim sunt regionibus, ex quibus afferitur. Radix nunc est, quod gra, centauro magni similis, sed minor & rufior, Reupontici fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum nomine habetur, quod teredines non sensit, si gustatus cum die indicæ remissa adstrictione lentescat, manducatumque coitur. loreem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, liensos, hepaticos, tormina, ad renum, vesicæ, & pectoris vitia, aduersus intenta præcordia, & vulnæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excretionem, suspiria, singultus, dysenterias, & cælicorum affectus, contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem, quo agaricum potere, & cum eisdem liquoribus: si febre careant, in mulso: si aliter, ex aqua mulsa: si tabem experimur, ex passio: si lienis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stomachi, id est cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. liuentia lichen usque tollit, cum aceto illitum. inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

Gentiana.

CAP. III.

* Græcus

Gentianæ inuentio prima assignatur * Gentio Gentidi.

O 2

Illyriorum regi, à quo cognomen habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi plantaginive similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumē, paulū dissectis: caule cavo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binū saepe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, glumoso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longæ aristolochiæ, crassa, amara. Nascur in sublimibus montium iugis, vmbrosis locis, aquisq;. Vis radice excalfactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis, prodest: hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus eicit: impoſita, ut lycium, vulneraria est, & ulcerū cuniculatim depascentium medela. Succus præcipuè eodem effectu prodest: oculus inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Aristolochia. CAP. IIII.
Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit,
quod

quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, graviter olet. Longa, mascula appellatur: nonnullis dactylitis, longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, graviter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda, in orbem conglobata, rari modo. Longæ verò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & gravi. Est etiamnum tertia longa, quæ clematitis vocatur, ramulos habens tenues, refertos folijs subrotundis, minori semperuis similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; vestitas, privatim unguentorum spissamentis convenientes. Rotunda cæteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachmæ pondere ex vino bibitur, & illinitur: pota cum pipere, & myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum onera eicit: eadem efficit subdita in pessa. Rotunda ad eadem pollet: insuper singulis, suspirijs, horroribus, lien, convulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula extrahit, ossium squamas illit

adimit, ulcera purida exest, & sordida expurgat: cana cum iri, & melle explet, gingivas, & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur, viribus tamen inferior est.

Dulcis radix.

CAP. V.

Liquiritia
officinis.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappadocia, & Ponto: fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: folijs lentisci, densis, pinguibus, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fructu pilularum platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas lentium modo habet. * *μακρὸς*, her, rufus & * *paruas*: radicibus longis, ut gentiana, coloris lutei, subacerbis & dulcibus: quae densantur in succum, licyj exemplo. Is in arterie scabritia efficax habetur: verum oportet ut lingue subditus eliquescat, aestuanti stomacho, thoraci, ac iocineri convenit: sanat vesicae scabiem, & renum dolores, cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat, vulneribus illitus accommodatur, commanducatus ori prodest: recentis radice decoctum ad eadem convenit. Eiusdem farina pterygis commodissime inspargitur.

Centaurium magnum. CAP. VI.

Censetur
Reuponti =
cum offici =
varum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papaverum, in rotunditate oblonga: flos caeruleus: semen cnico simile, ceu laneis floccis quib

quibusdam involutum: radix crassa, gravis, solidissima, tripedalis, succo prægnaus, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac sylvas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoën, Lyciam & Smyrnam. Radix convenit ruptis, convulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramenta eius in collyrij formâ vuluæ subdita, menses atq; partus extrahunt. succus eadem præstat: vulneribus prodest: nam recens tussu, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

Centaurium minus.

CAP. VII.

Centauriū, limnesion aliqui vocauere, quoniam in riuo amet loca. Herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: folijs rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, læui & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illius vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit: bilem crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis convenientissimum.

mè infunditur : trahit enim sanguinē & dolorem leuat. Succus oculorum medicamentis perquā vtilis : siquidem cum melle caliginem oculorū expurgat : in vellere appositus, mēses & partus extrahit : epotus peculiariter nervorum vitij succurrit. Succī extrahendi ratio : Legitur herba semine pregnans, & diebus quinq; madefacta, decoquitur donec superemineat aque : mox ubi refrixit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usq; dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidamq; contundunt, atq; succum sicili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouētes, inspissant. Quod si quid concretum faucibus vasis adhærescat, de radunt, reliquaq; humori permiscunt. Noctu diligenter operiunt : nanq; ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta (vt in gentiane mentione reliximus,) preparantur : sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis herbis fluctantur, in sole, vt iam dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succus : sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lycium tamen, & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

Chamæleon albus. CAP. VIII.

Chamæleon albus, ixia ideo aliquibus vocatur, quod quibusdam in locis visciū circa radices eius inueniatur, quo pro mastiche vtuntur
mil

mulieres: folia habet silybo aut carduo similia,
 *asperiora, acutiora, nigroq; chamæleone valido * Sic Plin.
 ra: caulem non promit, verum ex medio spinas, græcus co=
 echini marini, aut cinare modo, erigit: flores pur= dex $\omega\alpha\chi\acute{\upsilon}$
 pureos, velini papporum lanugines emitit: semen $\tau\phi\alpha$, id est
 cnici simile: radicem in letis collibus crassam, in crassiora:
 montosis verò graciliorem, in profundo albam: ni fortè / gæ
 aliquatenus aromaticam, gravi odore, dulcem. $\chi\acute{\upsilon}\tau\phi\alpha$ le=
 Quæ pota acetabuli mensura, latus interaneorum gēdū: quod
 tineas pellit. Bibitur autem in vino austero, cum ex herbariū
 origani feruefacti succo. Hydropicis commodis= collatione,
 sinē drachma in vino datur, etenim eos extenuat: si quādo vi
 contra difficultatem vrinae decoctum propinatur. dere contin
 Hausta in vino, serpentium venenis resistit: oc= gat, facile
 cīdit canes & sues: mures item necat, subacta dūdicane=
 cum polenta aut aqua, & oleo madefacta. rh.

Chamæleon niger. CAP. IX.

Chamæleon niger, folijs scolymo similis esset,
 nisi minora, tenuioraq; , ac rubro distinctū
 viderentur: caulem emittit dodrantalem, crassi=
 tudine digitali, subrubrum: & in umbella flo=
 res spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores:
 radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ
 dissecta flavescit, & commāducata mordet. Pro=
 uenit in campestribus, siccis, & cliuosis tracti=
 bus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti
 sutorij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem
 abigit: eadem, cum sibi sulphur & bitumen ascia=
 ut, & cocta in aceto illinitur, impetigines ab=

sterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat: cum pari pipere & cera oblita radix, do-
lenti denti auxiliatur. Radice concisa, & in ace-
to decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si
scriptorio stylo feruens admoneatur: vitia cutis
in facie, vitiliginesq; cum sulphure emendat: ero-
dentibus medicamentis admiscetur: phagedenas,
Nominis ra tetraq; vlcera illitu sanat. Quare chamaleo vo-
rio. cetur, à varietate foliorum euenit: mutant enim
cum terra colorem: hic viridia, illic albicantia,
alicubi cœrulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Crocodilium. CAP. X.

Crocodilion chamæleontis nigri figuram ha-
bet. Nascitur in syluosis, radice longa, leui,
aliquantum lata, odore, vt nasturiij, acuto. Fer-
uefacta in aqua & pota radix, sanguinem copio-
sum per nareis pellit. Datur lienosis, eos euidenter
adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vi-
scutum, quod suapte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum Veneris.

CAP. XI.

Virga pa-
goris vul-
gò.

Dipsacum aculeatarum generis est: caulem
habet altum, spinis horridum, folijs lactucæ,
spinosis, binis genicula singula complectentibus,
prælojis, ceu quasdam bullas intus & extra acu-
leatas, in dorsi medio habentibus, concauo alarum
sinu, in quo imber aut ros asseruetur: inde dipsa-
ci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine cau-
lus, singula surculis capitula insunt, oblonga, echi-
nata

nata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissecta; medulla tenuis, vermiculos ostendunt. Sanaunt rimas sedis, fistulas; si tusa & decocta in vino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, verrucis; pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo aligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis: folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora, aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine: albicantem, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu nucis, sed rotundius. Huius radix pota, celiacis, stomachicis, & qui cruenta exsuscitant, efficax est: urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolores collui prodest. Epotum semen convulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica. CAP. XIII.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum val

valet. Prouenit in asperis.

Carduus. CAP. XIII.

Est gallorū
Artichau.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamaeleonis habet, aut albæ spinæ nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in vino bibatur. Copiosam autem urinam fetidamq; expellit. Herba cum recens tenerefcit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. CAP. XV.

Poterium, Iones neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternumve cubitorum, nervosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tusæ, præcisæ nervus & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius uerborum affectibus prodest.

Acanthium. CAP. XVI.

Acanthium albæ spinæ simile, folijs nucleatis per extremitates,* & lanugine araneosa obductis] ex qua collecta & neta, vestes bōbycinis similes texūt. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

* Additum
ex Plinio.

Acan

Acanthus. CAP. XVII.

Acanthus, Romani pæderotam vocant, na= Officinis
 scitur in hortis, petrosus, & rigus: folia ha Branca vr
 bet multo lactucaceis latiora, & longiora, erucæ sina.
 diuisura, nigricantia, pingua, lævia: caule binum
 cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope ver=
 ticem ex intervallis circumdatum foliolis, cœnu=
 camenta quædam oblonga referentibus, spinos=
 sis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum,
 luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur
 longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vltus
 igni & luxatis artibus illitæ subueniunt: potæ
 urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, con=
 uulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt. Nascitur
 & syluestris acanthus, scolymo similis, aculea=
 tus, breuior quàm sativus, & is qui hortis pro=
 uenit: cuius radix ad eadem ad quæ superior
 efficax.

Anonis. CAP. XVIII.

Anonis, quam aliqui ononida appellant, ra= Vulgò, Re=
 mos habet fruticosos, dodrantaes, aut pau= sta bouis.
 lo maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis
 alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticu=
 læ, tenuibus, pusillis, ad rutæ aut * praten= * Suspicio
 folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non in= lotum syl=
 iucundè olentibus. Muria conditur, anie quàm uestre in=
 spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus telligendū:
 spinis, & veluti spiculis firmioribus horret: radi= ac ob id for
 cem mittit candidam, quæ excalfacit, & exte= tè praten=
 nuat:

sem dici, nuat: huius cortex ex vino potus, urinam ciens: quod trifo= calculos comminuit, margines ulcerum erodit. lū pratesis Radix cum decoquitur in p̄sca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hē= lūis: vt volu morrhoides sanare creditur.

mine quar

Leucacantha. CAP. XIX.

to à Diosco
ride depin=

L Eucacantha, prædita est radice cyperi, valida & amara, quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathus tribus ex vino poto. Eadem ruptis & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbere effectus.

Tragacantha. CAP. XX.

T Ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nūitur, vnde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nunquam tenuia exoriuntur, quæ sub Officinis se spinas albas, rectas & firmas occulant. Est Dragagan etiamnum tragacantha, lacryma: quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, leuis, sincera & subdulcis. Cuius spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusus voces, cæer. usq; destillationes, cum melle in delinētu: subdita quoque lingue liquescit, & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur, contra remum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

Eryn

Eryngium. CAP. XXI.

Eryngium aculeatarū generis est. Cuius so- Nunc corru-
lia in principio, sale cōdita, in cibos recipiunt pro vocabu-
tur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, lo Iringum
gustū aromatica. Sed ubi adoleuerunt circa com- dicitur.
plures caulium eminentias in spinis aculeantur.
in quorum summitatibus globosa capitula, dura-
rum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim
circumuallantur, quorum colos aliis viridis, aliis
albus, interdum cœruleus inuenitur. Radix ob-
longa, lata, foris nigra, internè candida, pollicis
crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & cam-
pestribus. Vim habet calfactoriam: p̄ta menses * Per an-
& vrinas pellit, tormina inflationesq; discutit: thericum
contra tocinerum vitia, serpentium morsus, & caulē As-
hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduer- phodeli,
sus plurima, cū seminis pastinacæ drachma vna: cui aptis-
appensa illit aq̄, tubercula discutere proditur. Po- simè com-
ta cum hydromelite radix, opisthotonicis & co- paratur
mitialibus medetur. Aloë, hic
intelligi-
mus: quā-
uis Diosco-
rides in
Asphode-
li huc Ha-
stulæ re-
giæ histo-
ria, ei? flo-
rē hoc ap-
pellari no-
mine tra-
dat.

Aloë. CAP. XXII.

Aloes folium scille similitudinem habet, rides in
crassum, pingue, modicè latum, rotundum, Asphode-
retorsus pandum: folia vtrinq; ex obliquo lon- li huc Ha-
gioribus interuallis striantur, & in spinulas de- stulæ re-
sinunt retusas truncasq;. Caulis emittitur non giæ histo-
dissimilis * antherico: flos albus: fructus hastule ria, ei? flo-
regiæ cognatus: graui tota est odore, & gustu pellari no-
amarissima: radice vna, cœu palo, in terram depa- mine tra-
dat.
Eta.

Etia. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nasctur etiam in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi generæ: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse videtur. alterum ad iocineris imagi-

* Plin. pin- nem vergit. Eligi debet, * syncera, quæ nihil do-
guis, qui nō li sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, fria
καθαρά, bilis, ac iocineris modo coacta, facile liquefcens,
vt nostri co eximiæ amaritudinis: improbatu nigra & fra-
dices ha- ctu contumax. Gummi eam adulterant: quod de-
bent, sed prehenditur gustu, amaritudine, & valido odore:
λιπαράν eoq; argumeto, quòd digitis friata nō ad minima
videtur le vsque frusta resoluitur. Nec desunt qui acaciam
gisse. immisceant. Natura eius est spissare, exiccare,

somnum allicere, & corpora densare, aluum resol-
uere. Stomachum repurgat binum cochlearium
mensura, in aqua frigida aut egelida pota: sangui-
nis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tri-
bus obolis ex aqua, aut drachmæ pōdere in potu:
deuorata cum resina, aut cum aqua, vel melle co-
cto sumpta, alium soluit: purgationis perfectæ cau-
sa, tribus drachmis sumitur: alijs purgatorijs me-
dicaminibus admista, præstat vt minus stoma-
chum infestent: sicca glutinands vulneribus in-
spargitur, vlcera ad cicatricem perducit, colicæ
betq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus
medet

medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passio sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit, pterygia ad cicatricem ducit, liuores & insignita, ex melle tollit: priuacim scabras lipituidines, pruriginesq; angulorum, permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet, cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & vino proficit: oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreretur. Lauatur, vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Abfinthium.

CAP. XXIII.

Absinthium, aliqui bathypicron, herba vulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhaesit: urinam cit, & crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo gallico potum: fastidia discutit, & arquatos sanat madefacti diluunt, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur ixiæ venenis cum vino: item cicutæ, & muris aranei morsibus, & draconi marino.

P

Angine eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorum caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum vaporis suffitus compefcit. Decoctum in passio dolentibus oculis oblinitur: item prae cordijs & iocineri, tritum cum cerato cyprino: stomacho quoq; longa valetudine laborati, cum rosaceo: cum ficis autē, aceto & loliacea farina, aquae inter cutem lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthien vocant, praesertim in Propontide & Thracia, quo ad amara dicta vtuntur, cum febris carent: alioquin in aestate propinant, & acceptam huius vino incolumitatem referunt. Insparsum arcis absinthium, vestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & a corpore arceat: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem praestare effectus. At tamen potionibus improbat, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum absinthium. CAP. XXIII.

Absinthium marinum, quod aliqui seriphum vocant, copiosissimum in Tauro monte: iuxta Cappadociam & in Taphorisi Aegypti gigni-

* Abroto = iur: quo Isiaci pro oliuae ramo vtuntur. Herba est non in marem tenuis, * abrotoni parui similitudine, referia mihi intellige. nutulis seminibus, subamara, stomacho inimica.

Ea

Ea grauit̃er olet, & cum quadā calfactione adstringit: per sese aut cum oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, aluum leuigat: cum edulio autem vel lenticula decocta, eadem prestare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpebus similia scatet: id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

Abrotonum. CAP. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim incisis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum grauitate quadam & amaro gustu: id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis uti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Crudum semen, tritum & feruifacitum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrine angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est: horroribus ex oleo ilinitur: serpentes & substratu & nidore fugat: contra ictus eorum cum vino potum prodest, pri-

uatim efficax contra scorpionum & phalangio-
rum venena: oculorum inflammationibus commo-
dè illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane: tritum
cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula di-
scutit: irini compositionibus admiscetur.

Hyssopum. CAP. XXVI.

HYssopum, herba nulli non cognita, diuini
generum est, montanum & hortense. Opti-
mum est Cilicium. Vim habet extenuandi & cal-
faciendi: decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta,
potumq; peripneumonicis, diuturnæ tussi, suspirio
sis, destillationibus, & orihopnoicis auxiliatur: ti-
neas enecat. Idem facit, si cum melle delingatur.
Crassum humorem per alium extrahit, decoctum
ex aceto mulso epotum: & ad subducendam aluum
cum ficis viridibus detritis manditur, vehemen-
tiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deiecit:
colorem in corpore fouet: lieni, & aquæ inter cu-
tem, cum fico nitroq; inflammationibus quoque
ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum, su-
gillata discutit: cum decocto sicorum, optimè an-
ginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, detium
dolorem in collatione sedat: inflationes auricula-
rum vaporis suffitu discutit.

Stœchas. CAP. XXVII.

Officinis, **S**Tœchas, iuxta Galliam in insulis eiusdem no-
Stichas A= minis è regione Massiliæ gignitur, unde co-
rabica. gnomentum accepit. Herba tenuibus surculis, coma-
thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquan-
tum

tum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pe-
 ctoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Visce-
 ra omnia & vniuersum animantis habitum ex-
 tenuat, ab obstructionibus & fæctu liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cuni-
 lam vocant, folium habet hyssopo non dissi-
 mile: umbellam autem non in rotæ speciem orbi-
 culatam, sed veluti multifidam, semine in summis
 virgis haudquaquam denso. Excalfacit: vnde de-
 coctum cum vino potum, de morsis à serpente con-
 uenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex pas-
 so: si gypsum aut ephemerum, ex aceto mulso pro-
 pinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui
 datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua
 mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses
 ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pru-
 riginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in
 balneis prodest. Succus virentis tonsillas, vnam,
 & oris ulcera sanat, & per nares, ex oleo irino
 infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mul-
 cet. Conficitur ex eo, & cepis, & rhois frutice quo
 ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum,
 his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos
 insolatis, dum caniculæ sydus flagrat. Herba au-
 tem substratu serpentes fugantur. Quæ onitis ap-
 pellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior.
 Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei
 origani Heraclei, sed multo inefficacior. Syluestre

origanum, aliqui panaces Heraction, alij cunilam vocant, ex quibus est Nicander Colophonius. Folijs est origani, ramus tenuibus, dodrantem altus, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex vino poti auxiliantur.

Tragoriganum.

CAP. XXIX.

Tragoriganū tenuis frutex est, sylvestri serpillio aut origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis latius virentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui præsum vocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia excalfaciunt, urinam cient, alio accommodantur, decocto potu bilem deiectionem, lienosis ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ venena in vino bibuntur, menses trahunt: peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti, imbecilloq; traditur. Item si à maritima iactatione nauseæ, & æstus præcordiorū excitetur: tumores verò cum polenta illita discutiantur.

Pulegium.

CAP. XXX.

Pvlegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac partus eiecit: pulmonis vitia ex melle & aloë potuntur.

zum extrahit, & cōulsis auxiliatur: nausæas sto-
machicq; intercisiones, ex posca permulcet: atram-
bilem per aluum exigit. Bibitur in vino utilissimè
contra serpentium morsus. Defectos animo recreat,
cum aceto naribus obiectum: gingivas arefacti ci-
nere corroborat, illitum cum potentia inflāmatio-
nes omnes sedat, podagris per se subuenit, imposi-
tum vsq; dum rubescat locus: cum cerato varos
extinguit, lienosis cum sale utiliter illinitur: deco-
ctum eius ablutas prurigines mitigat, conuersus
vulnus corrigit, contra inflationses duritiasq; vul-
us, in desessiones conuenienter adyicitur. Vocant
aliqui blechona, quoniam dum fioret gustatum à
pecoribus, balatum concitat.

Dictamnium. CAP. XXXI.

Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium Græcus,
vocalur. Cretensis herba est, acris, levis, Dictamn:
pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento ac sic etiā
quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nul- Plinius.
lum aut semen profert. Præstat omnia quæ sati-
uum pulegium, sed efficacius multo: nam non po-
tum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, de-
functis partus eicit. Prodiunt in Creta capris sa-
gittis percussas, huius herbæ pastu, eas excute-
re. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum po-
lenta tritus. Herba impactos pedibus reliquove
corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienis dolorem
efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Me-
tunt æstale & autumno. Radix eius gustu cal-

facit, partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præsidio est. Tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu seuiant, appensaquæ contactu exanimet. Vulneribus ferro illatus, et venenatus moribus, infusus succus præsentaneo est remedio, si etiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudodiētammum vocant, multis in terris nascitur, autē dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eisdem effectus præbet, sed inefficacius multo. Defertur à Creta alterum diētami genus, folijs sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores syluestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus quæ aduersus serpentium iniurias consinguntur, iheriaca vocant.

Salvia.

CAP. XXXII.

Salvia siue eleisphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi vestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquàm iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus syluestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & vrinas, decoctum foliorum ramorumquæ potus, & partus extrahit, & pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, vulnerū sanguinem cohibet, tetra ulcera

ra

ra purgat: testium pruritus sedant rami foliaq;
si* decocto eorum foveantur.

*συνὸ οἶνον.

Mentha.

CAP. XXXIII.

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones, cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mammas, si tendantur, aut lacte turgeant, compescit: cum sale canum morsibus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit: lingua scabritiem confecta lasingat: coire lac, densariq; in caseum non patitur, si folia positionibus lactis immergantur. In summa, stomacho vilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha, Latini menthastrum Mentha vocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore, strum, quàm sisymbrij, odore magis viroso: quare minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha.

CAP. XXXIIII.

Ex calaminthæ generibus quedam montibus familiaris, folia ocimi habens, incana, tum officinarum. Altera pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegiū ideo appellarūt, quòd odore ipsum æmuletur: nepetam Latini vocitant. Tertia mentha Nepeta.

P 5

thaſtro cognata eſt, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus, quàm ſuperiora, ſed viribus inefficacior. Omnium folia guſtu impenſe feruētia, & acria: radix ſuperuacua. Naſcitur in campeſtribus, aſperis, & aquoſis. Potu aut illitu demorſis a ſerpēte opitulatur. Decoctum potu menſes, & urinas expellit: ruptis, conuulſis, orthopnoea, torminibus, cholericis, horroribusq; auxiliatur: regium morbum expurgat: præſumpta in vino venenis reſiſtit: tineas cæteraq; interaneorum animalia, cum ſale & melle pota, enecat: nec ſecus cocta crudave, ſi teratur. Elephanticos eſitata adiuvat, ſi poſtea ſerum lactis ebibatur. Folia detrita ſi invellere ſubijciantur, menſes extrahunt, & partus enecant. Accenſa aut ſubſtrata, ſerpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta, & illita, & ſugillata tollunt. Calamintha iſchiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, ſummam cutem exurens. Vermes necat ſuccus auribus inſtillatus.

Thymum.

CAP. XXXV.

THymum ab omnibus cognoscitur, ſurculosus frutex, exilibus folijs multis & anguſtis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureſcente refertis. Gracili ſolo, & petroſo prouenit. Vim habent hanc, vt cum ſale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decoctum prodeſt orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menſes, partus, & ſecundas pellit:

urin

vrinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores disculit, cum aceto illitū: concretum sanguinē dissoluit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesq; tollit: schiadicis cum vino, & polea impisum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Per quoniam vile pro condimento, duntaxat ad vsus eorū, qui rectè valent.

ANNO TATIO.

Herba, quam Medici pro Satureia hodie vsurpant, hyssopi folio, thymū magnitudine longè exuperat, vt non esse genuinā, ac hic descriptam, satis eius historia conuincat.

Satureia.

CAP. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamē, & tenerior: defert spicam florum plenam, coloris herbacei. Eadē potest quæ thymum, si modo consimili sumptitetur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quedam satua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Serpillum.

CAP. XXXVII.

Serpillum duorum generum est: Hortensē odoris sampsuchū inuitatur, atque in coronis addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si quæ eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores: in macerijis multo procerius asurgit. Syluestre, xygis appellatum, non serpit, sed

sed in altitudinem increfcit, ramulos adēs tenues, furculosos, folijs refertos longioribus quā rutæ, & durioribus, angustis: flores incundè olent, gustati acres: radicis nullus vsus. Nascitur in petris, satino efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi vsū aptius. Menses trahit, vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis, & iocineris inflammationibus, auxiliatur: & aduersus serpentes potu illitūre: capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & madefactū in aceto: maximè verò phreniticis, & leihargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. CAP. XXXVIII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum vendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius calaminthæ, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis: suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropticis, & ys quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subdita in pessa trahūt: contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur: luxatis tumoribusq; cerato excepta imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum poliline polenta illini prodest. Acopis malignatusq; calfaciendi gratia commiscetur.

Mel

Melilotos, siue fertula Campana.

CAP. XXXIX.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam: inflammationem omnem emollit, praesertim, quae in oculis, vulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fenigræci farina, lini semine, aut polli-ne, aut capitulis papaueris, in iuybore. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, vino aut galla sanat. Stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antiè dictis leniat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosacea mada facta, capitis dolorem lenit.

Marum.

CAP. XL.

Marum herba cognita vulgò, surculosa, flore origani, folijs multo candidioribus, flore odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem. Substringit enim, & modicè calfacit: qua de causa illius serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tralleis copiosissima gignitur.

Acinos.

CAP. XLI.

Acinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata,

rata, sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum potest sistit. Illita panis ignemque sacrum sanat.

Baccharis.

CAP. XLII.

* οὐόδης.
i. odorata.

Baccharis herba * fruticosa, quæ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squalidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ iusti, & urinae difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissime datur in vino. Recens radix apposita, partum extrahit: puerperis eius decoctum in dejectionibus prodest: in diapasmata utiliter inferitur, iucundi odoris gratia. Folia, utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profum: oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta.

CAP. XLIII.

Ruta montana s. luestrisque sativa, & hortensis acrior est, & in cibis damnata: sativa verò quæ sub ficu arbore nascitur, magis in cibos admittitur. Vtraqueurit, calfacit, exulcerat: urinam ciet, menstrua pellit, aluum sistit potu cibo: let

letalium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglande, aridusq; ficis, inefficaces venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere convenit: geniturâ cibo potius extinguit: cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumq; cruciatus, & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut ante dictum est. Item ad inflationes coli, vulvæ, rectiq; intestini, cum oleo decocta, & infusa. Fœminas vulvæ strangulatû liberat, si à genitali, sedetenus cū melle subijciatur. Feruescēta ex oleo, & pota, ventris tineas excutit: articularijs doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Cruda conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxilium datur, profluentem naribus sanguinē sistit trita & indita, testū inflammationibus cum laureis folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto, & cerato prodest. Cum pipere autem vino, & nitro affricta, albæ vitiliginis medetur. Cum eisdem illita fornicationes tollit, & verrucas quæ thymi florem representat: contra impetigines cum alumine, & melle utilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce

ce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum sceniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerusa persanat: mansa, aliorum ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Oportet itaque eam unctis antea manibus, & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pulvis inspersum feles arcere. Adijciunt eam quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, viperis scatet. Semen eius potum contra intestina vitia efficax est: in antidota commodè additur: contra incontinenciam urinae tostum, semen septem diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris ruta satinae similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quàm hortensis, & validior. Sylvestris, vi potest noxia, cibis abdicatur.

Sylvestris ruta.

CAP. XLIII.

Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia, & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò, quàm alterius ruta longioribus, tenerioribusq; odore graui: flore

re candido: capitulus in cacumine paulo maiori-
bus quàm sativæ rutæ, quæ tribus maximè parti-
bus constat: in quibus triangulum semen, subru-
fum, gustu amarum recluditur, cuius est usus. Se-
men autumnio maturescit: quod cum melle, vino,
croco, & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teri-
tur cōtra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam
harmalam vocent, Syri besasan. Qui Cappado-
ciam incolunt, moly, quoniam quandam cum mo-
ly seruet similitudinem: radice nigra, flore candi-
do. In collibus, & lato solo provenit.

Moly.

CAP. XLV.

Moly folia habet graminis latiora, humi
sparsa: florem albæ violæ similem, sed mi-
norem, ac magnitudine violæ purpureæ respon-
dentem, lactei coloris: caulem candidum, quater-
nūm cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid
quod allij speciem referat. Radix parva, bulbosa,
quæ mirū in modum valet ad aperiendas vulvas
si trita cum irino unguento, in pessō subijciatur.

Panaces.

CAP. XLVI.

Panaces nonnullis heracleum dicitur: ex quo
popopanax colligi solet. Plurimum in Bœotia,
& in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compen-
dijs, & quæstus, qui ex eo liquore facitatur, gra-
tia studiosè colitur. Folijs est asperus, in terra ia-
centibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea ac-
cedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis: cau-
le, vi ferula, altissimo, qui lanugine quadam in-

Q

canescit, folijs etiam minutioribus obsitius, musa-
rys, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine
odorato ferventéque: radices habet multas ab
origine sua, candidas, graneolentes, craffi corti-
ci, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Li-
bye, & Macedonia. Excipitur succus incisa ra-
dice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum
succum emittit, qui siccatus, in summa cute cro-
ceum colorem contrahit. Effluentem autem suc-
cum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ
siccata tolluntur. Simili modo caule messibus in-
ciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex
radicibus, albæ, rigentes, distentiæq; siccæ, quæ
cariem non sentiant, aromaticæ, fruentes gustu.
Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex
agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Ma-
ximè in hoc succi genere probatur, quàm ama-
rissimus, internè albus, aut subsulvus, foris ad
croci colorem inclinans, levis, pinguis, friabilis,
tener, statim in aqua cliquescens, gravi odore.
Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammo-
niaco aut cera: sed sinceri experimentum est,
si digiti in aqua friatus resolvatur, & lactescat.
Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus februm
circuitibusq; vulsis, ruptis, laterum dolori, tormi-
nibus, stillicidio urinae convenit. Contra vesicæ
scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur: men-
ses trahit, foetum enecat, inflationes quæ vulvam
malè habent, duritiæq; ex melle dilutus, discus-

tit: ischiadicis illinitur, acopi & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum uia passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorum aciem illitus excitat. Ex eo & pice optimum sit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta confissa, vuluæ adnota, partus extrahit: ad vetera ulcera efficax est, nudata ossa corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ venenum ei aculantur, & contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepii. CAP. XLVII.

Panaces Asclepij eadem à solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatam, circa quem folia fœniculi fiunt: sed maiora tamen hirsutioraq; odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicant aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, cōtra ulcera, phagedænas, & tubercula, si trita cum melle imponantur: aduersus serpētes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij cumulam, de qua in origani mentione diximus.

Panaces chironium. CAP. XLVIII.

Panaces Chironium in Pelio monte maxime prouenit: folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non aliè demitti-

tur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma, eadem praestat.

Ligusticum.

CAP. XLIX.

Galeno Li
bysticum.

Ligusticum, quod alij panaceam, alij panaces vocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino: unde nomen traxit. Panaces incolae non ab re appellant: quoniam & radice & caule, heracleotico panacis simile sit, & viribus eisdem praeditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maxime *παρά τοῖς μέν* iuxta fluentia. Cauliculum fert anethi, διώγου ξί, geniculatum, tenue, & in circuitu folia fertula id est, iuxta campanae, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & longe magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum & oblongum, fœniculo proximum, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisq; vis excalfactoria, concoquens: prodest ad intestinos dolores, tumores, cœcoctiones. Item ad inflationes, praesertim quibus stomachus turgeat: & contra serpentium ictus: urinas & menses potu trahit. Eosdem praestat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur: ori perquam utile: quare pro pipere vitumtur eo indigens, ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen fœniculi aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Paſtin

Pastinaca.

CAP. L.

PASTINACA sylueſtris folia gingidij habet, latiora, ſubamara: caulem rectum, ſcabrum: umbellam ſimilem anethi, in qua flores inſunt cãdidi, & in medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ſerè ad croceum accedente: radix digiti craſſitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impoſitum, menſtrua mouet. Iis conuenit in potione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut ſi aqua cutem ſubiit: ſerpentiũ morſibus iectibusq; prodeſt: praſurmentes id nulla affici iniuria à ſerpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit, venerem ſtimulat, partus apoſita eijcit. Folia trita, & cum melle impoſita, phagedenas vlcerum purgant. Satius ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Sefeli.

CAP. LI.

SESELI Maſſilienſe folia ſerniculi habet, craſſiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, ribus Siler in qua ſemen oblongum, anguloſum: deguſtanti mōtanum. Statim acre: radix longa eſt, iucundi odoris. Semen & radix excaſficiēdi vim habet: potu ſtrangurie & orihopnæ medentur, ſuffocationibus mulierum comitialibusq; proſunt, menſes & partus trahunt: ad omnia interna mala polient, tuſim veterem ſanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina diſcutit: epialis febris utile, & contra perfrictiones in itineribus, cum pipere

& vino bibitur: capris, cæterisq; pecudibus, datur in potu, quò facilius suos fœtus enitantur.

Aethiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Mafsiliensi odoratio re, & acriore, multum suavi. Peloponnense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Mafsiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus præditum est: nascitur in asperis, riguis &

* in idæ, collibus, inuenitur & * in insulis.

id est, in Creticum Seseli.

CAP. LII.

Ida monte. **T**Ordylum, quod aliqui Creticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula sirculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinæ difficultatem bibitur, potu cit menses. Succo seminis caulisq; virentis, ternis obolis ex passò decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delin-
clu cum melle.

Sison.

CAP. LIII.

Hic omis- **S**ison exiguum semen est, in Syria natum, apio
sa est ab in simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra
terpæ de- lienis vitia bibitur, vrinæ difficultate potu emen-
scriptio. dat, remoratos menses citat. Quo in condimentis,

cum

cum cucurbita, & aceto, indigenæ vtuntur. In casumine granula multa gerit.

Anisum.

CAP. LIIII.

ANisum in summa excalfacit, exiccat: oris halitum iucundiores facit, doloris leuamentum præstat, vrinam ciet, aquam quæ subijt curam dissipat, potum sitim cohibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba feminarum profluvia sistit, lac ad mammas elicit, venerem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. Melius semper recens, plenum, non fursurosum, odore præstans. Inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum.

CAP. LV.

CArum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, vrinam concitat, stomacho utile, os commendat, concoctionem adiuvat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anisi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo manditur.

Anethum.

CAP. LVI.

ARedi anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac euocat, inflationes & tormina sedat, * τὸ ἄλνιον vomitionesq; sistit, vrinas ciet, singultus σπέρμα lenit, oculorum aciem hebetat & genituram re-καίει ηὐγὴ stinguit assidue potum. Fœminis vuluæ malo οὐκ ἀποκαταπλά portunis, ad defensiones utile. * condylomata illi-ἀδερ. tus eius cinis tollit.

Q 4

Cuminum satium. CAP. LVII.

Cuminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellavit. Secundum locum tenet Aegyptium: reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat: ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum, aut cum hordacea farina illitum. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. Testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uia passa, aut lolij farina ceratōre. Mensum abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

Syluestre cuminum. CAP. LVIII.

Syluestre cuminum, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatiae Asia, atque Carthagine Grae ne Hispaniae gignitur: frutice paruo: dodrantalicus: sed re= caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenui= etius Mar= bus, veluti serratis, & gingidij diuisura. In ca= cellus, Ga= cumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore, nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesque: item contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto sedat: stomacho utile, quem humor vexat, sugillata tollit, si māducatum cum melle & uia passa illi=

natur:

natur: testium inflammationibus, adiectis eisdem illitum medetur. Est & aliud sylvestris cumini genus, satius non dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublimē exerta, in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium morsibus presidio est. Calculosis & ijs qui urinae stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur: sed apud semen feruefactum postea bibendum est.

AMMI. CAP. LIX.

Ammi * Aethiopicum cuminum appellant. * ἐνιοι ἡγεῖ
* plerique hoc natura diuersum esse ab illo ἔτρο.
existimant. Vulgò notū est: semen exile, multò minus cumino, origanum * resipiens. Eligendum est λιχὸν κύν-
purum, minimè fursurosū. Vis ei excalfactoria, μινον κα-
feruens, & exiccās: facit ad tormina, urinae diffi- λῶσιμ, ἔ-
cultatem, serpentium ictus, cum vino potū: men- νιοι ἡ ἔτ.
strua ciet. Miscetur derodentibus cantharidum * τῆς γούρας.
medicamentis, quae ecdoria vocant: ut inde exortis
urinae difficultatibus resistat. Sugillata cum melle
tollit, colorē potu aut illitu mutat in pallorem. Suf-
fitum cum vna passa aut resina, vuluas purgat.

CORIANDRUM. CAP. LX.

Coriandrum aut corianum vulgaris est no-
titia, vim refrigeratorem habens. Quare il-
litum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & vl-
ceribus quae serpunt, medetur: epinyctidas cum
melle vel vna passa, testium inflammationes, car-
bunculosq; sanat: cum faba fresa, strumas & tu-

* δάριον. *bercula discutit: tineas interaneorū expellit* * semen cum passo potum, & geniturā adauget. largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo, & copiosiore vsu abstinentum. Succus cum cerussa, spumāve argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium. CAP. LXI.

Hieracium magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringēdi: unde illitum, stomacho adluanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitum: cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicāt. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

ANNOTATIO.

Capitula cicutæ.] Legitur in Græcis, corruptè ac nullo planè, si quid est in me iudicij, sensu, κεφάλια μηκωνίω παρεμφερῆ, id est, capitula succo papaueris similia. Videtur autem locus ex Theophrasto ac Plinio, qui Oreoselinon cicutæ folio describūt, hoc modo posse restitui: φύλλα πωνέω παρεμφερῆ, id

id est, folia cicutæ non absimilia: quod cum alijs satis aptè cohæret. Velim tamen in hac re, vt & alijs omnibus, suo quenque vti iudicio.

Apium. CAP. LXII.

Hortensis apij herba ad eadem ad quæ co= Nostru Pe= rianum conuenit: inflammationibus ocu= troselinum, lorum, cum pane aut polenta illinitur: æstuantem vt colligit stomachum mulcet: mammarum duritiam ex la= tur ex no= cte concreto contractam reprimat: urinã ciet, siue tis Plinij. crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radi= cisq; potum, venenorum noxæ resistit, quum vo= mitiones excitet: aluum cohibet. Semen vehemen= tius urinam pellit: contra serpētium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis quæ dolo= rum leuamenta præstant: theriacis quoque, ac tussis remedijs. * Eleoselinum in humidis nasci= * Apium offi= tur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreoselinum. Oreoselinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum ramuli, * & capi= tula cicutæ, multo tamen tenuiora: semine cumi= ni, oblongo, acri, & odorato, tenui: nascitur in petrosis & montibus. Urinam ciet, semine ac ra= dice in vino potis: menses trahit. Antidotis, nec= non medicamentis urinam cientibus, & excalfa= ctorijs, inscribitur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis pro= uenit: aliud enim est petroselinum. Petroseli= num

num in Macedonia provenit, in præruptis locis, semine ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit ac menstrua: contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renum, & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis vrinam cientibus. Hippofelinū,

* Galenus * Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, Smyrniū. quamuis aliud sit, quod propriè smyrnion dicitur, de quo se- ut paulò post referemus. Est autem maius & sa-
quenti cap. tino apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente veluti lineas: folijs latioribus, in puniceum versic dictum gentibus: coma rorismarini, florum plena, de pen-
fuisse, lib. 2. dentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflo-
de Alim. fa rescatur: ea semine turget nigro, oblongo, acri, solis cult. tradit. do, aromatico: radix dimittitur odorata, candida nec crassa, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, ut apium. Radix cruda coctave estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso vino menses cieat: algentes calfacit potu aut illitu: vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Smyrniū. CAP. LXIII.

Smyrniū, quod in Cilicia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, incūda, color

colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicæ, rotundo, nigro, sapore aspero, sicut myrrha, ita ut alterum alterius loco cadat: radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herba, & seminis excalfacere. Folij muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum sistunt, radicem contra serpentium ictus bibere conuenit, tusses & orihoeas mitigat, vrinae difficultati medetur: recentes tumores, collectiones, duritiesq; discutit, illita, & vulnera ad cicatricem perducit: partus abortu vitiat, si feruescenda subiiciatur. Semen, lienis, renum & vesicæ vitij prodest: menses & secundas pellit: commodè datur ischiadicis in vino, inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Elaphoboscum. CAP. LXIIII.

Elaphobosco feniculaceus caulis est, * aut erorimarino similis, geniculatus: folijs diuim digitorum latitudine, ut terebinthi, praelongis, aliquantum asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia umbellæ anethi similes, & semina eiusdem: florem subluceum: radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olere

* Intellige non coronariâ rosæ marinum: sed eâ, quæ simplici- ter hoc nomine appellat. de qua cap. lxx. huius libri.

man

manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, cerius serpentium moribus resistere.

Foeniculum. CAP. LXV.

Foeniculum si herba edatur, aut semen cum prisa bibatur, mammae lacte replet. Contra decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet: contra serpentium ictus in vino convenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. Contrita radices & cum melle illitæ, moribus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem mediū, dum herba floret rustici demetunt, igniq; admouent, quò facilius vi coloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorū.

Foeniculum erraticum, siue hippo-

marathrum. CAP. LXVI.

Est & sylvestre fœniculum, magnum: fert autem semen cachryi simile, cuius radix incundè olet, potaq; stranguriæ medetur: menses imposita ciet: ventrē sistit, radice aut semine potō, & contra serpentium morsus auxiliatur, calculosq;

losq; comminuit & regium morbum expurgat: la-
etis abundantiā facit decoctum foliorū haustum,
& fœminis à partu purgat. Traditur aliud hip-
pomarathri genus, longo, exili, & angustō folio:
semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Ex-
calfaciendi naturam habet, & viribus fœniculo
respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. CAP. LXVII.

Daucum aliqui Daucium vocant. Cretic-
um folijs fœniculo simile, minoribus &
tenuioribus: caule dodrantali, umbella coriandri,
flore albo: semine acri, candido, hirsuto, suavis-
mi odoris in mandendo: radix digitali crassitudi-
ne & dodrantis longitudine adolefcit: in saxosis
nascitur, & locus sole illustratis. Aliud eius ge-
nus, sylvestri apio simile, acre, odoratum, aro-
ma olens, feruentis gustus. Probatissimum Cre-
ticum. Tertium assignatur genus folijs corian-
dri, floribus albis, capite & semine anethi, mus-
scario pastinacæ: semine oblongo, ceu cumini,
acri. Omnium semen excalfacit: potum vrinam,
menses, & partus extrahit, torminibus liberat,
veterem tussim mitigat: phalangiorum morsibus
potum in vino auxiliatur: tumores illitu discutit.
Seminis dūtaxat in alijs generibus inualuit vsus:
in Cretico, etiam radicis, quæ maximè contra ve-
neratorum iniuriam in vino bibitur.

Delphinium. CAP. LXVIII.
Elphinium, surculose mittit à radice una
seſq

sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quæ delphinorum effigiem representant: unde tractum nomen est. Flos violæ albæ non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba, scorpiones resolui, atq; ignauos torpescere: semota verò ea, sese recolligere. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est delphinium, quod Romani bucinum vocant, superiori simile, sed folijs & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrum. CAP. LXIX.

Pyrethrum Romani salinarem vocant, folia caulemq; emittit vt daucum syluestre & fœniculum: umbellamq; anethi, circinatæ rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit: ideò in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horroribus efficax est & contra persfrictiones membrorum, resolutionesq; eximie conducit.

Rosmarinus. CAP. LXX.

Duo rosmarini genera: vnum secundum frugiferumq; cuius semen canchrys vocatur: folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudinis, aut maiorem, multis concaviis alis:

in cacumine umbellam, in qua semen copiosum,
candidum, sphondylo simile, rotundum, angulosum,
acre, resinaceum, quod in mandendo linguā exu-
rit: radix illius redolet, candida, prægrandis. Est
& alterum omninò cōsimile, semen ferens latum,
nigrum ut sphondylium, odoratum, minimè exu-
rens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba.
Verum id quod sterile dicitur, illorum planè simi-
litudinem refert: sed neque caulem, neque florem,
neque semen promit. Nasceitur in saxosis & aspe-
ris. Trita omnium herba cōmuniter hæmorrhoi-
dum profluvia sistit, sedis inflammationes & con-
dylomata mitigat, concoquit strumas & absces-
sus, qui ad maturationem agrè perducuntur. Sic-
cæ radices cum melle ulcera purgant: torminibus
medentur cum vino potæ, & contra serpentium
morsus conueniunt: menses & urinas cient, vete-
res tumores illitu discutunt. Tam radicis quam
herbæ succus, adiecto melle illitus oculorū aciem
exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitia-
le malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium,
auxilio est: regio morbo laborantibus cum vino
& pipere datur: sudores mouet, cum oleo perun-
ctum: ruptis & conuulsis prodest: podagris, cum
liliacea farina & aceto tritum, illinitur: purgat
pitilignes, addito aceto quamacerrimo. Semine
in potionibus utendum, eius quidam quod Can-
chryn non ferat, quippe illud sua acrimonia ar-
teriam exasperat. Rosmarinum cum erica na-

R.

sci, folijs lactuce sylvestris amara asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author est: potuq; idipsum alterutra parte purgare. Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi: quare abstergentibus medicamentis inferitur. Contra oculorum fluxiones capui illinitur, ita vt tertio die soluiatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

Rosmarinum quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, superne virentia, * Commo= * graui odore. Excalfactoria vi præditum est: redius Mar= gium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercellus, cum citationes bibatur: & vbi laborans exercitationi grauitate se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. odorata. Acopi, gluciniq; unguento admisceri solet.

Sphondylium.

CAP. LXXII.

Sphondylium folia quadamtenus platani & panacis habet: caules feniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, scilicet feli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, candida. Nasctur in palustribus & aquis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocineris vitis, regio morbo, comitialibus, orihopnoicis, uuluarum strangulationi. Venermosos suffitu reuocat: cum oleo commodè infunditur capitibus phrenetic

ticorum, & lethargicorū, item capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera colibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrassa eadem & iniecta callos fistularū de- rodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum suc- corum more exprimi, dein recondi solet.

Ferula.

CAP. LXXIII.

E Viridi ferula medulla pota utilis est ad cru- entas excreationes, coliacosq; & contra vi- perarum morsus in vino datur, erumpentemq; na- ribus sanguinem induta sistit. Semen potum tor- minosis auxiliatur: sudores ciēt, vincto ex oleo cor- pore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: mu- ria condiuntur.* Ferula itaque caulē profert ter- nūm sepe cubitorum: filia fœniculi, longè asperio- ra, & latiora. qua ab imo caule vulnērata saga- penum efficitur.

* Desunt in codice nostro gre- co, ac anti- quissimis quibusq; Marcello teste.

Peucedanum.

CAP. LXXIII.

P Eucedanum: caulem emittit tenuem, graci- lentum, fœniculo similem: comam habet staz- tim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: ra- dice nigra, crassa, graui odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello con- ciditur, profluensq; è plaga succus umbræ man- datur: in sole siquidem confestim euinescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo per- fisis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentia-

R 2

tur. Affatione radix inutilis fit. Tam lac quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora: verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdum etiã concreta inuenitur lacryma, iheris similitudine, caulibus radicibusq; adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufus, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum pencedanum prodest leihargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus, in vniuersum, vitijs neruorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi reuocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur: cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ovo assuinitur, suspirijsq; & torminibus, & inflationibus subuenit: ventrem leniter emollit, lienem absouit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distentiones potum, & vuluum aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

A M

ANNOTATIO.

* Herba doctis omnibus pro Melanthio recepta, folijs fœniculum potius quàm Senecionem videtur imitari, vt certè locū hunc esse aut deprauatū, aut verum ignorari melanthion, sic suspicandum.

Gith, seu Melanthium. CAP. LXXV.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dorantes excedens: folijs * vt senecionis minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, inter cursantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illiū fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentiginēs, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum veterē vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico: destillatione laborantes adiuvat, tritum in linteo, & olfactum: vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: diff. cultatem spirandi cum vino potum leuat: phalangiorū moribus ex aqua, drachmæ pondere, haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

R 3

Laserpitium, & Laser.

CAP. LXXVI.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum vocant: folijs apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis agrè concoquitur, resisteat noxia: sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis convenit cum irino aut cyprino. cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decocta: venenis pota resistit: os commendat, cibis aut sili permista. Laser è radice atque caule scarificatus colligitur. præfertur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non porraceum, odore valens, suavi gustu: quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustaverit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeò ut ne is quidem gustanti nisi paululum spiraret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odore. Laser omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut sube lomento: quod maleficium deprehenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem magudarin, & folia, maspeton vocant. Efficacissimum laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones illitum cum melle, dissipat: cavernis dentitudo

tium in dolore inditur, aut cum thure in linteo
circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in po-
sca, os colluitur: ijs prodest, quos bestia in rabiem
efferata momorderit, vulneribus immissum: va-
let aduersus venena telorum, & animalia om-
nia, quæ virus eiaculantur, potum aut illitum:
scorpionum plagis oleo dilutum circumlinuntur:
gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum ru-
ta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos
colosq; prius circumrasos vellit: cerato aut ari-
dorum ficuum carne præmollitum, recentes liche-
nes ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, po-
lyposq; si aliquot diebus cum atramento sistorio,
aut ærugine illinatur: extuberantia cum forfice
extrahit. Veteribus faucium scabri ijs opitulatur:
grauem, subitoq; irrauescentem vocem, dilutum
aqua, sorbitione confectum expedit: risam illi-
tum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa
vtilissimè gargarizatur: vescentes latiore colore
manganizatur: tussi commodè in sorbili ovo datur,
& pleuritidis, in sorbitionibus: in fellis suffusione,
& aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores
discutit cum vino, pipere, & thure potum: nervo-
rum contractionibus, pisthotonicisq; datur obolò
pndere deaurandum: hærentes gulæ hircines,
gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus
coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso
proficit: menses ciet, cum pipere & myrrha po-
tum: celiacos adiuvat, in acino ruxæ sumptum:

cum lixivio autem potui datum, repente convulsis ruptisq; prodest: ad potiones resolvitur, nucibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multò inefficacius: cum aceto mulso mādatur, ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur: eo cum lactucis vltuntur, exitq; in vicem erucæ. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum.

CAP. LXXVII.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fulvo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanū redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, convulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra nervorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta probè admittitur: menses pellit, sed factum exanimat, cum hydromelite potum: prodest ex vino haustum, serpentium ictibus: olfactum ex aceto vulvarū strangulatus exiccat, oculorum cicatrices, offusam caliginē, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resolvitur ut laser, ruta, aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

Euphorbium. CAP. LXXVIII.
Euphorbium Libyca arbor est, ferulæ spe-

cioni

ciem habens, quæ* in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget: Græcus, cuius eximium feruorem expauescentes incole, in Tmolo, ouillos ventres elutos, arbori circumligāt, & eminus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque vase quodam, in ventriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, vulnus ei aculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterum in ventriculis concreuit, atque vitreum spectatur. Eligendus est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocollæ, & glutini mistione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium respiciat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illius suffusiones discutit, potius tota die exurit: quare melli colligrysq; pro acrimonia ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus: squamas ossium eadem die eximit: verum eo videntes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoria prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum.

CAP. LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferule, quod nonnulli metopium vocant. Ma-

B S

ximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris efi-
 figiem præbens, pingue, minimè lignofum, reti-
 nens nonnihil adiecti feminis, & ferulæ, graui
 odore, neque valde humidum, neque nimis ari-
 dum. Adulteratur fuba freſa, reſina & ammonia-
 co. Galbanum excalfacit,urit,extrahit, diſcutit:
 menſes ac partus trahit appoſitu vel ſuffitu: lene-
 tignes aceto & nitro perunctis tollit: deuoratur
 ad uſum veterem, diffcultatem ſpirandi ſuſpie-
 ria, rupta, conuulſa: aduerſatur toxicis, potum
 cum uino & myrrha, ſimili modo ſumptum mor-
 tuos parius extrahit: imponitur lateris doloribus,
 & furunculis: comitiales, & vulue ſtrangulatus,
 & vertiginofos olfactu ſuſcitai: ſi uratur, fugat
 nidore ſerpentes, & perunctos feriri non patitur:
 ſerpentes cum oleo & ſphondylo circumpoſitum,
 necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernus in-
 ditum, mitigat: urinae difficili prodeſſe exiſtima-
 tur. Reſoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua,
 aut ruta, aut calido pane, mulſaue, alias meco-
 nio, ære uſto, aut felle liquido. Si purgare Galba-
 num uoles, in feruentem aquam demittito: nam-
 que cum liquefactum fuerit, eius ſordes finitas
 bunt: quas hoc modo facile ſeparabis: mūdo linte-
 raroq; alligatu in fictili aut ærea pyxide ita pen-
 deat, ut imum vaſis ne tangat: opertoq; vaſe in
 feruidam aquam demittito: ſic enim ſyncerum,
 veluti per colum eliqueſcet, & lignoſum in linte-
 o remanebit.

Am

Ammoniacum. CAP. LXXX.

Ammoniacum, ferule succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasylum vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausina, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phryama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiaque discutit: potum, aluum soluit: parius extrahit, lienem consumit, drachmae pondere haustum: articulorum coxendicumque doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orihopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore est, si cum melle delin-gatur, aut cum persane succo sorbeatur: cruentam urinam pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiam absument: tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisque duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum mero, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. CAP. LXXXI.

Sarcocolla, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollinis thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet.

hibet : emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Glaucium.

CAP. LXXXII.

Glaucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari : tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigena, usque dum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt : cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

Glutinum.

CAP. LXXXIII.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan vocant, praestantissimum Rhodiaceum. quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est, & translucens. Nigrum verò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines lepraesque cuius delet : ambustus igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. vulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium. CAP. LXXXIII.

Ichthyocolla, gluten piscium, venter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquescit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quae cutem faciei erugant, & extendunt.

V

Viscum.

CAP. LXXXV.

Viscum optimum est recens, intus porraceum,

extra

extra fuluum, quod asperi nihil, aut fursurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, bux eo fruticis folio: contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malos pyro, & plerisque alijs arboribus: quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollet, discutit, extrahit: parotidas, tubercula, ceterasq; collectiones ad maturationem perducit: cum resina autem, & cera pari, epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera abscessusq; quos cacoethes vocant, ex thure mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositum absomit: cum sandaracha, aut auripigmento illitum, vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine.

CAP. LXXXVI.

A Parine ramis multis, & paruis fruticat, Vulgò asperis, quadrangulis, per intervalla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur, ad eximendos à lacte pilos. Seminus, caulium, ac foliorum succus, potu contra viperarum phalangiorumq; morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

Alyssum.

CAP. LXXXVII.

A Lysson exiguus frutex est, vnicaulis, subasper,

asper, rotundus folijs : fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latum. in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febre, potu discutit : idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odoretur : cum melle trita, vitia culis in facie, & lentigines emendat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. LXXXVIII.

Asclepias, ramos emittit longos : folia hederæ, longa : radices numerosas, tenues, odoratas : flos viris graue : semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vulnæ mammarumq; vlcera, quæ cacoëthe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. LXXXIX.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multo longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, aspera q; qua femina profusis viuuntur : capitula in cacumine spinis horrent. flos luteus : quibusdam in locis purpureus inuenitur : radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

Pol

Polycnemonum.

CAP. XC.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs origani: caule, ut pulegi, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. Ad urinae stillicidia rupta; cum vino bibitur.

Clinopodium.

CAP. XCI.

Clinopodium frutex est folijs serpilli similis, surculosus, duum dodrantum altitudine nascitur in petris. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad convulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eicit, aliquot diebus potum. alium sistit decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum.

CAP. XCII.

Leontopetalon, caulē emittit dodrantalem, aut alioquem, plurimis alis concavū, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, ciceris modo: flores anemone similes, purpurei coloris: folia brassica, sed papaveris diuisura: radicibus nigris, rape similibus, strumosis. nascitur in arvis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota. nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

Teu

Teucrium. CAP. XCIII.

* Chamæ-
dryos.

TEucrion, siue ut alijs placet teucris, herba est virgæ referens effigiem, *trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; vbertim prouenit. Recens cum piscia, aut aride feruefacta ius, potu lienem potenter absunit: lienosis cum aceto & ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Trissago. CAP. XCIII.

Chamædris Græcis, alijs chamædrops: Latine trissago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis: frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara. * Plin. cora, * effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè lore: quod purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in & ipsum aqua decocta, potu iussibus, indurato lient, vrine herbe pul= difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur: chre con= cit menses: partus extrahit, lienem ex aceto pota gruit. consumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradieta: purgat vetera vlcera, cum melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit: natura eius est calfacere.

Leucas. CAP. XCV.

Leucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quàm satiuæ habetur. Vtraq; ex

vino contra animalium venena, præcipuè mariorum opitulatur.

Lychnis.

CAP. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ similis, sed purpureo quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychnus sylvestris, omnia urbanae similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis poto: ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbe appositu, scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium.

CAP. XCVII.

Lilia coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam vocata. E quibus unguentum temperatur quod aliqui lirinum, alij susinum appellant, nervos & priuatim vuluæ duritias emollicens. Folia herbe illita, contra serpentium ictus auxiliantur: feruefacta, ambustus proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati ulcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat, vuluam emollit, menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum melle detrita, nervis præcis, luxatisq; medetur: vitilignes, surfures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat: teritur in aceto cum hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum

S

morsibus serpentium aduersatur: ignibus sacris
 semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt &
 * πορφυρά, * rubra esse lilia. In Syria autem & Pisidia Pam
 id est, pur= phylia, efficacissima vnguentis nascuntur.
 purea. Ballote. CAP. XCVIII.

Vulgò **B** Alloten, nomine alio nigrum marrubium vo
 Prasium **B** can: caules edit quadrangulos, nigros, sub=
 foetidum. hirsutos, complures ex vna radice: folijs maiori=
 bus quàm marrubij, hispidis, cingentibus per in=
 * πογγυλό ternalla caulem, * subrotundis, graueolentibus,
 * ποα. i. ro= apiastro proximis: vnde aliqui apiastrum eam
 iudioribus. vocauerunt: candidi flores vniuersi verticillato
 Plinius ni= ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduer=
 grioribus: sus canis morsus, folijs ex sale illitis: feruenti cine
 quod ma= re flaccescunt folia, vt condylomata reprimant:
 gis arridet. purgant & sordida vlcera cum melle.

Apiastrum.

CAP. XCIX.

Melissa of=
 ficinus.

M Elisso phyllon siue melittæna, id est, apia=
 strum, id sibi nomen usurpauit, quoniam
 apes ipsa herba delectantur, cauliculi & folia
 ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia es=
 sent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spe=
 ctarentur: citreum malum olent. Folia cum vino
 pota aut illita prosunt contra ictus phalangiorum,
 scorpionumq;: item aduersus canis morsum. Deco=
 cto eorundem gratia, foveri prodest: defensionibus
 foeminarum ad ciundos menses conuenit, dentes
 eodem in dolore colluuntur, dysentericis infundi=
 tur. Fungorum strangulationibus folia, addito me=
 tro,

tro, potu auxiliantur: torminibus & orthopnoicis,
delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt, vlce=
ra purgant, articularios dolores illita sedant.

Marrubium. CAP. C.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus,
candicans, subhirsutus, quadrangularibus
ramis: folium pollicem aequat, subrotundum, hispi=
dum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus,
& ex internodiis: flores verticillato ambitu, aspe=
ri. Nascitur propter edificia, ruinas, & rudera.
Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua,
aut viridium succus datur cum melle suspensio,
tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Cras=
sam e pectore pituitam, cum sicca tri ejcit. Mu=
lieribus a partu non purgatus datur, ut men=
strua & secundas extrahat: item in difficili par=
tu, & his qui venena hauserunt, aut a serpentis=
bus demorsi sunt: vesicam renesq; ladi. Folia
cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgan=
dis: pterygia nomasq; sistunt, laterum dolores mi=
tigant. Succus folijs contusis expressus, & sole
coactus, ad eadem pollet: cum vino & melle illi=
tus, oculorū claritatem adiuvat: naribus regium
morbum expurgat: aurium doloribus convenien=
ter instillatur, per se aut cum rosaceo.

Stachys. CAP. CI.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed lon=
gior: folia ferēs numerosi, hirsuta, rara, prae=
dura, cana, odoris incundi, & complures virgas

ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet exalta-
toriam & acrem: foliorum decoctum potu pellit
menstrua & secundas.

Phyllitis.

CAP. CII.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longio-
ra, & viridiora, sena aut septena, recta, quæ
parte anteriore laevia cernuntur, à tergo autem pen-
siles quasi vermiculos tenues ostendunt: in umbro-
sis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo:
neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert. Folia
in vino pota serpentium morsibus aduersantur:
quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: et si dy-
senteria aut resoluta alius exercet, potui datur.

Phalangium.

CAP. CIII.

Phalangium à quibusdam phalangites voca-
tur. * ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve, in
ἰσχυρὸν καὶ ἰσχυρὸν diversa tendentes: flos candidus, lilio similis, mul-
τὰ καὶ ἀνὰ πλάτος incisuras habens: semine nigro, * lato, ad len-
τιὰ καὶ ἰσχυρὸν. tunc dimidiata figuram, multo tenuiore: radice
* Ita Pli = parua, tenui, herbacei coloris, dum à terra erui-
unt. Græci tur: provenit in collibus. Huius folia, semen, flos
cum πικρὸν, cum vino pota, auxiliantur contra scorpionum pha-
lid est, cras- langiorumq; iclus: tormina quoq; discutunt.
fo.

Trifolium.

CAP. CIIII.

Trifolium, Græci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyanthes, alij asphaltion, vocat.
Frustex supra cubiti altitudinem attollitur, vire-
gas habens tenues, siniceas & nigras, unde ramu-
larios

lares enascuntur appendicula, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arbori similia: ijs recenter enatis ruta odor inest: ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem adit purpureum, semen quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennae modo corniculum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinae difficultati, comitialibus, & ijs qui aquae inter cutem principia sentiunt, facinus quoque vulvae vitio opportunis, auxiliantur: menses ciunt: terna drachmae e semine dari debent, e folijs vero quaterne. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, praesidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum frui dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut a serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis, quaterna, ut quae febrim circuitus disculerent. Radix antidoti inseritur.

Polium.

CAP. CV.

Dvo genera polij: montanum, cui tenthrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem praeseferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauter olente, non sine quadam suauitate. Alie-

rum fruticosius, non vsque adeò valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicus, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachum malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratum suffitumve serpentes abigit: illud vulnèra conglutinat.

A N N O T A T I O.

Scordii hoc loco depicti vberrimus ubique est prouentus, vt non iniuria eorum sit explosus error, qui allium syluestre, aut obuiam quancunque herbam allium subolentem, hoc esse opinabantur. Est autem præter id, Plinio libro 25. cap. 6. authore, aliud quoddam genus latioribus folijs ac mentastri effigie, cuius nuper in monte quodam ad Viennam ingens se copia nobis obtulit: nec alia sanè nota, quàm foliorum cum mentastro similitudine, à scordio huic authori descripto, differre obseruauimus.

Scordium.

CAP. CVI.

Scordium, in montibus & palustribus nascitur, folijs trisaginis, maioribus, non sic in amplitudine diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus: quadrangulis caulibus: sub rubro flore. Herba vim excelsatoriam habet: urinam cit. Cocta recens aridave cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & vrine diffie

difficultatē, binis drachmis cū hydromelite: cras-
samen purulentū pectore expellit. Facit arida fa-
rina ad veterem tussim, rupta, cōuulsa, si cum na-
sturtio melle & resina misceatur in eclegmate:
inflāmata modicē praeordia, cerato excepta, re-
creat: cū aceto acri aut aqua, podagris conuenien-
ter illinitur: mēses imposita mouet: vulnera cōglu-
tinat: vetera vlcera purgat, & ex melle ad cica-
tricem perducit. Sicca excrescentias in carne co-
hibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima
efficax Ponticum natione, Creticumq;.

Tussilago. CAP. CVII.

Tussilaginis, folia sunt maiuscula quā hede Vulgo ma-
ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter gula cabala-
ra, superne virentia, in plures angulos exeuntia: lina.
caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo
vni cum caule confestim exiit: inde nonnulli
his vacare existimauerunt. Radix tenuis est &
superuacua: nascitur in amoenis & riguis. Folia
ex melle trita igni sacro & omnibus inflamma-
tionibus illita medentur. Arida fumus per infun-
dibulum hianti ore rap:us, hos sanat qui sicca
tussi atq; orthopnoea infestantur: pectoris vomit-
us rumpit. Eundem effectum praebet suffita ra-
dix. Decocta in hydromelite, & pota emortuos
partus eicit.

Artemisia. CAP. CVIII.

Artemisia magna ex parte in maritimis na-
scitur, absinthij modo fruticosa, maioribus

& pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem genera duo. Vnum lætius habitiusq; folijs virgisq; latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis vinculis nomine appellāt, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scazente tenuibus, flauo colore: hæc incidiorem quàm præcedens efflat odorem. Vtraque excalfacit, extenuat: feruef. & conuenienter in muliebres defessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem inflammationes: calculos cōmuniunt: remorata m urinam cient: menses pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrha, eadem quæ in seffo trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Ambrosia.

CAP. CIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, altitudine trium palmorum: folijs rutæ, circumnum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illius adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys.

CAP. CX.

Botrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multis alus sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folijs cichorio similia: tota suauem odorem

odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnoeas mulcet. Hæc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. CAP. CXI.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflammationes discutit. Geranium alterum, caulibus multis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluæ, in binis vultu summis alis sursum spectantia gruum capitula gero. insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullus in medicina vsus.

Gnaphalium. CAP. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus ac albis pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero, ad dysenteriam.

Typha. CAP. CXIII.

Typha folium ædit * cyperidi simile: caule * Intelligilem album, leuem, equabilem: florem in ca quam lib. cunnine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod paniculâ aliqui nominant. Huius herbe vocant. flos, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

Circæa. CAP. CXIIII.

Circæa, quam & dirceam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine mili, nascente in quibusdâ veluti corniculis: dodrâ tali radice, tris

plici ferme aut quadruplici, candida, odorata, ex-
calfaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vento
perflatis. Radicis tuse pondo quatuor, in sextarijs
tribus vini dulcis, per diem & noctem maceran-
tur, potuq; triduo vulvas expurgat. Semen in sor-
bitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

Oenanthe. CAP. CXV.

Videtur no-
stra Filipen-
dula.

Oenanthe folia habet pastinacæ: florem can-
didum: caulem crassum, palmi altitudine: se-
men atriplicis: radicem magnam, in multa rotun-
da capitula extuberantem: nascitur in petris. Cau-
lis eius & folia, cum mulso vino pota secundas eij-
ciunt. Radix è vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. CAP. CXVI.

Vulgò pu-
licaria.

Conyzæ duo genera: quæ parua vocatur,
odore præstantior est: maior verò frutice al-
tior & folijs latioribus, graui odore. Viriusq; fo-
lia oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore cau-
lis binum cubitorum altitudine attollitur, in minore
pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subama-
rus qui in pappum abit: radices superuacua. Suf-
fitu substratuq; frutex totus serpentes fugat, cu-
lices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter
illinuntur serpentum plagis, & tuberculis, ac vul-
neribus. Flores & folia cum vino ad menses par-
tusq; eijciendos bibuntur: item contra vrinæ stilli-
cidia, arquatium morbum, & tormina: comitiales
pota ex aceto adiuvant. Decoctum in defæssioni-
bus medetur vulnæ malis. Impositus succus abor-

1408

tum facit. Ex oleo efficaciter horroribus * obli- * ἢ πόν. nitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore: folijs mediæ inter maiorem ac minorem amplitudinis, minime autem pinguibus: multò grauior hęc est odoris & inuicidioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium syluestre.

CAP. CXVII.

Hemerocallis folium & caulem habet lilij, porraceo colore: flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquàm pallido: radix magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle & lana in pessa apposita, aquam educit & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambustu utilissimè illinuntur.

ANNOTATIO.

Leucoion, si nominis etymon spectes, albam significat violam: solet tamen & pro lutea, cœrulea ac purpurea usurpari. Nunc officinis, Arabum ferè sequacibus, Cheiri nuncupatur.

Leucoium, siue viola alba.

CAP. XVIII.

Leucoion vulgare est notitiæ, sed in floribus differentia quedam: namq; aut cœrulei, aut albi,

albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruesfacti in defensionibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen diuim drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratæogonum. CAP. CXIX.

Videtur genus Persiæ. **C**ratæogonum, siue ut alijs placet cratæonon, folijs melampyro simile est, multis calamus cariae, non ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorum: semine milij: nascitur magna ex parte in opacis & frutetosiss, summo opere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauariat, virilis sexus partum futurum.

Phyllum. CAP. CXX.

Phyllum, quod & elæophyron vocatur, diuim generum est. quod autem thelygonum appellant, in saxosis musci modo gignitur, folio oleæ, sed magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili: florem albi profert: semen papaueris masculini. Sed arrhenogonum cætera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleæ non dissimile. Arrhenogonon potum, masculi

sculi sexus facere partus, ut thelygonon feminei, proditur. Horum Crateus author est: sed huiusmodi historiâ tenus, mihi produxisse visum est.

Testiculus. CAP. CXXI.

Testiculus, quem Græci cymforchin vocât, Officinis folijs circa imam caulis partem in terra falsò satystratus, oleæ molli similibus, longioribus, angustioribus, leuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi: ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem feminae, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis. Testiculus alio nomine serapius, Andrea authore vocatur, quoniam radix ad multa utilis sit. folijs est porri, lutiorebus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculus simili: quæ illita tumores discutit, vlcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: faciuntq; putredines, & oris vlcera cacoethæ: alium fistunt è vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur.

Sac

Satyrium. CAP. CXXII.

Satyrium aliqui trofolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infra cta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbisam, mali magnitudine, suluam, intus ut ouum, candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam: quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendum eadem concumbendi incessit cupiditas, siquidem ea proniores ad venerem fieri affirmant. Est & alterum satyrium erythronium siue erythraicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente: quod fertur, non secus atq; scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori: in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produci, si omnino manu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in vino.

Horminum. CAP. CXXIII.

Vulgò Gal
litricum.

Horminum herba est, folijs marrubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersim seimen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est vsus. Ad venerem stimulandam, cum vino bibi volunt. Purgat cum melle argemas albuginesq; & illitum ex aqua tumores discutit. Eo etiam extrah

trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illi & herbe. Sylvestre magis viribus pollet: quare unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

Securidaca. CAP. CXXIIII.

HEdysaron, quod unguentarij pelecinum, id est securidacam vocant, frutex est, folijs ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, unde nomen accepit: amarum gustu. Stomacho vile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in segetibus & hordens.

Onosma. CAP. CXXV.

Onosma, * oblonga folia habet: ad similitudinem **οι ἡ ὀσμά*
nem anchusæ, longitudine quatuor digito- *δα. οἱ δὲ*
rum, & vnius latitudine, mollia, in terra iacen- *φλονίτιμ.*
tia, sine caule, sine semine, sine flore: radice niti- *οἱ ἡ ὄνονιμ*
tur longa, tenui, infirma, rubescente: gignitur in *καλῶσι.*
asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Præ-
gnans si eam supergrediatur, abortum facere
dicitur.

Nymphaea. CAP. CXXVI.

Nymphaea nascitur in paludibus & sta- *Nunc Ne-*
gnantibus aquis folijs fabæ Aegyptiæ, mino *nuphar.*
ribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs
demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus:
flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente:
cum defloruerit, vt rotundum malum, aut pa-
pueris caput, extuberat: nigro semine, denso &
luto,

lato, lenti gustus: caulis est laevis, niger, minime crassus, Aegyptiae fabae cognatus: radix nigra, scabra, clauae similis, quae autumno secatur. Sicca cum vino pota coeliacis, dysentericisq; auxiliatur & lienem absorbet. Radix stomachi ac vesicae doloribus illinitur, vitiliginis ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidem ea prorsus adimit, pota assidue aliquot diebus, genitaleq; infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphae nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Boeotiae Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs ante dictae, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosae simili. Huius semen & radix, contra feminarum profluvia efficaciter ex vino bibuntur. Nasctur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII

Androsaces herba est amara, tenues spargēs iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur: gignitur in Syriae maritimus. Ea drachmis duabus in vino posita, copiosam hydropicis urinam ciēt. Idem effectus est semini potio, & herbae decocto: podagris vtiliter illinitur.

Asplenum. CAP. CXXVIII.

Ceterac
officinis.

Asplenum, aliqui scolopendriō vocant, alij splenion, alij Hemionium, folijs est multis, scol

scolopēdræ animalī similibus, ab radice vna pro-
deuntibus. Nascitur in parietibus, saxiſq; ſiliceis,
& opacis: nec caulem, nec florem, nec ſemen ha-
*bet. folia * ſiliculæ modo diuiditur, ſubter flauē * Polipody-*
ſcentia hirsutaq; ſuperne viridia. Vim hanc ha-
bent folia in aceto ferueſacta, vt per dies quadra-
ginta pota, lienem abſumant: quibus etiam con-
tritū lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ, &
regio morbo prodeſt, ſingultum ſedat, calculos in
veſica comminuit. Conceptum adimere creditur,
per ſeſe aut cum muli liene appenſa. Tradunt no-
ctu, ſilente luna, huius rei gratia effodiendam.

ANNOTATIO.

Ruellio & Fuchſio lingua ceruina nunc
 appellata: quam alij, minus rectè fortaiſis,
 Phyllitida ſuſpiciantur, de qua ſuprà Ca-
 pite CII.

Hemionitis.

CAP. CXXIX.

Hemionitis, quam aliqui ſplenion vocant, fo-
 lium emittit dracunculi, lunæ modo incur-
 uum: radicibus cohæret multis, tenuibus: nūquam
 flores, neque ſemen, neque caulem gignit: in pe-
 troſis naſcēs, aūſtero ſapore. Ea ex aceto pota lie-
 nem abſumit.

Antyllis.

CAP. CXXX.

Antyllis duplex eſt: quædam enim lenti ſi-
 millima, folijs mollibus, rectis ramulis, pal-
 mi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in
 ſaliſis terris, & à ſole illuſtratus, non in ſulſo gu-

stu. Altera est folijs ramulusq; * aiugæ similis, hir-
 * Chamæ= sutioribus tamen, breuioribus, & asperioribus:
 pityi. flore purpureo, odoris admodum grauis: radice ci-
 chorij. Pota drachmis quatuor vrinæ difficultati,
 renibusq; plurimum prodest. Tritæ, vulnæ pitui-
 tas emolliunt, cum rosaceo, & lacte impositæ, vul-
 neribus medentur. Quæ autem aiugæ similitudi-
 nem refert, præter alia, pota cum aceto mulso co-
 mitiales sanat.

Anthemis.

CAP. CXXXI.

Officinis **A** Anthemidis genera tria, tantum flore di-
 camomilla. **A**stantia: rami dodrantes, fruticosi, alis
 Cuius no= multis concavi: tenuibus foliolis, paruis, numero=
 minum va sis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis,
 rietas ab in forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis,
 terprete o= aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ: nasci=
 missa est. tur in asperis, & iuxta semitas: colligitur vere.
 Vim habent radices, flores & herba excalfacien=
 di, extenuandi q; potu, & in sessione, pellunt men=
 strua, partus, vrinam, calculosq; : aduersus infla=
 tiones, & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam
 expurgant: iocinerum vitia sanāt: decocto earum
 vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad
 calculos efficacissima est, quæ florem purpureum
 habet, cuius amplitudo maiuscula est: hanc pro=
 priè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo
 nomen est, item quæ chrysanthemon dicitur, vehe=
 mentius vrinam ciunt. Aegilopijs illitæ meden=
 tur: commanlucatæ ulcerum eruptiones in ore,
 san

sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debēt, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoq; siccari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars vna, modo cōtra floris partes duæ & herbæ vna, permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino mulso, diluto.

Parthenium.

CAP. CXXXII.

Parthenium, aliqui amaracon vocant, folijs Vulgò mas-
est coriandri, tenuibus: flore per ambitum al-
bo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro.
Siccatur, cum aceto mulso aut sale potum, nō se-
cus atque epithymum, & bilem & pituitam de-
trahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Her-
ba sine flore à calculosis, et anhelatoribus magna
utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum
in duritia vulvarum, & inflammationibus. Illis
nitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

ANNOTATIO.

Non sunt sequendi, qui Cotulam foeti-
dam vulgò dictam pro hoc obtrudūt. Nam
præter quàm quòd folia illius nullā aut sal-
tem parua cum fœniculo habeant simili-
tudinem, flos eius non totus luteus (quod in
illo tamen requiritur) sed per ambitum al-
bus, ac intus tantum luteus cōspicitur: quod
haud dubiè Dioscorides, si Cotula illa ve-

T 2

rum esset Bupthalmum; minime, ut nec in Parthenio, Narcisso & Anthemidos prima specie, silentio prætermisisset.

Bupthalmum. CAP. CXXXIII.

Bupthalmum (quidam cachlam vocant) ternues emittit cauliculos, mollesq;: folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores duritiasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneo, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. CAP. CXXXIIII.

Pæonia siue glycyfide, Græcis aliquibus pentaboron dicitur: sunt qui idæos dactylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia inglandis habet: in fœmina verò, smyrnæ more diuiduntur. Summo caule siliquis emittit, veluti * græcas nucas: in quibus, quum dehiscunt, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex, purpurea. Radix maris [tenuis] digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba: fœminæ radicibus ceuglandes circiter septem aut octo inheret, ut in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet menses nucis græcæ magnitudine pota: sic ventris doloribus cum vino

aux

auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum, ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero & nigro: stomachicus & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Lithospermum.

CAP. CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit: folijs est oleæ longioribus, & latioribus, limbo solis. mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulus rectus, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis et æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum vino albo potu calculos frangat, pellatq; urinam.

Phalaris.

CAP. CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit & culmus similis, à minutis ac nullius usus radicibus, multos, dum palmorum, geniculus cinctos, graciliores tamen ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem ef-

ficax est.

Rubia.

CAP. CXXXVII.

Hodie Ru- **E**rythrodanum * radix rubra est, qua tingū-
bia tincto- tur lane. Vna sponte prouenit, altera seri-
rum. tur, * vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italia:
* ἡ ῥοῦθός in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur.
δαυον. ἡ Hanc non sine quæstu ferunt: nanque maximum
ῥοῖς ἡ τού ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & qua-
θειρωνα dranguli, longi, aparina non dissimiles, robustio-
λῶσι. res, & multo prorsus maiores: folijs per interual-
* ὡς ἐν θα la certa circum articulos, stellatim decussatis. Se-
βάνη δ γὰ men eius rotundum, inter initia viride, mox ru-
γυλαίας. brum, postea cum ematurrit, nigrū: radix tenuis,
longa, rubra. Vrinā ciet: qua de causa regio mor-
bo opitulatur, pota cum aqua mulsā: item ischiadī-
cis, & resolutis. Crassam copiosamq; vrinam pel-
lit, nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen
quotidie lauare oportet, & excrementorum quæ
redduntur differentiam spectare. Aduersus serpen-
tium morsus, ramulos cum folijs vino bibere pro-
dest. Semen ex aceto potum, lienem absūmit. Im-
posita radix trahit partus, menses, secundasq; Al-
bæ vitiliginī, illita ex aceto medetur.

Lonchitis.

CAP. CXXXVIII.

Lonchitis folia habet porri, latiora, rubentia,
plurima, ad radicem circumfracta, veluti in
terram procumbentia, pauca in caule, in quo flo-
res, ceu galericuli, hiantibus comicis personis si-
miles, nigri, & è recta albam exerentes velut lin-
guam,

guam, quæ ad labrum inferius spectet: semen in-
volucris clausum lanceæ simile, triangulum: unde
sibi cognomen um arrogavit: radix dauci. Na-
scitur in sitientibus, & asperis. Radix ex vino
pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam ali-
qui asperam lonchitidicunt: folia scolopendrii
emittit, sed asperiora maioraq; ac multo magis
diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest,
in eisq; inflammationes excitari non patitur. Po-
ta ex aceto lienem absomit.

Althæa.

CAP. CXXXIX.

Althæa, quam alij ibiscum vocant, in sylue = Vulgò Bif-
strium maluarum genere est, cui folia ut malua, &
cyclamino, rotunda, lanugine canescunt: flore ro- Malua =
saceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. scus.
* Althæa appellatur, quòd inter primas sit uti = * Ab ἀλ-
lis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim δαίτω quod
in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur mederi sic
tusa, efficax est contra vulnera: item ad strumas, gūficat.
parotidas, abscessus, mammarum inflammatio-
nes, fracta sedis, inflationes, nervorum rigores: si-
quidem disculit, & excoquit, rumpit, & ad cica-
tricem perducit. Cocta, ut dictum est, adiecto suillo
adipe, aut anserino, terebinthinæve, ut malagma
tis lentor fiat, facit ad vuluæ inflāmationes, pra-
clusionesque, in pēssis subdita. Decoctum eodem
fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasq; à par-
tu extrahit. decoctæ * succus ex vino potus, suc = * & πῖς.
currit urinae difficultati, calculosorum cruditati =

T 4

bus, dysentericis, ischidiacis, tremulis, ruptis: dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, vitilignes
 *πῶ δ'ξεί. in sale *perunctas emendat: eodem cum oleo & aceto peruncti, à venenatis non feruntur. Valer contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profusum. In posca aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momēto, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam, tria radice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

Herba Si- **A**lcea sylvestrium malvarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxima: caules treis aut quatuor, cortice cannabino vestitos: florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Cannabis.

CAP. CXLI.

Cannabis sativa plāta magni in vita vsus ad robustissimos funes facitandos: folijs fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conuenienter au-
 Fortè euriū doloribus instillatur. Sylvestris cannabis paterium virgas fert alihææ similes, minores, nigriores, & vulgatum. asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore & asperiore: flore lychnidis, subrubro:

bro: semine & radice alihææ. Decocta radix, illi-
tu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos
articulorum dissipat. Huius cortex torquendis su-
nibus accommodatus.

Anagyris.

CAP. CXLII.

A Nagyris * frutex est arboris instar, per- * οἱ ἰανῶ-
quim grauis odore: folijs * agni, virgisq; flo- γυρον. οἱ
re brassicæ: semen in siliquis non breuibus gignit, ἰ ἀνερον
subrotundum, firmum, versicolori facie, simile re- καλῶσι.
nibus, quod durescit vna maturescente. Tenera fo * viticis.
lia trita tumores illitu reprimunt. si partus hæ-
reat, & secundæ mensesq; morentur, drachmæ
pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dan-
tur, & contra capitis dolores in vino. Difficulter
parientibus adalligantur, ita ut à partu statim
auferantur. Radicis cortex concoquendis discu-
tiendusq; adhibetur. Semen commanducatum vo-
mitiones vehementer ciet.

Cepæa.

CAP. CXLIII.

C Epæa portulacæ similis est, sed nigriora hæ-
bet folia, & radicem tenuem. Folia in vino
pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laboran-
tibus, opitulantur: maximè id præstat, si cum de-
cocto radicum asparagi eius, quem myacanthon, Vulgò plā-
hoc est, corrudam vocant, bibatur. tago aqua-

Alisma.

CAP. CXLIIII.

A lisma, * alij damasonion appellant: folia ei * Vox ex
plantaginis, nisi angustiora essent, * laci= Plinio adie-
mosa, conuexaq; in terram: caule simplici, tenui, Eta.

cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescente: radicibus tenuibus, ut veratri nigri, acris, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis.

CAP. CXLV.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem paruam: nascitur in viginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hypericum.

CAP. CXLVI.

Nostra
Perforata.

Hypericum alij androsæmon, alij corion, alij chamæpityn appellant, quoniam semen odore resinam imitatur: surculaceo frutice, dodrantali, subrubro, folio rutæ: flore luteo, qui digitis tritus sanguineum succum remittit, qua ex causa androsæmon cognominatur: subhirsuta siliqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris: gignitur locus cultis & asperis. Urinam ciet, menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino po-

tunt

tum liberat. Semē quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron.

CAP. CXLVII.

AScyrum, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq; : folia tenuia : flores luteos, & fructum resinofum, hyperico non absimilem : cuius attritu digiti ferē cruentantur, qua de causa androsæmum vocauerunt. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydroemelitæ sextario : nam biliosa recrementa amplissimè detrahit : sed assiduè dare oportet, donec sanitati restituatur. Illinitur & ambustis efficaciter.

A N N O T A T I O.

*Vinoso succo.] Marcellus sanguineo vertit, qui non vt Ruellius *διωδν*, sed potius *αματωδν*, vti capite de hyperico, legisse videtur : quæ fortè lectio magis genuina. Nam & Plinius lib. 27. cap. 4. Androsæmi comam tritam sanguineo succo manare, tradidit.

Androsæmum.

CAP. CXLVIII.

Androsæmon ab hyperico, ascyroq; differt, quòd fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus : rubentibus virgis : & folijs rutæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita* vinoso succo manant : complureis alas habet in cacumine, utrinque expansas, pinnatasq; : circa quas, flores pusilli,

silli, lutei : & in calyculis semen papaveris nigri, insigne lineis. Huius comæ trita resinosa odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit : ischiadicis maximè medetur : sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, vulneribus sanguinem cohibet.

Coris.

CAP. CXLIX.

COris, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potius semen menses trahit, & vrinas : contra phalangiorum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est : horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre creditur : sed laborantem inter potandum quamoptimè cooperiri licet : siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys. CAP. CL.

Vulgo Iua
arthritica.

AIuga herba in terra repens : * incurva si-
milis : folijs semperuiui minoris, multo te-
* *ἰκνυρ* nioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ra-
* *τ* *Θ*. i. sub- mos * densis, odore pinus : flore tenui, luteo, vel can-
curua. dido : radice cichorij. Folia septem diebus in vino
* *πυνυα*, pota, regio morbo medentur : & quadraginta die-
id est, fre- bus ex hydromelite, ischiadicos sanant : dantur
quentibus. peculiariter vrinæ difficultatibus, iocineris, &
renum vitij : torminosi profunt. Ea apud Hera-
cle

cleam Ponticam, perinde atque antidoto contra
aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad ante-
dicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta:
trita in farinam & cum fico in pilulis sumpta,
aluum emollit: excepta melle, cum æris squama
& resina deijcit: apposita ex melle, vulnæ vitia
extrahit: mammarum duritias discutit: vulnera
glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita, co-
hibet. Alterum est genus aingæ, cubitalibus ra-
mus, in anchoræ speciem incuruatis, prætenui-
bus, coma supradictæ: flore candido: semine ni-
gro: hæc etiam pinum rodolet. Tertia mas no-
minatur, paruula, folijs exilibus, albis,
pilosis: caule aspero, candido: luteis
flosculis, semine iuxta alas. Re-
sipit & hæc pinum. Hæ-
cudæ vim superioris
obtinēt, sed
non vs-
que adeo efficacem.

TERTII LIBRI
FINIS.

P E D A N I I
DIOSCORIDIS
 A N A Z A R B E I, D E
Medicinali materia,
Liber IIII.

Ioanne R V E L L I O Sueſſionenſi
 interprete.



Ribus antè libris, amantissime
 Aree, tradidimus odoramenta,
 olea, arbores, unguenta, anima-
 lia, frumenta, olera, radices, suc-
 cos, herbas, seminaq;. In hoc au-
 tem quarto differemus de radicibus, & eis quæ
 restant herbis.

Betonica.

C A P. I.

C ESTron psychotrophon vocitatur, quoniam
 frigidus locus inueniatur. Latini betonicam
 appellant. Herba est, caulem ferens tenuem, cu-
 biti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia
 quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odora-
 ta, prope radicem maiora: in summis caulibus,
 semen veluti satureiæ spicatum inest. Decerpta
 huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radi-
 cibus nititur, vt veratri, tenuibus. Quæ ex hy-
 dromelite in potu, pituitosam vomitionem euo-
 cant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieri-
 bus

bus vuluæ malo opportunus, & ad laxandos vteri
 strangulatus, denarij pondere cum hydromel-
 lite: tres in vini sextario drachmæ, contra ser-
 pentium morsus ebibuntur. Herba magna utilita-
 te illatis à serpente vulneribus illinitur: aduersus
 etiã venena drachma ex vino pota cõuenit: præ-
 sumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit:
 vrinam ciet: aluum subducit: medetur comitiali-
 bus & insanis, pota ex aqua: & iocineris lienisq;
 vitis, drachmæ pondere in aceto mulso, conco-
 ctionem adiuuat, si quis eam fabæ magnitudine
 secundum cœnam cum melle cocto deuorarit: mo-
 do consimili acida ructantibus propinatur. Sto-
 machicis eam manducare & succũ deuorare pro-
 derit, si postea dilutum vinum sorbeatur. Datur
 sanguinem excreantibus, tribus obolis, cum dilu-
 ti vini egelidi cyatho: ischiadicis, renum & vesti-
 cæ doloribus, ex aqua: aquæ intercutem binis
 drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin ali-
 ter, ex mulso: regio morbo laborantes recreat,
 menses pellit, drachmæ pondere cum vino pota:
 aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydro-
 melitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem
 & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq;
 fictili vase reconduntur.

Britanica.

CAP. II.

Britanica aut retonica, folia habet sylue-
 stris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gu-
 stu adstringentia: radicem tenuem & breuem:

can

caulem paruum emittit. Folij exprimitur succus qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

LYsimachia, quam aliqui lytron appellant, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo: gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem suppressit, dysentericis potui datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit, in pessa: sanguinis profluvio subuenit, si nares ea herba obturentur: vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria, ceu polygonum.

CAP. II II.

Nūc Centi-
nodia.

Polygonum mas ramos habet teneros & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramen, repunt: folia rutæ, sed molliora longioraq;: semine sub omnibus folijs turgescente: unde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruentæ excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam aperit. Cum vino potus, contra serpentium morsus

sus auxiliatur, daturq; in febris per horam ante significationes: sceminarum profluvia impositus sistit: idem succus purulentis auribus* instilla= * *ἢ πρὸς* tur. Facit eximiè ad genitalium vlcera, cum vi= *ὡταλγίας*. no, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria femina fruticat vno caule, arundini tenero, simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis piceæ similes. Radicis nullus vsus: nascitur in riguis. Huic quoque spissandi refrigerandiq; natura, ad eadem valens, sed inefficacior.

Polygonatum.

CAP. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice Vulgò si cubito altiore: folijs lauri, latioribus, & lægillum Saluoribus, sapore mali cotonei, aut punici, cū quadam adstrictione: flores per singulos foliorū exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem: quæ vulneribus efficaciter illinitur. Quinetiam maculas in facie delet.

Clematis.

CAP. VI.

Est quæ La

Clematis humi serpit. læto, pinguiq; solo pro= tini Vincâ uenit, viticulas spargens crassitudine iunci peruinca= exiguas: folio lauri figura & colore, multo mino= vocant.

Flammula
Vulgò.

ra. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia
& dysenterias sedant: subdita in pecto cum lacte
& rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vuluæ meden-
tur. Dolores dentium commanducata finiunt: imposi-
ta serpentium morsibus, iuuamentum præstat.
Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto po-
ta opitulari. Gignitur in terrenis. Est & altera
clematis, quæ viticulosum emittit ramulum, rube-
scentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac
exulcerans: repit per arbores, ut smilax. Semen
tritum, pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hy-
dromelite potum. Folia eius illita lepras purgant.
Cum lepidio conditur ad cibos.

Polemonia.

CAP. VII.

Polemoniam alij phileteriam, Cappadoces
chiliodynamin appellant, ramis exilibus,
utrinque pinnatis: folijs paulò quàm ruta maiori-
bus, ac longioribus, calaminthæ aut *sanguina-
riæ proximis, quibus in summis velut corymbi de-
pendent, nigro semine: radice cubitali, albican-
te, *radiculæ simili: nascitur in montosis & aspe-
ris. Bibitur in vino radix contra serpentes & dy-
senteriam, & ex aqua aduersus vrinæ difficulta-
tem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto
drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis pla-
gæ alligatur. Tradunt, eum, qui radicem gusta-
uerit, a scorpione non feriri: eumque, si ictus sit,
nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa
mitigat.

AN

ANNOTATIO.

*Flores lutei.] Ne moueâre sicubi fortè,
vt nos plerisque locis, candidis floribus con-
spexeris: solent enim pro loci varietate in
vna eademque herba flores non raro com-
mutari: id quod Dioscorides etiam in Atra-
ctylide, ac multis aliis plantis fatetur.

Symphytum, siue alus.

CAP. VIII.

Symphyton petram, id est alus, nascitur in pe-
stris, ramis tenuibus, paruis, origano simili-
bus: capitulis thymi: * surculis sum totum, odo = * Ita Plin.
ratur, gustus dulce, saluam ciens: longa radi = Græcus
ce, subrusa, digitali crassitudine. Decoctum in ξυαδης,
aqua mulsa & potum pulmonis vitia purgat: san id est, ligno
guinem reijciemibus, & renum malis, ex aqua sum.
datur: ad dysenteriam, rubraq; sceminarum pro-
fluua, in vino decoctum: ad conuulsa verò & ru-
pta, ex aceto mulso bibitur. Quin & commandu-
catum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vul-
nera recentia enterocelisq; conglutinat, & illitu
cohibet. Carnes autē cum symphyto decoctæ coa-
lescent. Est & alterum symphyton, quod ali = Nunc Con-
qui pecton vocat: id caulem emittit bicubitalem, solida ma-
aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt son = tor.
chi inanem, circa quem breui interuacante spa-
tio, folia exeunt angustā, buglossa proxima, ob-
longa, hirsuta: caule secundum angulos quosdam
striato: folijs tenuibus ex alarum sinu prodeuntis

bus, in quibus* flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritū concitant: radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, viscosae: quarū est vsus. Trita & pota cruentis excreationibus, ruptuq; proficiūt: recentia vulnera illita conglutināt: carnes quoq; si concoquantur, cogunt addita: inflammationibus, praesertim sedis, cum senecionis folijs, utiliter illinuntur.

Holostium.

CAP. IX.

Holostion herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terrā, folijs viticulusq; coronopo aut gramine proximus, gustu adstringentibus: radice alba, praetenui vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum: nascitur in collibus terrenis. Vsus eius adrupta, in vino pota: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Stoebe.

CAP. X.

Stoebe vulgaris est notitia: cuius semen & folia stringunt: quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab icū cruentis prosunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Clymenum.

CAP. XI.

Clymenum caulem fert fabae, quadratum: folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in iride, & polyporū cirrhus. Probatissimum est è montibus. E frutice toto cum radice

dice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: coliacos, rubraque; seminarum profluvia, refrigerando infrænat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliqua recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricem perducunt.

Periclymenum.

CAP. XII.

Periclymenon, simplex fruticat, ex interval- Vulgò **Ca-**
lus parua folia habens, ipsum amplectentia, prifoliū, &
subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, Matrisyl-
in quibus bacca, hederæ similes: flos fabæ, candi-
ua.
dus, aliquantum rotundus, & quasi in folium pro-
cumbens: semen durum, & quod difficile euella-
tur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac
sepibus, cōuoluens se adminiculis, propter assiden-
tibus. Semē eius postquam ematuruit collectum,
& in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur
in vino, quadragenis diebus, lienem absomit, las-
situdinem discutit: sed vrinam ciet, statim à sexto
die cruentam. Orthopnoæ, & singultui prodest:
partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus præ-
dita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilita-
tem facere produntur: perunctis ex oleo, febrium
algores abigunt.

Tribulus.

CAP. XIII.

Tribuli genus vnum terrestre, folijs ad effi-
giem portulacæ, tenuioribus, viticulis in ter-
ra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris:
iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum

genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori. adsunt ei & capillamenta quadam spica: cea: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est naturæ: ideò inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingivas, tonsillasq; persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitære, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Limonium.

CAP. XIII.

Limonium, folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, lilio aequalem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis cæliacisq; prodest: rubra foeminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

Lagopus.

CAP. XV.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota: aut in febre, ex aqua. Eadem inguini alligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Med

Medium. CAP. XVI.

MEdion in saxis & opacis nascitur: folia habet* iridis: caulem tricubitalem, & in eo* Alij scribunt florem grandem, purpureum, rotundum: semine disci. cruci, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses facinarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum, menstrua pellit.

Epimedium. CAP. XVII.

EPimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denus atque duodenus, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increescere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Gladiolus. CAP. XVIII.

XYphion, alij phasganon, alij machæronion, Romani gladiolum, vocant: nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna pusillorum bulborum modo, super alteram insidente, quarum inferior gracilis est, su-

perna vberior: nascitur in aruis. Superior cū illu-
re illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpo-
re extrahit: panos cū lolij farina & hydromelite
discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri so-
let. Menses imposita trahit. Superiore radice ex vi-
no pota, venerē stimulari, & inferiore sumpta ste-
rilescere tradūt. Superiore quoq; vtiliter infantium
enterocelis, cum aqua potui dare praeipiunt.

Sparganium. CAP. XIX.

Sparganium, aliqui xiphidion vocant: folia ha-
bet gladioli, sed arctiora, & in terram magis
procumbentia: in summo caule veluti pilulae pro-
minent, in quibus semen. Contra serpentis vene-
na, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XX.

Xyris, folia habet iridis, latiora, & in cacu-
mine mucronata: quorum medio caulis erum-
pit, satis crassus, cubitalis, ex quo siliquae triang-
lares depēdent: in quibus purpureus flos, in medio
punicus: semen in folliculis, simile fabis, rotundū,
rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Con-
tra capitis vulnera, fracta q; efficax est: aculeos
& spicula omnia citra molestiam extrahit, adie-
cta floris aeris tertia parte, & radice cetaurij ac
mellis quinta: tumoribus & collectionibus illita
cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad
cōuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias et
alui profluvia. Semē tribus obolis potū, vrinā rebe-
mentius impellit: & cum aceto, lienem absūmit.

Anc

Anchusa. CAP. XXI.

Anchusa, quæ alio nomine calys, aut onoclea appellatur, folia habet lactucæ in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquouersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inficit sanguineo colore: læto sole nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera ulcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: leprus & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctio renum vitis, lienis, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt alium folia in vino pota. Radice pigmentarij vtuntur ad vnguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui alcibidion, aut onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles, in quibus flos purpureus in puniceum vergens conspicitur: radices rubræ, prælongæ, quæ menses sanguineum succum sudent: in sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarum, auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue aligatu: nam si quisquam mandes, in serpētis os inspuit, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuitur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio pota, latas ventris tineas excutit.

Lycopsis. CAP. XXII.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactucæ, longioribus, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutus adnatis, multis, cubitalibus: flore in ijs paruo purpurascente: radice rubra, & adstringente: nascitur in campis. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium. CAP. XXIII.

Vulgò lin-
gua hirci-
na.

Echium, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchuse proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo caule breuiora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò à serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semine idem præstāt munus. Lumborum dolores sedat, in vino aut sorbitione sumpta, & lac extrahit.

Ocimastrum. CAP. XXIII.

Ocimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantales, hirsutos:
* Melaihy. siliquas hyoscyamo similes, semine, ut * gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum caterarumq; serpentium morsibus

sibus medeatur. Datur ischiadicis cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Erinus. CAP. XXV.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs ocymi, sed minoribus, parte superna diuisis, dodrantalibus surculis quinis senisve, flore candido: semine nigro paruo & acerbo: folia & caules * lacteo succo turgent. Semen drachmis duas * Sic Plin. bus, in quatuor mellis cyathis, oblitum, oculorum In græco fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro simpliciter, Succo.

Gramen. CAP. XXVI.

Gramen geniculatus serpit ramulis, à quibus gradices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, & ut arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiantur, eaq; iumenta & boues pascunt. Trita radix illius vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus: calculosa etiam vesicae excremēta comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone id quod iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inuiti: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrha dimidio decoquat.

quatur, adijcianturq; piperis & thuris tertia portiones, probatissimū erit oculorū medicamentum: id in area pyxide reconditur. Decoctum radice idem, quod herba, præstat. Semen vehementius urinam impellit, aliis vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur.

Sideritis. CAP. XXVII.

Nunc her=
ba Iudai=
ca, & Te=
trahil.

Sideritin aliqui heracleam vocant: folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspera: canles edit quadratos, dodrantem altos, ac quandoque etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumq; substringentis: in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, ut in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum: nascitur in petrosiss. Illita folia, suapte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera sideritis binum cubitorum ramulis, exilibus: folio filicis, numeroso, utrinque per oras diuiso: pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quàm betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius vis, foliorumq; ad vulnera, præcipua est. Sideritin aliā esse tradunt, quam Cratenas heracleam vocat, in macerijs, & vineis nascentem, folijs ab vna radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrantales, teneros, laues, subcādidos atque subrubicūdos: flore

flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. CAP. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, drantales aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, minutulis folijs circumdatos, ex obliquo crebras habentibus incisuras sectionibus, coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, non insuauis, verum medicato: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurum emulantibus: prouenit læto solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vuluæ profluvia, in vellere. Decocto quoque insident fœminæ fluxione vuluæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Rubus. CAP. XXIX.

Rubus, notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & fœminarum profluvia: præteris morsui accommodatissimum. Gingiuis firmant, & oris vitijs folia comanducata medentur, cohibentq; illita, vlcera quæ serpunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt, & condylomatibus, & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; suc

succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia quæ modò dicta sunt. Mori in rubo nascentis, quam optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit: sistitur alius præmaturi cibo, necnon flore in vino poto.

Rubus Idæus. CAP. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissimè illinitur, & ignem sacrum extinguit: stomachicusq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus complectitur quodcumq; contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, uinetis, & segetibus. Foliolorum succus potu deijcit aluum.

Elatine. CAP. XXXII.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

Eup

Eupatorium. CAP. XXXIII.

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicū esse-
rens caulem, lignosum, nigricātem, rectum,
tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum amplio-
rem: folijs per intervalla quinquēfolij, aut cannæ-
bis petiis similibus, quinquēpartito aut amplius
diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum serra-
tis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum
spectans, quod siccatum vestibus inhaeret. Contri-
ta huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlce-
ribus quæ agrè cicatricem trahunt, medentur.
Herba & semen in vino potum, dysenteria, ioci-
neris vitijs, & serpentium ictibus, liberat. Nec
qui aberrantes * argemonem hanc appellarint,
cum tamen longè alia sit, vti exposuimus.

Quinquēfolium. CAP. XXXIII.

Quinquefolium ramulos fert festucarum si-
militudine, tennes, dodrantales, in quibus
semen: folia menthae, quina singulis
pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex
candido pallescentem, auri æmulum. Nascitur in
riguis, & aquarijs ductibus. Subrubram habet
radicem, oblongam, veratro nigro crassiore.
Plurimis pollet remedijs. Ius radice decoctæ ad
tertias, si in ore contineatur, dentium dolores se-
dat: putrida oris vlcera, collutione sistit: arteriæ
scabritias, gargarizatu leuigat: contra alui pro-
fluvia, & dysenterias auxiliatur: item articu-
lorum coxendiciumq; cruciatibus potum. Cocta in

Est Offici-
narū Agrē
monia: ea-
rū autē Eu-
patorium
fortè Can-
nabis syl-
uestris. de
qua præce-
dēti libro.

* Græcus
Artemisiā
habet: sed
esse, vt nūc
vides, ar-
gemonē le-
gēdum, ex
anemome
(de qua li-
bro ij.) nō
obscurè co-
gnoscas.

acc3

aceto, & illita, serpentia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit: ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasq; sanat. Teneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest: itē aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternūm ramulorū: in tertiana verò, ternūm: in quotidiana, vnius. Ea quoq; folia, tricens pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

ANNO TATIO.

* Spicam lolio similem.] Non obscure hinc elicitur Lolium spica esse insignitum, ac proinde explodēdam eorum sententiam, qui Nigellam vulgò cognominatam, cuius in segetibus vbique tam vber prouentus, id esse statuunt. Ea siquidem non spicam, sed purpureum florem emittit.

Phœnix. CAP. XXXV.

Phœnix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, * spicam lolio similem: calamos digitorum seminum, radici aduolutos: septenas octonāsve

nasve spicas. In aruis tectisq; recenter illius nascitur. Harum virium compos, vt in vino austero pota, alui profluium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrinae impetus infrenet. Sunt qui ad alligatam in puniceo vellere & suspensam sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix.

CAP. XXXVI.

IDæa radici folia sunt ea quæ rusco: circum ea veluti exigui capreoli sunt, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus ad strictione opus est. Pota, citam aluum, mensq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radix.

CAP. XXXVII.

Gignitur Rhodia radix in Macedonia, costis similis, lenior, inæquabilis: quæ contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

Equisetum.

CAP. XXXVIII.

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur: Vulgò Cantharidi prodeunt inanes, gemiculati, in se da equina. farcti, rubescentes, leniter scabri, duri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuiolumq; dependet, comis multis, nigris, vt equorum cauda: radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinatur, tri-

X

tu folijs, & illitis. Radix cum sua herba tuſſim,
orihopnœam,ruptaq; adiuvat. Folijs in aqua po=
tus, diſſectiones veſicæ & inteſtinorū, enterocelæq;
in vnum coaleſcere, cogiq; feruntur. Alterū equi=
ſetum caulis eſt rectus, æqualis, cubito maior, in=
anus: comis per interualla breuioribus, candidio=
ribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vul=
neribus remedio eſt, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectorium. CAP. XXXIX.

Coccum, quo infectores vniuntur, frutex eſt
ſurcuſoſus, paruus, cui grana ceu lentes ad=
herent, quæ electa congeruntur. Optimum gigni=
tur in Galatia, & Armenia, deinde Aſia, & Ci=
licia: vltimum ex omnibus Hiſpanicum. Vis huic
ſpiſſandi: vulneribus, nervisq; præciſis, conuenien=
ter ex aceto tritum illinitur. Naſcitur quoque in
Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium ſimilitu=
dine, quod illius regionis mulieres ore legunt, &
coccum vocitant.

Tragium.

CAP. XL.

Tragium naſcitur in Creta tantum inſula,
lentisco ſemine, folio, & ramis ſimile, ſingu

* Ita Plin. lus tamen minoribus, * ſuccus ei lacteus, gummi
Græcus co non diſſimilis. Semen, folia, lacrymaq; illitu ſpi=
dex ſimpli cula è corpore eijciunt: omnia quoque corpori im=
citer, ſuc= pacta, eu= cant: pota ſtranguriæ medentur, calcu=
cus. los veſicæ frangiūt, menſes trahūt. Modus in ſum=
ptione eſt, drachma vna. Fama eſt ſylueſtres ca=
pras ſagittis conſoſſas, eius herbe pabulo ſpicula

EXCII

excitere. Est & alterum tragium, quod trago-
ceros aliqui vocant, folia scolopendrij habet, &
radicem sylueſtris raphani, tenuem, candidam:
quam crudam vel coctam eſſe dyſentericis pro-
deſt. Folia autumnno, hirci virus olent: exinde ſibi Nominis
tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & cauſa-
præcipitijs.

Tragium.

CAP. XLI.

Eſt etiam herba tragos, quam aliqui ſcorpion
aut traganon vocant: maximè in maritimis
naſcens, palmum alta, aut amplior, fruticoſa, hu-
milis, oblonga, ſine folijs, puſillis circa ramos aci-
nis, ruſis, multis, magnitudine tritici, acuto cacu-
mine, guſtu multum adſtringente. Racemorum
acini decem ex vino poti, cœliacis, & feminis
fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tun-
duntur à plerique, & in paſtillos digeſti aſſernan-
tur, quibus viuuntur cum opus eſt.

Iuncus.

CAP. XLII.

Iunci duo genera: vnum læuis nominati, alte-
rum acuti, qui in mucronem faſtigiatur. Cu-
ius etiam duo aſſignantur genera: vnum ſterile,
reliquum fert ſemen nigrum, rotundum, & craſ-
ſiore conſtat calamo, carnoſioreq;. Tertius eſt iun-
cus qui vocatur oſſchænos, prioribus carnoſior,
aſſeriorq;, is ſimilem ſupradicto fructum in ca-
cumine parit. Semen viriusque coſtum, ex diluto
vino potum, ſiſtit aluum, & rubra ſexinarum
profluua: vrinam cit, capitiſque dolores facit.

Quæ proxima sunt radici folia tenera, cōuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

CAP. XLIII.

Officinis
Hepatica.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, aspergionosis petrus adheret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Inuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & lingue defluxiones inhibet.

Paronychia.

CAP. XLIIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor lōgitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Chrysocome.

CAP. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborū, hyssopo simili: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum equante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosi opacisq; nascitur. Radix exalfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vulnæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum.

CAP. XLVI.

Chrysogonum dense fruticat, quernus folijs: flore coronarij verbasci: radix ut rapum extuberal, intus ruberrima, foris nigra. Quæ iri-

ta

ta cum aceto, atque imposita, morsus aranei mor-
bus auxiliatur.

Elichrysum.

CAP. XLVII.

ELichryson quidam chrysanthemon, nonnulli Alij Helio-
& id amaranton vocant, quo deorum simul chryson.
lacra coronant: ramulum habet candidum, virē-
tem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatij Stachas
angusta, abrotano similia: comam aurea lucis in citrina.
orbem, umbella rotunda veluti siccis corymbis de-
pendentibus, radice tenui: nascitur in asperis, &
torrentium alueis. Contra serpentium ictus, co-
xædum dolores, vrinæ stillicidia, ruptaq; coma è
vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguinem con-
cretum ventris ac vesicæ absument, pota cum mul-
so: ieiunus, trium obolorum pondere, sistit destil-
lationes, data in vino albo diluto: vestibis inseri-
tur, vt eas ab erodentium iniurijs tueatur.

Chrysanthemum.

CAP. XLVIII.

CHrysanthemon aut caltha, nonnullis buph-
thalmos: herba est tenera, fruticosa, læues
proferens caules, & multifida folia: flores supra
modum splendentes, luteos orbem oculi imitantes,
vnde buphthalmi nomen traxit: propter oppida
nascitur. Cuius caules oleris vice māduntur. Flo-
res cum cerato triti, steatomata discutere produn-
tur: regio morbo correptis, colorē breui reddunt, si
sequente longo balnei vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum.

CAP. XLIX.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longi-

rudine assurgens, simplex, humilis, origano maximè similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissimè flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruēs: huius vsta odor vrinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca.

CAP. L.

PERISTERION, siue verbenaca nascitur in aquis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columbæ circa hanc perquam libenter versari soleant. Dodrantis altitudine, & interdum amplius adolefcit: folia è caule prodeunt incisa, & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; soli, constare sæpius inuenitur. Folia cum siliis adipe recenti, aut rosaceo impisita, vuluarum dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: purula vlcera cohibent: vulnera glutinant: vetera; ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba.

CAP. LI.

SACRA herba, quæ & peristereon nominatur, ramulis emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia quercus, sed minora angustioraq; eiusdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus castio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitæve, aduersus serpentes pollent, eadem drachmæ pōdere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores & inflam

inflammationes mitigat: sordida vlcera purgant:
Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrum=
pit: oris nomas gargari. Catu cohibet. Ait, si aqua
spargatur triclinium, qua maduerit, letiores con=
uictus fieri. Datur potandum in tertianis febr=
bus, tertium à terra geniculum, cum folijs circum=
dantibus: quartanis, quartum. Sacram vocat her=
bam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq;
commendetur.

Astragalus.

CAP. LII.

Astragalus, parvus à terra frutex, folijs &
ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo:
radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adna=
tas appendices firmas habet, nigras, præduras,
veluti cornua inter se implicatas, gustu adstrin=
gentes. nascitur in ventosis, opaci, & in murali=
bus: ea Memphis Arcadia scatet. Aluum sistit ra=
dix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceri=
bus, sicca efficaciter inspargitur: sanguinem sup=
primit: ægrè propter durtiam tunditur.

Hyacinthus.

CAP. LIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem
caulem, leuè, minimo digito tenuiorè, her=
bacei coloris: comam procumbentem, florum pur=
pureorum plenam, incuruam: radicè quoque bul=
baceam. Quæ, vt creditur, pueris cum vino albo
illita, pubertatem coërcet, & non patitur erum=
pere: sistit aluum pota & vrinam impellit, pha=
langiorumq; morfib; auxiliatur. Semè adstrin-

gentius est, theriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum.

Papauer erraticum. CAP. LIIII.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græ-

* Locum deprauatū esse manifestū apparet. Sunt enim herbaræ, quas hic cōmemorat Dioscorides, quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad diuersa plagiæ decoctæ, potui dabis, quibus somnus accenditur facie, ut vni eidēq; rectè cōparari nequaquam possint: quomodo autē instaurantur, peritiorib' cogitandum relinquitur.

* Folia erucæ, aut origani, aut cichorio, aut thymo similia spectantur: sed longiora, diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flis syluestris anemones, puniceus, interdū albus: oblongum caput, sed quā anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capitula decem aut sex, in vini cyathis tribus ad diuersa plagiæ decoctæ, potui dabis, quibus somnus accenditur facie, ut vni eidēq; rectè cōparari nequaquam possint: quomodo autē instaurantur, peritiorib' cogitandum relinquitur.

Papauer satiuum.

CAP. LV.

Esatui papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanus in usu sit: eo etiam ex melle pro sesama vtiūtur: thylacium vocant. Capitulum habet longū, & semen candidum. Syluestre verò, caput insidens demissumq; & nigrum semen, quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniā eius

sca

scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syl-
uestre, & ad medicinas valentius, multo his lon-
gius, productiore capitulo. Omnium in commu-
ne natura refrigeratrix: quare si capita ipsa &
folia decoquantur in aqua, somnum fortis concilia-
bunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Caly-
ces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti,
ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tun-
duntur quoque virides, & digeruntur in pastillos,
qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque
per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; ad-
iecto melle, dum humor coeat in eclegmaus lento-
rem. Id medicamentum in tussi, arteria fluxioni-
bus, & coeliacorum affeetu, doloris leuamentum
præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypo-
cistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen
tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, &
fœminarum profluvia: in peruiigijs fronti tem-
poribusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis
refrigerat, inspissat, siccataq;: sumptum erui ma-
gnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum
allicit: tussi, atque coeliacorum valetudini auxilia-
tur: verum si copiosius hauriatur, nocet, cum le-
thargicos efficiens interimat. Ad dolores capi-
tis cum rosaceo perfusum efficax est: aurium do-
lori, cum amygdalino, myrrha, & croco instil-
latur: inflammationibus oculorum cum torrefi-
cto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus,
cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & cro-

co: somnū accersit, subditū sedi pro balano. Opti-
 mum. Opiū quod mum habetur graue, & densum, gustu amarum,
 odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur,
 laue, candidum, neq; asperum, neque grumosum,
 quod inter colandum non vt cera coëat, & in so-
 le diffundatur: dein admotum lucernis, non atra
 luceat flamma: extinctū deniq; odoris vim conser-
 uet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris la-
 Eius adul- Et lucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum,
 teratio. in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo suc-
 co fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur:
 gummi vitiatum, splendescit, & infirmum est.
 Nec desunt qui eò dementiae deuenierint, vt adi-
 pem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad ocu-
 lorum medicamenta, dum mollius, atque rufius
 appareat. Diagoras, vt Erasistratus auctor est,
 vsum eius damnavit, oculorum lippitudinibus &
 aurium vitij infundi vetans, quoniam visus
 aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit
 Andreas, illitos eo protinus excæcari, si non adul-
 teraretur. Mnesidemus vsum duntaxat olfactan-
 di probauit, quoniam ad conciliandum somnum
 conueniret, alioqui nobis vt noxio interdicat. Quæ
 commentitia esse, experimento deprehenduntur:
 siquidem effectus, virium huiusce medicamen-
 ti, fidem faciunt. quare non alienum fuerit scri-
 ptis mandare, quonam modo is excipiat suc-
 cus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & præ-
 lo exprimunt, teremēsque in mortario, digerunt
 in

in pastillos: id meconium vocatur, multum opio-
gnauius. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum Opij colli-
ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellis, ne gedi ratio.
venitus adigatur, ex obliquo in rectum summam
cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem,
digito in concham abstergere: nec multo post re-
dire, vt concreta inueniatur: etenim quæ tum, aut
postero die etiam offenditur, in vetere pila teri
debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur,
retrocedendum est, ne vestibus succus dera-
datur.

Corniculatum papauer. CAP. LVI.

PApauer ceratites, id est, corniculatum, folia Vulgò pa-
habet candida, hirsuta, verbasco similia in pauer cor-
ambitu syluestris papaueris more serrata: cau-
nutum.
le non dissimili: flore pallido: calyculo fœnigraci,
in corniculorum modum inflexo, vnde nomen
mutuatur: semine papaueris, pusillo, nigroq;: ra-
dice per summa cæspitum, nigra, crassa: nascitur
in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in
aqua decocta ad dimidias, coxendicum & ioci-
neris affectus, potus sanet: prodest his qui crassa
quædam, aspera, aut araneosa cum lotio reddunt.
Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua
mulsâ poto. Crustas emarginant, illita ex oleo fo-
lia floresq; & argema ac nubeculas iumentorum
perunctis, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc pa-
paueris genere faciliari existimarunt, falsi qua-
dam foliorum cognatione.

Spu

Spumeum papauer. CAP. LVII.

Aliud papaueris genus, aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule do-
**Struthio.* drantali: folijs admodum paruis, **radicula* simi-
 libus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba

**Sic ex* est, & spumea tota: **radice* in summo caespite.
 Theophras- Legiturestate semen, cum integrè adoleuit, deci-
 sto. Vide- ditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in a-
 tur enim qua malsa, vomitione expurgat: priuatim huius-
 locus in modi purgatio, comitialibus prodest.
 greco Dio
 scoridis co
 dice corru
 ptus.

Hypecoum. CAP. LVIII.

Hypecoum, aliqui hypopheon vocant: nasci-
 tur in segetibus aruisq; folijs rutæ, exilibus
 ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscyamus.

CAP. LIX.

Nunc Ius **H**YOSCYAMUS, frutex est caules emittens cras-
 quiamus. sos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsu-
 ta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam
 pumcorum cytini, scutulis septi seminum plenus, ut pa-
 paueris. Tres eius differentiæ: Vna semine nigro,
 floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytiniis præ-
 duris, & spinosis. Alterius semen subflauum, ut
 irionis: flores lutei: folia, & siliquæ simpliciores.
 Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in com-
 muni usu damnantur. Tertium genus, ut quod mi-
 tißimum esset, medici recepere: pingue, lanuginos-
 sum, molle, candidi floris seminisq; in maritimis
 ruderibusq; nascens. Cuius occasio si non adsit,

rñ

rufum vſurpari oportet: niger, vt deterrimus, im-
probatur. Recenti ſemine, caulibus folijsq; tuſis,
ſuccus in ſole exprimitur, & exiccato humore,
vſus ad annum vſque prorogatur: nã facile corru-
ptionẽ ſentit. Extrahitur etiã ex ſicco ſemine ſe-
paratim in aqua calida tuſo, & expreſſo. Liqua-
mentũ autem ſucco lacteo præſtãtius eſt, & ma-
gis dolores ſinit. Cõtuſa herba recens, addita tri-
meſtri farina, digeritur in paſtillos, & recondi-
tur. Liquamentũ primum, & quod à ſicco ſemine
exemptum eſt, collirijs, quæ doloris ſenſum auſe-
runt, cõmodiſſimẽ inferi ſolent: cõtra acutias cali-
dasq; fluxiones, dolores aurium, atque vuluæ ma-
la, proſunt: cum farina autem aut polenta, oculo-
rum, pedum, ceterarumq; partiũ inflammationes
placant. Semen eadẽ præbet: tuſi, deſtillationi-
bus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax: con-
tra menſium abundantiam, & rumpentẽ aliuinde
ſanguinẽ, oboli pondere cum papaueris ſemine, &
aqua mulſa, bibitur: podagris ſubuenit: teſtibus
inflatjs, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex
vino illinitur. Alijs quoque cataſmaſis, quæ do-
loris leuamentum præſtant, admuſceri ſolet. Folia
omnibus medicamentis dolorem ſedantibus, per
ſeſe, & ex polenta, utiliſſimẽ imponuntur: recen-
tia, ad mitigandos omne genus dolores, oblinun-
tur: cum vino terna, quaternãve pota, ſanant al-
gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum
modo folia, ſi acetabuli menſura manduntur, me-

do

diocrem insaniam gignunt: idem efficere tradunt, si, colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium.

CAP. LX.

Psyllion folijs coronopo non dissimilibus, hirsutus, longioribus: sarmentosa fœni modo, in totum herbula: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, publicum simili: unde & nomen: in aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosa-ceo, aqua, aut aceto: enterocelis infantium, & pro-
minenti umbilico, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aqua sextario made-
factum, ubi cōcreuit aqua, illinitur: siquidem ve-
hementer refrigerat, & in feruentem aquam de-
iectum calorem reprimit. Contra ignes sacros ef-
ficax est. Fama est, si virens domum importetur,
non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum,
sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, expur-
gat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione la-
borantibus, ex melle prodest.

Hortense solanum.

CAP. LXI.

Hodie sola-
trum corru-
ptæ.

Hortense solanum, frutex cibus idoneus, pubes-
sillus, multus concavus alis: folio nigro, ma-
iore quàm ocimi, & latiore: fructu rotundo, viri-
di,

di, qui post maturitatem nigricat, aut fuluescit: herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlceribus quæ serpunt, & igitur sacris, conuenienter cum polline polentæ illinuntur: egilopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstuantî stomacho auxiliantur: parotidas, cum sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum atque vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad egilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasim vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortæ Officiniæ lium fimo subactus, & linteo appositus, egilopis Alkekengi præsentaneo est remedio. Est & aliud solanum, Arabum quod peculiari nomine halicacabon aut physa exemplo. lida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folliculus orbiculatis vesiculis similibus: semine intus fuluo, rotundo, leui acinorum vix effigie: quo coronarij vtuntur, corollis intorquentes. Vini usumq; hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expeditur. Regium morbum purgat, semine poto, & vrinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccat in vmbra, reconditur, ad eadem valens.

Sol

Solanū somniferū. CAP. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam haliacax-
 bon appellant, fruticat multis ramis, densis,
 caudicosis, fractu contumacibus, pinguium folio-
 rum, cotoneæq; mali simulum plenus: flore grādi,
 rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi,
 subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non
 procul à mari. Radicis cortex, in vino drachmæ
 pondere potus, somnificam vim habet, opio mi-
 tiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi
 duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adij-
 ciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est
 aqua copiosa mulsu, potui data. Succus pastillis
 inseritur, & medicamentis quæ doloris leuamen-
 tum præbent: decoctus in vino, si in ore contineat-
 tur, dentiū doloribus auxiliatur. Radicis succus,
 cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Manicum solanum. CAP. LXIII.

Solanum manicum, aliqui perision, alij thryon
 appellauere. Huic folium erucæ simile, maius
 aliquanto, satis acantho, quem pæderota vocant,
 accedens: caules à radice proceros emittit decem
 aut duodecim, vlnæ altitudine adulescentes: caput
 in cacumine, oliuæ figura, sed vt platani pilulæ
 hirsutius, verum maius, latiusq;: florem nigrum:
 postquam eo exiit, racemus exit rotundus, me-
 ger, dens aut duodenis acinis constans, similibus
 bederæ corymbis, vt ruæ mollibus: radice firma-
 tur candida, crassa, cava, cubitali: gignitur in
 mont

montibus, vento perflatus, & platanetis. Radix drachmæ unius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non inuicundas obuersari: sed duplicatus hic modus, ad tres vsque dies mentis alienationē affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsæ copiosius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium. CAP. LXIIII.

DOrycnion Crateus halicacabon, aut caleam vocat: frutex oleæ nuper prodeuntis similis: nascitur in petris, non procul a mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore candido: siliquis in cacumine, cœn ciceris, densis, rotundis, quibus intus aut senus seminibus, exigui erui magnitudine, læuibus, firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere, qui dicerent, semen in amatoria expeti.

Mandragoras. CAP. LXV.

MAndragoram, aliqui antimalum, alij ciceam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ fœmina existimatur, thridacis appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactucæ, virosus ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbus similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inhaeret bene ma-

Y

* Alij mo=
rion.

gnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris fo=
rus, intus albus, crasso cortice vestitus, caule vi=
duus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnul=
lis* norion vocitatus: huius folia magna, alba, le=
ta, leuia vt betæ: mala quàm alterius duplo maio=
ra, colore in crocum inclinate, iucunde cum gra=
uitate quadam olentia: quorum pomorū cibo, ali=
quantum opiliones seporantur. radix, alterius si=
milis, maior & candidior, orbata & hæc caule.
Succus fit è cortice recentis radicis tuso, & prælis
subiecto: qui insolatus vbi concreuerit, sicili re=
conditur. Malus quoque succus depromitur, sed ali=
quanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus
lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices
in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius ser=
uant: cyathoq; vno viuuntur, in peruiigijs, & do=
loribus, & ante sectiones vstionesq; ne sentian=
tur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt vera=
trum, per vomitiones bilem atram pituitamque
extrahit: verum potu largiore, vita adimitur.
medicamentis ocularibus, & his quæ dolores fi=
niunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: se=
mioboli pondere inditus, per se menses & partus
expellit: subditus sedi pro balano, somnificus est.
Radix eburr emollire fertur, quæ senis horis cū eo
decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere
optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia re=
centia cōuenienter oculorum inflammationibus,
& collectionibus, quas vlcera citant, cum po=
lent

lenta illinuntur: duritias omnes, suppurationes, strumas & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisve diebus, sen-
sim perficiuntur. Folia seruantur in muris, eos-
dem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex ace-
to, & serpentium icibus ex melle aut oleo, mede-
tur: strumas atque tubercula, cum aqua dissipat:
articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit ci-
tra coctionem vinum è cortice radice, ad hunc
modum: Ternæ minæ in vini dulcis metretam
coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui
secari aut amburi debent, vt antè dictum est: si-
quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterno
quodam pressu, torpescunt. Mala soporem affe-
runt olfactu, & etiam si mandantur: item ex-
pressus ex eis succus: nimio tamen odore percussus,
obmutescunt. Semen malorum potum vultus pur-
gat: appositumq; cum sulphure ignem non exper-
io, rubra foeminarum profluvia sistit. Scarifica-
ta punctisq; multifariam aperta radice, erupens
lacryma, cauo vase recipitur. Liguamentum au-
tem succo lacteo præstantius est: sed non vbique,
vt experientia docet, radices lacteum succum de-
lacrymant. Alium tradunt esse mandragoram,
nomine morion, in opacis iuxta specus enatum: fo-
lijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodranta-
libus, radicem ambiētibus: quæ mollis est & can-
dida, paulò maior palmo, pollicemq; crassitudine
æquat. Tradunt eam in pane, offa, obsoniove,

drachmæ pondere deuoratam, vsum rationis incipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis, quaternis=ve, ex quo data est, horus. Hac medici vñtur, cum scindendi, vrendiq; necessitas adest. Antidotiũ esse volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum.

CAP. LXVI.

AConitum, aliqui pardalianches, alij cam= moron, alij ihelyphonon, alij myoclonon, alij iheriophonon vocant: folia habet cyclamini, * Ita Plin. aut cucumeris, tria aut quatuor, minora et* sub= Græcus hirsuta: caulem palmo altum: radix scorpj cau= μοτρη dam emulatur, & alabaſtri modo splendet. Tor= xia, id est, pascunt, vt fama est, scorpiones admota radice, subaspera, stupentiq;: qui rursus hellebori contactu, excitant= vtra autem tur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gra= lectio po= tia adijcitur. Enecat pantheras, sues, lupos & fe= tior, herbæ, ras omneis in carnibus obiectum. Est & alterum si quando aconitum, quod aliqui cynoclonon, alij lycoclonon sese obtule= appellant. Huius genera sunt tria: vñ, quo vtun= rit, aspe= tur venatores: alia duo in vsum suum vertere me= Etus indica dici. è quibus tertium, quod Pōticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinus exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie plata= ni, crebriore diuisura, longiora, & multò nigrio= ra: caulem silicis pediculo similem, nudum, cubita li altitudine, aut amplio rem: semen in siliquis ob= longis recondit: radices in modum squillæ marinæ cirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem lu=

por

porum viuunt : insertæ siquidem crudus carni-
bus, & deuorata, lupos enecant.

Cicuta. CAP. LXVII.

Cicuta caulem ædit geniculatum, vt fœnicu-
li, grandem, * folia ferulæ, angustiora, gra- * Plinius
ui odoratu : rami, mox umbellæ in summo pro- lib. 25. ca.
deunt : flores quoque albicantes : & semen aniso 13. Corian-
candidius : radice non alta, concaua. Cicutæ le- dro assimi-
tale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. lauit, cui
Remedio est vini meraculi potus. Succus expri- propius fa-
mitur contusis cacuminibus, priusquam semina nê quàm
& comæ siccescant : qui sole densatur in pastillos. ferulæ que
Multus ad medendi rationem vsus est aridi: cōmo fœniculi
dè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia constat fo-
temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpūt, lijs, Cicu-
illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testi- ta omnib;
bus circumlita, libidinū imaginationes in somno, hodie com-
compescit : sed genitale resoluit. lac puerperarum perta, vi-
mamms apposita extinguit: in virginitate mani- detur acce-
mas coërcet, & increfcere non patitur : pueris dere.
præstat, vt eorum testiculi cibum non sentientes,
intabescant. Efficacissima vis Crelicæ, Megarēsi,
mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

Taxum. CAP. LXVIII.

Smilax à Græcis, taxus à Latinis appellatur,
arbor abietis magnitudine, & foliorum eius-
dem figura, in Italia & Narbonēsi Gallia Hispa-
niæ contermina nascens. Aucula quæ Italicæ ta-

xi baccis deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripuntur. Narbonæ tam præsentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, ledantur, & sæpenumero moriantur: quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

Apocynum. CAP. LXIX.

Apocynon, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est longis viticulis constans, male olētibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosis, fructu ferè inuictis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremū acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliquæ, ceu fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, vulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

Nerium, seu rhododendrum.

CAP. LXX.

Nerion aliqui rhododaphnen, alij rhododendron vocant, frutex est vulgaris notitiæ, longioribus quàm amygdala folijs, crassioribusq;: flore in rosam conformato: fructu* nuci græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam linosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem, radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa: nascitur in amœnis, maritimis, & secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis venena sunt: hominibus verò

Amygdala.
le.

cont

contra serpentium morsus praesidia, è vino pota:
eo magis ruta addita: imbecillæ etiam animan-
tes, vt pecus & capræ, si aquam bibant, in qua
folia ea maduerint, moriuntur.

Fungi. CAP. LXXI.

Fungorum differentia duplex: aut enim man-
duntur, aut perniciales sunt. Multis de cau-
sis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus fer-
reus, in quo sit rubigo, aut pñi marcor adfuerit,
aut si iuxta serpentis cauernā, arborēsve, quæ pri-
uatim pariunt noxios fructus, erūpant. Continent
qui tales sunt, nescio quod strigmenū cōcretamq;
pituitam, terraq; eruti, quā celerrimè cōputre-
scunt, atque marcore vitiātur. Sed qui veneno im-
buti non sunt, suauem in iuribus gratiam habēt:
largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti
strangulant, aut choleram morbum citant. Reme-
dio est nitri potus, aut lixiuium cum acida mu-
ria, aut seruesactæ satureiæ, aut origani iusculū:
debellantur etiam gallinacei simi potu ex aceto,
aut eiusdē delinctū cū melle multo. Corpus alunt,
sed ægrè dissoluntur, cum magna ex parte inte-
gri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum. CAP. LXXII.

Colchicon, aliqui ephemeron, sunt qui agre-
stem bulbū vocant, autumnū exitū florem Hermoda-
ædit croci, candicantem, ab eo tempore, folia bul-
bi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem cinnarum.
rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem,

qua delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbis eius mediam habet rimam, fissuramq; qua flos erumpit: plurimum in Messēia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis voluptate imperitos allucit. Remedio sunt eadem quæ fungis: bubulum etiam lac potum auxiliatur: itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. CAP. LXXIII.

Fortè no = **E**phemeron, aliqui syluestrem irin appellant, strum Li = folia habet lili, sed tenuiora: caulem parem: lium cōual florem candidum, amarum: semen molle: radicem lium. unam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam: nascitur in syluis & opacis. Huius radix demibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine, id est, muralis herba.

CAP. LXXIII.

Officinis **H**elxine nascitur in parietinis, sepibus, vineis & segetibus: folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubetes, & circa eos veluti semina aspera, adherentia vestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturā habent, quæ ex causa sunt illis sacros ignes, adusta, condylomata, paruos incipientes, tumores, inflammationesq;. Suc =

cus

cus eius cum cerussa, ignibus sacris, & vlceribus
quæ serpunt, commodè illinitur, imponiturq; po-
dagris cum hircino adipe aut cerato cyprino: ve-
terem tussim emēdat instar cyathi haustus: ton-
sillis inflammationē sentientibus vtiliter & gar-
garizatur, & oblinitur: aurium dolorem cum ro-
saceo instillatus lenat.

Alfina. CAP. LXXV.

Alfina, aliqui anthyllion, nonnulli myosota Vulgò mor-
sus gallinae.
vocat, quoniam muscutorum aures folia
imitantur. Lucis opacisq; gaudet, vnde alfina di-
cta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi huius-
modi esset, & folijs minoribus, * nec hirsuta. cum * Ex Plinio
teritur odorem cucumis reddit.] Vim refrigeran-
di astringendiq; obtinet: oculorum inflammatio-
nibus cum polenta illinitur. Succus aurium dolo-
ribus infunditur: quin & emendat omnia quæ
helxine, id est, muralis herba.

Lens palustris. CAP. LXXVI.

Lens palustris, inuenitur in aqua non fluen- Officinis
te, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ lenticulæ
naturæ. Propter quod cōuenienter collectionibus, aqua
igni sacro, & podagris, illinitur per se, & cum po-
lenta: glutinat, & procidētia puerorū interanea.

Semperuium, seu sedum.

CAP. LXXVII.

Semperuium magnum idē nominatur, quo-
niam perpetuò folia vireant: cuius caules cu-
biti altitudinem implēt, interdum excedunt, pin-

gues, crassitudine pollicari, virentes, characia ti-
 * Vox ad= thymali modo insecti: folia pingua, * carnosae,]
 dita ex Plⁱ magnitudine pollicari, in cacumine linguae simi-
 mio. lia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia
 inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi:
 nascitur in montibus, & testaceis: supra domi-
 cilia etiam feritur. Eius vis refrigerare, & ad-
 stringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus
 quae serpunt, oculorum inflammationibus, ambu-
 stis igni, podagris per se, & cum polenta illita fo-
 lia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut
 rosaceo perfunditur: datur in potu contra pha-
 langiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia:
 teretes tineas potus in vino excutit: subditus in
 vellere, mulierum abundantiam sistit: succus ocu-
 lorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis,
 Vulgò ver= inungitur. Semperuium paruum in petris, parie-
 micularis. tinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nasci-
 tur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, cre-
 bro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus,
 mucronatis: caule à medio emicante, palmum al-
 to, umbellam herbidosq; flores, & tenues geren-
 te. Folia eisdem cum priore viribus praedita sunt.
 Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui
 andrachmen agriam, aut telephion vocauerunt,
 Romani illecebram, pusillis, crassioribusq; folijs,
 hirsutis, portulacae proximis: nascitur in saxis.
 Vis ei excalectorum, acris, exulcerans: illita cum
 axungia strumas discutit.

Vmb

Vmbilicus Veneris. CAP. LXXVIII.

COtyledon, siue vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formā tornato, ineuidenter concavo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, instillatusve, coniecta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, perionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calculos frangunt, urinam cient, hydropicis ex melle dantur. Herba vtūtur ad amatoria. Est & alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semperuino, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuium.

Vrtica. CAP. LXXIX.

DVo vrticæ genera: syluestris, asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illita, canis morsibus, addito sale, medentur: gangrænas, carcinomata, sordida vlcera, & quæ cacoëthe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponuntur: faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt, eadem detrita cum myrrha, & impōsita: procidentes vuluas, recen-
tia

tia contactu resilire cogunt. Semen potum ex passu, venerem stimulat, vulvae ora patefacit: cum melle delinctum, orthopneæ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest: thoracem expurgat: erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, alium emolliunt, urinas mouent, inflammationes discutunt: decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt: mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uram, gargarizatus succus exprimit.

Galiofis. CAP. LXXX.

Galiofis, frutex in totum caulem, & folia habet urticæ, lauiora, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpurascens, tenui: nascitur circa sepes, adificiorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusq; duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere: ad putrescentia, gangranas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion. CAP. LXXXI.

Galion, nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat: ramulum foliumq; habet aparina simillimum, retum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus illinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum usquedum albescat:

lass

lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nas-
citur in palustribus.

Senecio. CAP. LXXXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro, folijs
continuis, erucæ modo per extremitates diu-
sis, sed minoribus multò: luteis floribus, qui cele-
riter dissecti vanescunt in pappos. Nomen verò si-
bi vendicauit, quoniam flores capillorum ritu, ve-
re canescant. radice superuacua: nascitur maxi-
mè in macerijs, & circum oppida. Folia cum flo-
ribus refrigerant: quare illita cum vini modico,
vel per sese, testium & sedis inflammationes sa-
nant: quin & ex manna thuris medetur, cum re-
liquis vulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt.
Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præ-
stant: verum recentes epoti, strangulant. Totus
caulus, si coctus in passo potui detur, stomachi do-
lores à bili contractos, persanat.

Thalictrum. CAP. LXXXIII.

Thalictron folia coriandri habet, pinguiora
paulò: coliculū rutæ crassitudine, in quo fo-
lia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem
perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus. CAP. LXXXIIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testa-
ceusq; haud procul à mari, gracilis, capil-
laceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, &
collectiones cohibendi, & pedagræ, quas refrige-
rare opus sit.

Phyc

Phycus marinus. CAP. LXXXV.

Phyci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta iuxta terram, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagra modò, sed etiã inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem: verum ijs vii humidis cõuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucò quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. CAP. LXXXVI.

Potamogeton, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus vtile, & contra veterum vlcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quòd palustribus, & aquosis enascatur.

Stratiotes. CAP. LXXXVII.

Stratiotes in aquis nascens, ijsdem supernatat, & sine radice viuit: vnde cognomentum traxit. Herba semper uiuo similis, ni maiora haberet folia: quæ refrigerant. Sanguinem qui defluit à renibus, pota sistunt: vulnere quæ inflammacionem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotes millesoliũ. CAP. LXXXVIII.

Stratiotes millesolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit: folijs auicularum
Vulgatum millesoliũ. larum

larum pennis imitantibus, breui admodum disse-
ctoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum
simulant, præsertim breuitate atque scabritia, bre-
uiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surcu-
los in cacumine gerit exiguos, & capitula in mo-
dum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in
asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus
ad vlcera vetera, recentiaq; profluentem sangui-
nem, & fistulas.

Verbascum. CAP. LXXXIX.

VErbasculū differentias summas habet duas, Tapsus bar-
hoc nigrum, illud album: in quo mas & batus vul-
scemina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt gò.
brassicæ, pilosiora multò, & latiora, candida:
caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus:
flores albi, aut subpallidi: semen nigrum: radix lon-
ga, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in
campestribus. Verbascum, qui mas appellatur,
oblongius, albus folijs, & angustioribus, tenuiori
caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi
nigriore latioreq; constaret folio. Syluestre folia * Sic Plin.
fert saluiæ, altas virgas, & * lignosas, & circa qui εὐλὼς
eas ramulos quales marrubiū: flores luteos, auri deis vide-
æmulos. Sunt & phlomides duæ, hirsutæ, rotun- tur legisse.
dis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur: Græcus co-
ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quater- dex de-
nis, vel paulò pluribus, hirsutis, crassis, pingui- δ' ῥώδ' ε' is, id
busq; apta ad lucernarum lumina. Radix prio- est, arbore-
rum duarū adstringit: quare quod magnitudine scentes.

Iudic

ludicrum talum æquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasco cui flos aureus, capillos tingit, & quocumq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur: cum aceto quoq; vulneribus medentur: contra scorpionum ictus, sunt auxilio. Syluestris folia ambustus igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omninò nò putrescere.

Aethiopsis. CAP. XC.

AEthiopsis folia habet verbasco similia, perquam hirsuta, densaq; in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrågulum, crassum ac scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concanum alis: semen erui magnitudine, geminum, in vno cõceptaculo: radices ab eodem cæspite numerosas, lōgas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq; ut cornua possint videri: plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix, & pota: quin & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

Arction. CAP. XCI.

ARction, aliqui potius arcturon vocant, similis est verbasco folijs, nisi quòd hirsutiora,

ra, & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in vino, demum dolorem mulcet, si cōtineatur ore decoctum: ambusta per nionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è vino.

Arcion, siue Personata. CAP. XCII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora & Vulgò luphirsuiora, nigriora & crassiora: caulem alpa maior, bicantem, quanquam & interdū vidua caule re & Barda= periat: radice grandi, intus candida, foris m= na. gra. Hæc drachmæ vnius pōdere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuū contractos, illitus sedat. Folia vtiliter antiquis vlceribus illinuntur.

Petasites. CAP. XCIII.

Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænis, & vlcera, quæ cacoëthe vocāt, efficaciter illinuntur.

Epipactis. CAP. XCIII.

Epipactis ab alijs helleborine, parua herba, exiguis folijs. Iocineris vitijs vtilis, & contra venena pota.

Capnos, seu fumaria. CAP. XCV. Officinis

Fumaria fruticosa herbula est, prætenera, co= fumus terriandri similis: folijs candidioribus, vndique ræ.

Z

numerosis, cineracei coloris: flore purpureo. Huius succus claritatem facit oculis, delacrymationemq;: unde nomen traxit. Illitus cum gumi, euulsus palpebras renasci prohibet. Commanducata herba huiusmodi urinam trahit.

Lotus urbana.

CAP. XCVI.

Lotum urbanam alij trifolium vocant: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculis, ceterasq; caliginis discutit.

Sylvestris lotus.

CAP. XCVII.

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fenigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum malua semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores, qui vesicam male habent.

Cytisus.

CAP. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubitales, sepe maiores, in quibus folia fenigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustataq; cicer recens sapunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluaria serunt.

Lot

Lotus Aegyptia.

CAP. XCIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flu-
mine inūdatiis prouenit, caule sabæ: flore par-
uo, candido, * lilio simili, quem tradunt occidente * *λεπιδω*
sole comprimi occludiq; , ad ortum autem aperi- non *νεβη*.
ri: adduntq; , caput ipsum vespere aquis condi, &
ad exortum solis emergere. Caput quale papaue-
ris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ
Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem
lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ
cruda cocta q; manditur: decocta q; lutei oui qua-
litatem exhibet.

ANNOTATIO.

Aliud est à nostro Millefolio, quod pau-
lò antè stratiotem millefolium esse monui-
mus.

Millefolium.

CAP. C.

MYriophyllum, siue millefolium, caulis est
tener, singularis, vnicu nixus radice: plu-
rimis folijs, leuib, fœniculo similibus: vnde no-
men accepit. Caulis flauescit varius, ac veluti ex
industria delimatus: nascitur in palustribus. Vul-
nera recentia ab inflammatione vindicat, si vel
viride, vel siccum ex aceto, oblinatur: præcipita-
tis in potu cum aqua & sale datur.

Myrrhis.

CAP. CI.

MYrrhis, simillima est cicuta, caule fo-
milijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, odo-
rata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, pha-

langiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgatq; à puerperio feminas: subuenit & phthisicis cocta in sorbitione. Aunt quoque eandem his die terre potam ex vino in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

Myagron.

CAP. CII.

* τήλιδι,
non ἱρα-
χίδω.
MYagron, aliqui melampyron vocant, herba est surculacea, folijs rubis, pallidis, tripedanea: semine oleosum, * fœne græco simile. Quod contusum igni torret, perunculusq; virgis ad lucernarum lumina viuitur hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

Onagra.

CAP. CIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, vinum olente: nascitur in montibus. Aqua, in qua radix maduerit, in potu data feras mitigat, & cicures facit: illius quoque tetra ulcera mulcet.

Cirsium.

CAP. CIIII.

Censetur **C**irsium, caulis est tener, durum cubitorum, Bugloss' of triagulo similis: ab imo foliola, rosæ speciem ficinarum. referentia: anguli spinosi, per interualla molles: folia Plin. minus = lia bugloss' similia, * maiora, subcandida, modicè ra. hirsuta, partibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo

mo

mo purpurea, quæ soluantur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

After Atticus, seu inguinalis.

CAP. CV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habes purpureum, luteumve, per ambitum, anthemidis capituli modo diuisum, foliis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem circumdant folia, oblonga sunt ac hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, proci ducæ sedi, ac inguinibus illius auxiliatur. Tradunt purpureum florē, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiali malum sentientibus, optulari. Inguinum inflammationi recentem illinere conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manus decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum.

CAP. CVI.

Isopyron aliqui phasilon ob similitudinem vocant, quoniam folium quod est aniso simile in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanibj gustum imitantis. Contra tussim, & cetera pectoris vitia, semen ex aqua malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vile.

Viola purpurea.

CAP. CVII.

Viola purpurea folium habet hedera minus, tenuius ac nigrus, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus,

suauissime olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illiniuntur aptissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibus, sedique pro-cidenti.

Cacalia.

CAP. CVIII.

Cacalia, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florē ferens robori aut oleæ similem: nascitur in montibus. Radix in vino madesca, ut tragacatha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem immiscuntur, trita, & cum cera to illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Bunium.

CAP. CIX.

Bunium caulem ædit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semen odoratum, hyoscyamo minus. Urinam ciet, excalfacit, secundas euocat: lienis, vesicæ, reumbus utile. Tam humidi quàm sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsæ. Pseudobunium palmiti altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriâ, laterumq; dolores, sanât quaterni rami eius poti in aqua: illi quoque cum sale & vino, tepentes, strumas discutunt.

Cha

Chamæcissus.

CAP. CX.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longiore, ramulis à radice quinus senisve, drantalibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inuili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chamæleuce.

CAP. CXI.

Chamæleuce lumborum doloribus propitia est, herba virens, incuruis folijs, surculisq; flore rosaceo.

Buglossum, seu lingua bubula.

CAP. CXII.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabbulis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ tres thyrsos emittit, cum semine & radice tritâ, potamq; contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. herbam abscessibus utilem esse volunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitâs linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

ANNOTATIO.

Nostrum Cynoglossum caulem & pureos flosculos ædens, nō esse verum ac legitimum, historia eius apertissime indicat.

Z 4

Cynoglossum. CAP. CXIII.

Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: prouenit in sabuletis. Folia cum sinello adipe veteri, medentur morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herba ex vino potum.

Phyteuma. CAP. CXIII.

*Struthij.

Phyteuma folia habet* radicle, minora: copiosum semen, perforatum: radicem parua, tenuem, per summa terre nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. CAP. CXV.

Leontopodion duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quatermumve digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine involutum est, ut saepe fallat: radice parua cohaeret: quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. CAP. CXVI.

Hippoglosson, frutex est folia habes ruscitez minoris figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguis ex folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit: Malagmati radix succusque admiscetur.

Antirrhinum. CAP. CXVII.

Antirrhinon, alij anarrhinon vocant, herbam

644

caule & folijs anagallidi similem : flore albæ violæ, purpureo, minore tamen, ideoq; syluestris lychnis nominata est : semine vituli narium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, venustiores fieri : nec vllō medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

Catanance.

CAP. CXVIII.

EX eo genere una, folia coronari habet, longa, radicem iunci modo prætenuem : capitula sena, septenaria, in quibus erui semen inest. Crescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milii exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exigua oliuæ magnitudine : folijs quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis : semen, ut cicer, minimum, in virgulis dependet, puniceæ coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranque narrant in amatoria expeti. Thessalica mulieres his vi traduntur.

Tripolion.

CAP. CXIX.

Tripolion in marinis nascitur locis, quæ allis diuinda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco : folio glasti crassiore : palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, sero puniceæ conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

Z. 8

ANNOTATIO.

Officinarum Capillus veneris. Est enim earum Adiantum, non quod hic Dioscorides, sed Plinius libro xx. cap. xxj. depinxit, & candidum vocavit: non quin & ipsum, uti suspicamur, fuscis obtineat coliculos, sed quia Trichomani, quod illi nigrum est adiutum, comparatum, album potius, quam nigrum appareat.

Adiantum.

CAP. CXX.

Adianton, polytrichon, pusilla gerit folia. similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore utent, pratenues, palmum alti: radice supernuacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbe potum prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle siccis, & urinae difficili. Calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua, sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & manantia capitis vlcera, ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoque. Decoctum eius cum lixiuio & vino infusum, idem praestat: coturnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosus, & pal

Palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Trichomanes.

CAP. CXXI.

Trichomanes nascitur eisdem in locis quibus adianton: filici simile, sed exilius: folijs polytrichon lenticulae, tenuibus, in ordinem virinque digestis, quod idem aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco tamen cum colore splendentibus. Eadem quae & adianton Adianto. praestare posse constat.

Xanthium siue Lappa. CAP. CXXII.

Xanthium nascitur leto & pingui solo, & Vulgò lappacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pa minor. pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, infecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuae modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu vestibus adherescit. Is autè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro autè persicctum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita asservant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

Aegilops, siue festuca. CAP. CXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternave rubra, quibus aristae quasi capillaceae exeunt. Illa cum farina herba aegilopys medetur, duritias Marcello discutit. Succus farinae admixtus, siccat, & suppositio eorundem gratia reponitur. *Bromus herba aegilops.

lopi

lopi similis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dū liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui triam aloē addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux.

CAP. CXXIIII.

Glaux cytiso aut lenticulæ folijs similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini senæve, tenues ab radice, dodrantem alti: flores violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamē nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandā extincti lactis vbertatē.

Polygala.

CAP. CXXV.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulæ. gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

Olyris.

CAP. CXXVI.

Censetur **O**lyris, frutex est niger, ramulos ferēs tenues, Linaria lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, vulgò ap= quaterna, quina, senæve, ceu lini, nigra in initio, pellata. dein colore mutato rubescunt. Decoctum eius potum, inuat arquatos.

Aspera similax.

CAP. CXXVII.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmentum tenuia, multa, rubi modo aut paliuri

acu

aculeata: arbores scandit ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. Nasciur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia & acini, & ante & post epoti, venenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiã ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta quibus venena arcenur.

Læuis similax. CAP. CXXVIII.

Læuis similax folia hederæ similitudinem habet, molliora, lauiora, tenuiora: huius sarmenta nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit lupini modo nigrum, exiguum: flores circunquaque exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Hac smilace, quadam topiario rum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur: folia per autumnum decidunt. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obseruari traduntur.

Ruscus. CAP. CXXIX.

Syluestris myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut *Officinis* myrtacantha, Latinis ruscum appellatur: *fo= Bruscus.* lium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum: baccae per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis *sim*

simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in vino pota & urinam cient, menses pellunt, vesicae calculos frangunt, stillicidio urinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitiis locis nascitur. Decoctum radicum in vino potum, eosdem praebet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed urinam movent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXXX.

Laurus Alexandrina, foliis est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, *Rusco dodrantales, interdum longiores: radice *sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci: & stillicidio urinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXXXI.

Vulgò Laureola.

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisque multis, inde sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit: folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum ematuruit, nigra: radix inuulvis: nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens vel aridum in potu, menses cient & vomitus: caput inanit commanducatum, sternutamenta mouet. Baccae quindecim pota aluum resoluunt.

Cha

Chamædaphne. CAP. CXXXII.

Chamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo cōstantes, rectas, tenues, leues: folia lauri similitudine, leuiora multo, ac viridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, & stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idem facit pessa appositus.

Veratrum album. CAP. CXXXIII.

Helleborum album, Latini veratrum album vocant, fert folia plantaginis aut betæ syluestris similia, sed breuiora, & nigriora, *rube- *Plin. ca-
scentia: caulem cauum, quadrantalē, tunicus con- naliū dor
uolūtū, quas abdicat cum arefcere incipit: radici- so rubescen
bus nititur multis, tenuibus, ab oblongo et exiguo tia.
capite ceparū modo exeuntibus: nascitur in mon-
tibus & asperis. Radices mēsisibus colligendæ.
Optimum habetur candidum, friabile, carnosum,
modicē extensum, nec tamen iunci modo mucro-
natum, quod frangendo puluerē emittit, & tenuē
habet medullam, gustū non admodum feruēs, ne-
que saluā subinde ciens, (huiusmodi autē stran-
gulat.) Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum
autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere
quodam obsita, celerius strangulatus mouent.
Vomitioe autem varios extrahit humores. Colly-
rijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discu-
tiunt. Partus impositum necat, menses pellit, stera-

mæ

mutamenta excitat, mures interficit cum melle & polenta subactū, absumit carnes si coquatur mīa. Datur per se ieiunus, & cum sesama, aut ptisanæ succo, aut halicæ, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulle, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scriptitarunt, tum maximè à Philomede Siculo Eumeni, cui nūc æssentimur: quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pulvis sorbitione, aut copioso halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corporis infirmat: hoc enim modo detectio nihil periculi minatur, quòd cibo munitis non intempestivè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex eo balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. CAP. CXXIII.

Helleborum nigrum, appellatur melampredion, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus furentes in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, plitani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen cnici, quod in Anticyra sesamoides vocant:

cant: quo deiectiones moluntur: radicibus cohaeret nigrus, tenuibus, à capitulo, cepae simili confibratis: quarum est vsus: in collibus, asperis, & stientibus locus enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum iubi probatissimum gignitur. Eligi debet corpus lentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq;: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attamen Heliconium praecellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasq;: datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & in sculis, quae purgationis causi sumptitantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, insanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses indutum trahit, partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alierum aut etiam tertium diem esse sinitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur: dentium dolorem collutione mitigat: erodentibus medicamentis commiscetur: hydropicorum ventri vtilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma: consitum proximè radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsum domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem,

A a

Aesculapiumq; precantur, ac vitant aquilæ volatus. aduolare, enim nō sine periculo tradūt: nanq; si auis effusione hellebori conspexerit, moriturū qui succidit, auguriū est. Celeriter effodiatur oportet, quoniā halitus caput aggrauat: quapropter, ad id arcendum, fossuri, allium præsumere, & vinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

Sesamoides magnum. CAP. CXXXV.

Sesamoides magnū, in Anticyra helleborum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Vērem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæq; deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculi eorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fulium, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq;, semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Syluestris cucumer. CAP. CXXXVI.

Cucumis syluestris fructu solo distat à sativum cucumere, quem longè minorē parit, oblongis glandibus non dissimilem: folia atque sarmen

menta satui refert: radice candida, magna: nasci-
tur in sabuletis, & ruderibus, frutice in totū ama-
ro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori con-
uenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tu-
morem discutit: imposita cum resina terebinthi-
na, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur: poda-
gras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius de-
cocto dentes in dolore collumuntur. Arida farina
impetiginem, lepras & vitilignes absterget: ni-
gris cicatricibus colorem reddit, & in facie macu-
las expurgat. Radicis succus sesquiboli ponde-
re, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem
pituitamque deiciunt, præsertim in hydropicus:
(deiectiones autem citra stomachi iniuriam mo-
uet) radicis selibra, in vini præsertim Libyci he-
mina conteritur, damurq; ex eo terni cyathi tri-
dus, dum tumor abundè deprimi cernatur. E fru-
ctu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod
elaterium vocatur, ad hunc modum: Decerpi Elateriū.
cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruan-
tur nocte una: postridie imposito supra crate-
rem rariore cribro, utrisque manibus prehensi,
sigillatim supino cultro, sursum versus aciem ha-
bente, finduntur, atque per cribrum humor in
subiectū vas exprimitur: simulq; carnosum quod
hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur: quod
ita pressum est, residere finitur, atque in vicinam
peluum demittitur. Coacervata autem in cribro
semina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pres-

sa abijciuntur. Humor in pelui agitatur, & lin-
 teo opertus, soli exponitur: dumq; steterit, tota su-
 pernatans aqua cum humore concreto, effundi-
 tur. Hoc verò identidem fieri solet, donec existens
 aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimen-
 tum in mortario suscipitur, & conterendo cogitur
 in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus
 succi abundantiam, cribratos cineres humi in-
 spirgant, & medium cavantes, triplicatum lin-
 teum obtendant, per quod elaterium cum sua hu-
 miditate diffundunt, siccatumque, in pila, ut di-
 ctum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua mari-
 nam persuulentes, ita eluunt. Alij in novissima lo-
 tione, mulsam aquam respergunt. Elaterium opti-
 mum esse constat, laeve, non ponderosum, cum can-
 dore leniter humectum, gustus amarissimum,
 quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile fla-
 gret. Porraceum tamen scabrumq;, si turbidum
 spectetur, atque erui cinerisq; plenum sit, graue
 & vitiosum esse solet. Nec desunt, qui cucumis
 succo amyllum immisceant, ut candorem ipsum &
 leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium de-
 iectionibus utile est. Integer modus, obolus est: mi-
 nimus, semiobolus: pueris, chalci duo: siquidem co-
 piosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam
 vitrauis parte extrahit. Optima suspiriosis est pur-
 gatio. Quod si in animo sit deiectione moli, ad-
 iecti salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat,
 ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea
 cyat

cyathus unus aquae tepidae sorbeatur: ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elaterium, subie-
ctis linguae partes penitissimè penna oblinito:
quòd si quisquam difficiliter euomat, oleo aut un-
guento irino resoluto, somnum inhibeto. Porro his
qui eximie vacuantur, continuè vinum, & oleum
dari conuenit: etenim vomendo restituuntur. Quòd
si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta,
posca, poma, & quae stomachum densando corro-
borant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, &
partus enecat, in pessò subditum: morbo regio me-
detur, cum lacte naribus infusum, & diuturnus ca-
pitis doloribus liberat: efficacissimè anguis illini-
tur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphisagria. CAP. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia ha-
bet labruscae, diuisa: & cauliculos rectos, mole-
les nigrosq;: fert florem glastii: & folliculos viri-
des, similes ciceri, & in his nucleum triangulum,
scabrum, ex nigro subfuluescentem, minus album,
guſtu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua
mulsâ dentur, crassum humorem per vomitum pur-
gant: sed qui hauserunt, ambulare debent. pruden-
ter tamen attendere oportet, & aquam mulsam
continuò potius dare: quoniâ pericula strangulatio-
nis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo
illita, phihiriasi prodest: item prurigini & psori.
Cit plurimam pituitam commandicata: decocta
in aceto, dentium dolori, colluto ore, subuenit: rheu-

matissimum gingivarū sistit: vlcera oris manātia,
cū melle sanat. Vretibus malagmatis imponitur.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

Thapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis Insula, primum inuenta sit. Tota verò natura ferulae similis est: graciliore caule: folijs feniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulae, latiusculum, sed aliquanto minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio haec est: Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in formicis speciem in se excavata, cooperitur, quò merus succus confluat: oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium unū terunt: sed inualidior huiuscemodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manavit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus, exiccatur, atque teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora innadunt pustulae: ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radice, quàm succus, purgandi vim habent,

bent, & lacteus succus in aqua mulsa potus: nam
 utrinque bilem extrahunt. Radicis modus, qua=
 terni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis:
 succi, terni oboli: lactis, obolus vnus: quod eo am=
 plius assumitur, periculosum est. Huiusmodi pur=
 gatio conuenit suffiriosis, & diuturnis lateru do=
 loribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obso=
 nio, quibus difficile sit vomere. Tam radix, quam
 succus omnium maximè, quæ pares cum eis vires
 adeptæ sunt, vim habent extractoriam ex alto,
 vbi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum
 laxitas aliò transferenda est: vnde succus illitio=
 ne, aut radix recens affriclu, alopecias explent.
 Radix succusq; cum æquis ceræ thurisq; portio=
 nibus, sugillata liuorésque tollunt: sed non plus
 binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris
 calida foveatur. Vitia cutis in facie emendat, cum
 melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discu=
 tit, perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmo=
 num, laterum, pedum, articulorumque valetudi=
 nibus vtiliter illinitur. Valet ad integendam colis
 glandem, ijs qui natura, non circumcissione, curti
 sunt: tumorem enim excitat, qui pinguium fœtus
 emollitus, præputij iacturam refarcit.

A N N O T A T I O.

*Sine folijs.] Spartium, vt in agro Mons=
 pessulano eius feracissimo sæpe obseruauì
 (à G. Rondelletio eius loci clarissimo Me=
 dico primùm admonitus) cum primū erum=
 A 4 4

pit, plurimis foliolis turget, quibus omnibus cum ad consistentiam peruenit (quo solo fortassis tempore visum Dioscoridi) exuitur, adeò ut ramiuli eius iuncea deinde appareant. Est tamen hoc diuersum planè ab eo, cuius Plinius lib. x. ix. cap. i. i. meminit Catearum an spartum hoc loco depictum, sit idem cum Genista Latinorum, malo equidem dubitare cum Plinio, quàm eorum iudicio subscribere, qui diuersi generis plantas esse contendunt: & pro Genista fruticem quendam rebus alligandis (quod in illa tamen requirit Plinius, & Maro in Georgicis cum lentam appellet, satis innuit) parum idoneum ostendant.

Spartium.

CAP. CXXXIX.

Spartium frutex est, longas ferens virgas,* sine folijs, firmus, fractis contumaces, quibus vires vincuntur: semen lenticule, in folliculis phasolorum modo nascens: florem, ut albæ violæ, luteum. Purgant per superna vehementer, hellebori vice, citra periculum flores, & semina, quibus obolus in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis elistere: strigmenta autem elicit cruenta.

Sil

Silybum. CAP. CXL.

Silybon, lata spina est, folia ferens chamaleonis albi. Hæc recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ci et.

Glans vnguentaria. CAP. CXLI.

Glans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudinæ auellaneæ nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtiuntur: nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur plena, recens, candida, quæ faciliè delibretur. Ea drachmæ pondere pota, lienem absuit: cum lolij farina, & aqua mulsa, podagricis illinitur: psoras leprasq; decocta in aceto, vitilignes & nigras cicatrices cum nitro, emendat: & cum lotio lentiginis, varos & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ci et. Cortex eius magis adstringit: verum tussæ & expressæ succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus pruriginis & scabritias idonea sunt.

Narcissus. CAP. CXLII.

Narcissum sunt qui vt lilium, liriū appellarint, folia porro similia, tenuia, multo minorâ, & angustiorâ: caulis vacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

trocæus, in quibusdam *purpureus*: radix *intus alba*, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, *nigrum*, longum: probatissimus nascitur in montibus, suavi odore: ceteri porrum imitantur, atque herbaceum virus olent. Radix cocta, siue estur siue bibitur, vomitoria est: ambustus igni prodest, cum exiguo melle trita: præcisos nervos illitu glutinat: luxatus malleolis, diuurnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit: vitia cuius in facie, vitiliginesq; cum semine urticae, & aceto emaculat: cum eruo & melle, ulcerum sordes expurgat: abscessus rumpit concoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. CAP. CXLIII.

Hippophaës, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, undique denso & largo, folijs oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccae, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactius, siccat, & ad vsum reconditur. Syncerus, pituitas, bilem, aquasq; detrahit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Frutex cum radicib

dicibus siccatus tunditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, vti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippophæstum. CAP. CXLIII.

Hippophæston, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis quibus hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassius. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsâ, aquam pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitijs, & orthopnœa conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

Cici, aut croton, nomen accepit à ricini ani= Vulgò *Ca-*
malis similitudine: arbor prouenit purue si= taputia ma-
cus altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & ni ior.
griore: ramis, caudicibusq; cauis, in arūdinis mo-
rem: semine in vuis asperis, quod corticibus exu-
tum, ricinum animal representat: ex quo oleum,
nomine cicinum, exprimitur, cibis fedum, lucer-
nis emplastrisq; vile. Grana triginta numero
purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamq; per
alium extrahunt: vomitionesq; mouent, sed in-
iucunda admodū est, & molestā purgatio: siqui-
dem stomachum vehementer subuertit. Tusa &
imposita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat.

Fol

Folia cum polenta trita, inflammationes oculorū, tumoresq; leniunt: rigentes mammās colibent: eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Tithymali. CAP. CXLVI.

Tithymali genera septem, quorū masculus, characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter, myrtites, qui femina existimatur, eumq; myrsiniten aut caryiten vocant: tertius, paralius, quem tithymalida appellant: alius, helioscopius: quintus, cyparissius: sextus, dendroides: septimus, platyphyllos dicitur. Characiae canles supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caneolæ soliolis balnearum similes, in quibus semen continetur: nascitur in asperis, & montibus. Succus aliū purgat: trahit pituitam bilemq; binis obolis in posca sumptus: & cum aqua mulsa, vomitiones mouet. Appetente vindexiarum tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adiiciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasve guttas instillant, vt cum his inarescant: quis ad vsus recondunt. Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quò ventus aspiet, stare quenquam, neque

mian

manus oculis ad mouere conuenit : sed antequam colligatur, corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat : qui propter catapotia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari : binas tamen ternasve ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctis in sole capillos euellit, renascentesq; flauos, & exiles efficit : demique omnes perimit. Demum cauernis inclusum, leuat dolores : sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedanas ulcerum, gangrenas, fistulasq;. Legitur semen autumnino, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio, & caseo conuulso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

Fœmina, quam myrsiniten, aut caryiten vocant, similis suapte natura daphnoidi : folijs myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus : ramulos ab radice mittit dodrantales : fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu : nascitur & hæc in asperis. Succus,

cus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatē: sed ad citādas vomitiones inuālidior hęc est. Aliud tithymali genus dicitur paraios, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellauere: nascitur in maritimis, ramus subrubentibus, palmum altus, quinis senisve à radice exeuntibus: folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen, ut eruum, vario colore emicat: flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad vsus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacę, tenuioribus, rotundioribusq;: ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenus: capite anethi: semine velut in capitulis incluso: Helioscopi nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semenq;: ut aliorum. Eadem quę superioribus vires, non tamen vsque adeo validę.

Ciparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum: ex quo folia piceę similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem piceam æmulatur, unde nomen traxit. Candido succo madet, cui eadem vis quę superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur. ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus: folijs myrti te-

nuioris : fructu characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur. Platyphyllos, verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquis. Pisces necat, tusus, & aque inspersus. Reliqua tithymalorum genera quæ suprà scribuntur, idem efficiunt.

Pityusa. CAP. CXLVII.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassa, candida, succo referta, quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur: modus foliorum drachmæ tres.

Lathyrus. CAP. CXLVIII.

Lathyrus, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitalli crassitudine, inanem: gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & leuiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, cœu capparin, in quo gra-

Officinis
Cataputia
minor.

na intercurfantibus mēbranis inter se distincta continentur, erius maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia: Nullus radicis vsus. totus frutex lacteo succo turgēt, uti tithymalus. Grana sex aut septē in catapotio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata, aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectū præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquantur ad eosdem effectus.

Peplus. CAP. CXLIX.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut ruæ, paulò latioribus: rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs rotundo, minore quàm candidi papaueris: pluribus scatet auxilijs. mucam radicem habet, supernuacua, ex qua fruticat: nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur mēsisibus: siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus iusus & feruesfactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto: obsonijs inspersa conturbat alui: muria conditur.

Peplis. CAP. CL.

Peplis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice: candidi succi pleni: folijs satiuæ portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo,

peplo, feruente gustu : radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Chamæsyce.

CAP. CLI.

Chamæsyce aliqui sycen nominant. ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succofoss, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepulum, planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: semine sub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex vino triti vtiliter dolores sedant, in pessa appositi: tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibis, aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest illitus contra scorpionis iclum auxiliatur: aduersus caligines oculorum vtilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisq; nascitur.

Scammonia.

CAP. CLII.

Scāmonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: folijs helxine, aut hederaceis, mollioribus. tamen, hirsutis, & triangulus: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit vt in cauum confluat succus, qui conclus demum ex-

Bb

cipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fo-
 diunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profun-
 dum succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur au-
 tem scammonium leue, nitidum, rarium, & colore
 quam simillimum taurino glutini, fungosum, te-
 nubus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae de-
 portatur. Nec attendere solum par est, si lingua
 tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod
 admisto fit tithymali lacte) sed longe magis an-
 tea narratis, item si non vehementer linguam ex-
 urat, id quod misti tithymali argumentum est.
 Natione autem Syriacum & Iudaeum deterri-
 ma habentur, grauiora, densa, erui farina & tithy-
 malo vitata. Succus drachmae unius aut quater-
 num obolorum potere haustus, ex aqua pura vel
 mulsa, per inferna bilem & pituita extrahit. Ad
 resoluendam alui binos obolos cum sesama, aliore
 semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris pur-
 gationis causa, succi tres oboli, cum duobus vera-
 tri nigri & aloes drachma una. Fiunt purgatorij
 sales, drachmis viginti succi scammoniae, in senos
 salis cyathos adiectis. Horum modus proportione
 virium: integer quidem, tria cochlearia: medius,
 duo: minimus, unum. Radicis drachma una aut
 altera purgat, cum ijs quae retulimus. Nonnulli de-
 coctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum
 hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadi-
 cis utili. Partus enecat succus, vuluae in lana sub-
 ditus: tubercula discutit cum melle aut oleo illi-
 tus:

ius: decocto in aceto peruncte lepræ abiguntur:
diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo per-
funduntur.

Chamelæa.

CAP. CLIII.

CHamelæa surculosa fruticat, ramis dodran-
talibus: folia oleæ similitudinem habent, Mezereon,
tenuiora & amara, quæ gustata linguam mor- Arabi mo-
dent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam re-
bilemque; folijs præsertim in catapotio demoratis:
nanque duæ absinthij partes, adiecta, chamelææ
una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia co-
guntur: ea autem in ventre non liquefcunt: siquidem
quotquot fuere demorata, regeruntur. Folijs cum mel-
le tritis sordida ulcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa.

CAP. CLIIII.

THymelæa est, quæ granum guidium, quod Granum
est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apo- Guidium.
linum vocant, quoniam satini lini frutex suapte
natura similitudinem referat. Virgas ædit per-
pulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitu-
dine: folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus,
viscosis, gummosisque; si mordeantur: flore
candido: fructu myrti in modum rotundo, qui in-
ter initia viret, & tandem rubescit: involucri fru-
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per
inferna bilem, pituitam, aquasque; detrahit, si vi-
ginti granorum pars interna bibatur: verum fan-
ces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in ruæ
acino dari debet, aut melle cocto obductum deuo-

tari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere convenit. Illitum acetabuli modo cum diluta vini portione, aquam extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelæe farina vix acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nasquitur in montibus & asperis. Hallucinantur, qui cognidum fructum esse chamelæe existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Sambucus.

CAP. CLV.

Sambuci duo genera: unum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, ternæ quaternæve, ex intervallis circa ramos exeunt, gravia odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacaminibus cauliculisq; circinatæ umbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus, Chamæactæ vocatur, Romanis ebulum, longe humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq; graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci: flore & acino eiusdem:
rad

radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem
 viriusque vis, & vsus exiccans, alio detrahens
 aquam, stomacho inutilis. Folia, olerum more co-
 quuntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Cau-
 les teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix
 in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiu-
 uat: prodest viperarum morsibus, eodem pota mo-
 do: vulnus emollit insidentium decocto, patefacit
 earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino
 poti eodem funguntur munere: denigrant capillos
 illiti. Folia, si pratenera ac mollia ex polenta illi-
 nantur, inflammationem mitigant: ambustis &
 canis morsibus illitu prosunt: ulcera quæ delu-
 scunt in fistulâ, agglutinant: ijs qui podagra ten-
 tantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt il-
 lita folia.

PICHOCOMUM.

CAP. CLVI.

PIchocomon constat erucæ folijs, acrioribus,
 scabris & crassus: caule quadrangulo: flore
 ocymi: semine marrubij: radice nigra, aut palli-
 da, rotunda, exigui mali figura, terram redolente:
 inuenitur in saxosis locis. Semē grauiā somnia &
 tumultuosa facit, drachmæ instar potum: tumores
 discutit, illitum cum polenta, & spicula, udaeñosque
 corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula,
 panosque discutiunt. Radix eius in aqua mulsa duum
 drachmarum pondere, aluum soluit & bilem ex-
 trahit.

Apios.

CAP. CLVII.

Apios ramulos durs siue tres iunceos spargit,
 rubros, tenues, qui à terra parum attollun=
 tur: folijs rutæ, oblongioribus tamen & angu=
 * *Asphode-* stioribus, herbaceis: semine paruo, radice* *hastu-*
li. le regie, in formam pyri turbinata, rotundiore ta=
 men, succi ficcunda, intus habet corpus cædudum,
 extra cortices nigros. Superior pars eius vomie=
 tione bilẽ pituitasq; extrahit: inferior, per aluum:
 tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet
 eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agita=
 ia aqua, quod supernatat penna selectum, exic=
 catur. Purgat utraque parte is succus, sesquibos=
 lo potus.

Colocynthis.

CAP. CLVIII.

Coloquin-
tida offici-
nis.

Colocynthis sarmenta foliaq; satini cucume=
 ris emittit, per terram repentia, diuisa, fru=
 ctum in speciem mediocris pilæ conglomeratum,
 vehemener amarum: quem legere oportet, cum
 cæperit in pallidum colorem permutari. Medulla
 fructus purgatoriam vim habet, si quatuor obo=
 li cum aqua mulsæ, melle cocto, myrrha & nitro
 excipiantur, & cogantur in catapitium. Arefæ=
 ctæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt
 nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, &
 coli vitijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta,
 interdum etiam cruorem eliciant: fetus admotæ
 enecant: dentium dolorem tollit, si una repurge=
 tur & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat,
 hoc

hocq; iure decocti dentes colluantur: si aqua melle-
sa aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo
refrigescat, potius crassum humorem & strigmenta
alium detrahet: stomacho supra modum aduersatur:
subdita ex ea balano, alii excrementa eijciuntur.
Virentis succo vtilissimè ischiadici perfriantur.

Epithymum.

CAP. CLIX.

Epithymon, flos est ethymo duriore, satureiæ Aliud à no-
simili: capitula habet tenuia, & leuia, & in stro Epithy-
eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum mo-
melle detrahit pituitam bilem q; atram, per infer-
na. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis,
acetabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum
melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Cappa-
docia & Pamphylia gignitur.

Alypum.

CAP. CLX.

Alypon surculosa herba est, subrubra: graci-
libus ramulis: tenuibus folijs, flore molli, le-
ui, & copioso: radice betæ, tenui, referta acris suc-
co: semine epithymi: gignitur in maritimis, maxi-
mè Libyæ, quàm largissima: quanquã alibi quoq;
plurima prouenit. Semen atram bilem deijcit, si
mensura epithymo pari cum sale & aceto summa-
tur: verum interanea leniter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

CAP.

CLXI.

Empetron aliqui * phacoides vocant, nasci * Galenus
tur in montibus, & maritimis, salso gustu: prasoides.
sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur.

Bb 4

Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis sylvestris.

CAP. CLXII.

Vitis sylvestris sarmenta vitis modo praelonga emitit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensis solani, longioribus ac latioribus: muscoso flore, et capillaceo: fructus exiguis vuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruescunt radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hydropicis datur. Vuae eius, vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgant. Evanescentes viticulae, cibi gratia, sale conduntur.

Vitis alba.

CAP. CLXIII.

Officinis
Bryonia.

Vitis albam aliqui bryoniam vocant. Folijs, viticulis, pampinisque, sativam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea quos prope se nata sit frutices, suis claviculis complectitur: fructus rubens in vua dependet, quo coria pilis spoliuntur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam ciet. Folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur: itaque ulcerum phagedenis, gangraenis, chironijs putrentium tibi arum tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varosque, lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta Chia, & faenograceo. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usque dum liquecat: sugillata tollit, & redunias

com

commitit: inflammationes discutit illita ex vino: suppurationes rumpit: medicamento apte immiscetur, quod carnē exest: infracta ossa extrahit, trita et imposita. Datur comitialibus in potu drachmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdum subvertat: fixinarum locis apposita, partus secundasq; morantes trahit: cit urinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficile spirantibus, strangulatis oppressis, tussientibus, vulsis, ruptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto, tringinta diebus, consumit: illinitur ad eadem cum fico. Ad muliebres infessus decoquitur: siquidem vulvas purgat, sed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. Lactis abundantia facit succus eius, si cum tritico decocto sorbeatur.

Vitis nigra. CAP. CLXIII.

NIgra vitis, quam aliqui nigram bryoniam vocant, folia fert hederæ, smilaceis proxima, sed maiora: caules etiam cognatos: capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit: fructus racematim coherent, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt: radix foris nigra, intus buxæo colore. Viticulae quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiunt

Bb 5

tur: menses pellunt, urinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadē, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix.

CAP. CLXV.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex viro pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pennata, subgravi odore: radice per summa caespitum nigra, oblonga, filices multas fundente, substringente gustu: nascitur in montibus, & saxosis. Radix latus tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonie aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, allia prægustare debent. Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potus & illitus cum axungia vulneribus sagitta arundinea factus, est auxilio: cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronet: & contri, evanescens abibit arundo, quam obsepiciens multa filix in orbem cinxerit. Filix fœmina folijs est siliis, surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flavescent: aliquæ etiamnum rubræ inveniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: pota cum vino, drachmis tribus,

122

teretes tineas eijciunt: datæ feminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediuntur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur iumentorum ceruicibus medetur. Folia recentia, in oleribus coctæ manduntur, vt ventrem emolliant.

Filicula, siue polypodium.

CAP. CLXVI.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirri, ceu polyporū, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet: coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aqua mulse insparfa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quæ inter digitos sunt.

Dryopteris.

CAP. CLXVII.

Dryopteris nascitur in veterum roborum musco, filici similis, multo minore foliorum incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilotrū est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

Cni

Cnicus.

CAP. CLXVIII.

Officinis
Cartamus.

CNicus folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis olivæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsa, vel iure gallinacei aluum purgat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autem sunt ossule, quas placentulas vocant, adiectus succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decoctis, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor dividuntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

Mercurialis.

CAP. CLXIX.

LYNOXOSTIS, aliqui parthenion, alij hermubonion appellant: folijs constat ocymi, helxinæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multus: fructu foemina, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, parvo, rotundo, ceu binus testiculus unâ coherentibus: frutice dodrantali aut maiore. Utraque in oleribus manditur, ad aluum ciendam: cocta in aqua,
epo

epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere: ut feminae, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

Cynocrambe.

CAP. CLXX.

CYnia aut cynocrambe, cauliculum binum dodrantum altitudine emittit, mollem, subalbidum: folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitiis subalbida: semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulis pota, aluum cient: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquamq; detrahit.

Heliotropium.

CAP. CLXXI.

HELIOTROPIO magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpiuro ei nomen: & quomā folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfultus incuruatur ut scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fascicula manus plena, potu pituitam bilemq; per aluum extrahit: contra scorpionum ictus ex vino potum, & illitum prodest: ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartanas finire: tria verò, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilesq; & thymos, & epinyctidas exci-

cat.

cat. Folia infantium destillationibus, quas syrias
 seu vocant, podagris, luxatisq; utilissimè illinun=
 tur: menses cient: partus trita & imposita pellūt.
 Heliotropion paruum, nascitur in palustribus,
 iuxta lacus, folijs antedicto proximus, rotundiori=
 bus: semine, acrochordonum verrucarum modo,
 pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota,
 adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, la=
 tas tineas teretesq; excutit. Pensiles verrucas,
 quæ acrochordones vocantur, cum sale illi=
 ta tollit. Scorpioides herbula est, folijs
 paucis, semine caudæ scorpionis
 effigie. Illita scorpionum
 ictibus præsentat=
 neo est aux=
 xilio.


QVARTI LIBRI
 FINIS.

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE
Medicinali materia,

Liber V.

Icanne RVELLIO Sueßionensi
interprete.



Vperioribus quatuor libris, amississime Aree, tradidimus de aromatis, oleis, unguentis, & earundē lacrymis ac fructibus item animalibus, melle, iacte, adipe, ce=realibus, oleribus, necnon de omni radicū, herbarum, succorum, seminumq; ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de uinis et metallicis, à vite nostram commentationem auspicati.

Vitis vinifera.

CAP. I.

Folia vitium & triti capreoli, capitis dolores illitus mitigant, & inflammationem stomachi ardoremq; cum polenta: folia etiam per se, ut quæ refrigerent & adstringant, imponi solent. Potus eorū succus dysentericis, sanguinē excreantibus, stomachicis, & grauidarum malaciæ medetur. Eadē efficiūt madefacti in aqua capreoli & poti. Lacryma vitium, quæ veluti gummi in caudicibus concreuit, ex vino pota calculos pellit:

pellit: illita lichenus & psoras leprásque nitro prius perfrictas sanat: eadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet: maximeq; sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: qua & perunctæ verrucarum infor- micationes extrahuntur. Cuius sarmentorum & vinaceorum, detractis in sede condylomatis, & thymys, illitus ex aceto medetur: prodest luxa- tus & viperarum morsibus: contra lienis inflam- mationem illinitur, cum rosaceo & ruta & ace- to. Labrusca duorum generum est: alterius vua non maturescit, sed flore tenuis ænanthen nomina tam perducit. Altera ad frugem peruenit, par- uis acinus, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauiculae quibus repunt, vim habent cultæ viti similem.

Vua.

CAP. II.

VVæ recentes aluum turbât, & stomachum instant: innocentiores, quæ decerptæ diu pependere, (ideo quòd in eis copia humoris exicca- tur) vtilisq; sunt stomacho, ægrisq;, atque cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratæ sunt: aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excre- antibus conueniunt. Similesq;, quæ in musto fue- re. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis in- festant. At quæ solem prius passæ in aqua cœle- sti conduntur, minus vinosæ sunt, siti culosiss, ara- dentibus & longis febribus salubres. Reconditi
vin

vinacei inflammatis manibus, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, celiacos, & feminas fluxione vuluæ laborantes iuuat infusa: ad defeciones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent, stomacho utiles sunt: inspargitur farina tostorum, polenta modo, dysentericis, & celiacis, & scilicet stomacho. Vua passa alba adstringentior est: prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleus: & decocta in patinis cum melle, admixta milij ac hordei farina & ovo, valet ad purgandum caput: eiusdemq; gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina. Fauos, epimyelidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, et cum ruta imposita sanat: podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe.

CAP. III.

Oenanthe vocatur vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet sicili non picato, collectaq; substrato linteo, in umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho ac ciunde vrine utilis: aluum sistit, ac sanguinis excretaiones: contra fastidia, & acorem stomachi, sicca & illita efficax est: capitis doloribus tam viri-

Cc

dis, quàm sicca, ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agilopis, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat: passis miscetur, ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores, cum polline polente & vino illinitur. Cinis crematæ in testæ, candentibus prius, facit ad oculorum medicamenta: reducias & pterygia, abscedentes gingivas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium.

CAP. IIII.

Omphacion, succus est acerbæ vuæ, nonulim maturefcentis, è Thasia vite aut Aminæa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur semperq; quod cervici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscere: noctuq; à subdialibus locis in tectum referre: quandoquidem nocturni rores ipsum concreescere non sinunt. Eligendum est flavum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, vuam, ulcera oris, humida gingivarum vitia, purulentas aureis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera ulcera, nomasq; ex aceto. Dysenterici, & mulieribus fluxione vulvæ laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritiæ, & erosionibus angulorum convenit.

Bib

Bibitur ad receniē sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed paucō, & aequaliore est vtendum: valde siquidem exurit.

Vini natura.

CAP. V.

VIno vetere nervi leduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suavius est: quare cauendum ēs qui intestinae alicuius partis imbecillitatē sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouū inflat, aegrē coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate medium, viraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum egrorumq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò, crassum est, & concoctū difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, vīpote quod medium est, medias inter virunque vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vīna s: p:re distāt: siquidem dulce crassiss partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat: aluum & inueranea, vt mustum, turbat: sed minus inebriat. renibus, & vesicæ aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & cæteris fluxiones colibet, minusq; urinam expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur: si imstimulat, ner=

nos infestat, alio aptum, à valetudine se recollie-
 gentibus inutile. Passum, quod vuis sole siccatis
 in area, aut in sarmento torrefactus exprimitur,
 Creticum cognomine, aut pramnion, aut protro-
 pon: & sapa quæ fit musto igni decocto, Græci
 sirion aut hepsema appellant: nigra quidem, &
 quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & cor-
 pora multum alunt: candidum, tenuius: & heluo-
 la inter hæc media, medias sortiuntur vires. Om-
 nia tamen adstringunt, & pulsus reuocant: fa-
 ciunt aduersus venena, quæ exulcerando necant,
 ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicu-
 tas, meconium, pharicon, toxica & concretum in-
 grumos lac: item contra renum, ac vesicæ pruri-
 tus, rosiones, exulcerationesq;. Inflant tamen, &
 stomacho aduersantur. Priuatim, prodest me-
 lampsihium, si venter rheumatismum sentiat.
 Album, magis cæteris emollit alium. Gipso con-
 ditum nervus officit, caput aggrauat, & incen-
 dit, ac vesicæ aduersatur: contra venena cæte-
 ris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciunt, con-
 coquunt: sanguinem excreantibus inimica. Quæ
 verò aparachyta vocant, vt quæ admistam sa-
 pam recipiunt, caput implent, temulentiam gi-
 gunt, ægrius in halitum expirant, stomachum
 malè habent. Inter Italica vina Falernum prin-
 cipem locum obtinet, quod inueteratum perquam
 facile coquitur, pulsus exuscitat, alium adtrin-
 git, stomacho utile: sed vesicæ nocet, atque ijs qui
 visis

visus hebetudinem sentiunt, & ad potus cre-
bros minimè idoneum. Albana crassioribus con-
stant partibus, dulcia: stomachum inflant, ven-
trem emolliunt (sed concoctionem non aequè ad-
iuuant,) & nervosa minus infestant: vetustate,
eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum,
cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus &
colorem alit: agrè tamen coquitur. Surrenti-
num, valde austerum est: quare intestinorum &
stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, ca-
put minus tentat: inueteratum suavius redditur,
& stomacho vtile. Adrianum & Mamertinum
in Sicilia aequè crassis partibus gignuntur: mo-
dicè adstringunt, & ocysimè inueterantur, mi-
nusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Pa-
rætypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odo-
ratum ac tenuius est: quare liberaliter epotum
fallit, diu servat ebrietatem, & soporem adfert.
Istriticum Parætypiano simile est, sed urinam ve-
hementius pellit. Chium tamen antedictis mol-
lius, & aptum potui est: bene alit, & minus ine-
briat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis
vile. Lesbium facile membra subit, Chio leuius,
& alio idoneum. Ephesium eandem vim habet,
quod Phygelites nominatur: verum Asianum è
Imolo monte, Mesogites appellatum, capitis do-
lores ciet, & nervos ledit. Cum verò & Cla-
xomenium, quoniam multam sibi maris aquam
vendicant, facile corrumpuntur: flatu movent,

alium turbant, nervis officiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac syce-
rum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in
membra distribuitur, stomachum adiuuat, appe-
tentiam ciborum inuat, vires alit, ac robur au-
get: somnum conciliat, & commendat colorem. Po-
tium liberalius auxilio est contra assumptam ci-
cutam, coriandrum, pharicum, tixiam, meconium,
argenti spumam, taxum, aconita, fungosve: con-
tra serpentium morsus, & omnium ictus quæ re-
frigerando necant, aut stomachum in vomitiones
effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq;
præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolu-
tionē, & si venter aut interanea rheumatismum
sentiant. Conveniunt sudatoribus, & quibus con-
pus immodico sudore digeritur, maximè alba, ve-
tera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulce-
scunt, renibus ac vesicæ accommodatiora reddun-
tur: vulneribus, inflammationibusq; in succida la-
na imponuntur: tetra ulcera, & phagedænica, &
fluxionibus obnoxia, cōmodè persunduntur. Quæ
marinam non receperunt, austera & alba, ad sa-
norum victus usurpantur. In his præstant Itali-
ca, Falernum, Surrentinam, Cecubum, Signi-
num, & permulta Campaniæ, & Parælypi-
num ab Adriatico sinu, & Siculum quod Ma-
mertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Les-
bium, & Phygelites ex Epheso. Crassa verò &
nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem
par

pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius urinā ciunt, & dolores capitis mouent, nervusq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tempore anni, & cōsuetudine, & qualitate vini definatur. Non sitire, & modicè cibos proliu, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximè assidua: siquidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maximè post aquæ prius, utilis: nāque modo quodam ex alto euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicuius gratia factæ temulentiae remedium affert frigida. Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acriua, paulò ante maturitatē decerpita, triduo aut quatrinduo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadis insolatur. Vim adstringendi habet: prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus: item prægnantium malacie, & cruidis: in pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam dewicriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini

metretæ extractæ fuerint: calcalis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs, post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annu vtendum: etenim celeriter exolescit. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare: item à longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, loræ vires habens, hoc modo: Pares aquæ, & musti mensuræ coquantur molli igne, donec absumatur aqua: quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato vase reconditur. Alij marine, & cœlestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri viti nigrum adstringit: prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum melitites.

CAP. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt: namq; aluum leuiter emollit, vrinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs: odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso quod fit è vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque cōgios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho. Cortinis magnis, quò magis

magis ad effervesendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsū. CAP. VII.

Mulsū ē vetere vino austeroq; , & bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum venit. Vetus, corpus alit: media ætate, alio prodest, urinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi aviditatem reuocat. Fit mulsū duabus vini metretis, admixta una mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum mellis adiiciunt: & ubi ferbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsā. CAP. VIII.

Aqua mulsā easdem quas mulsū vires possidet. Cruda utimur, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: ut ijs qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillus, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere microsphyctos, tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Iam paratum conlitiūq; , quod aliqui hydromeli propriè vocant, media ætate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lora prodest. Inueterati tamen

usus damnatur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, duabus pluuia aquae veteris ad unam mellis partem additis, & insolatus. Alij fontanam aquam adijciunt, ad tertias partes decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit: aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxiū est, quoniam plurimam ceraginis sibi vendicat.

Aqua. CAP. IX.

DE aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiares naturas, cōlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quae ne minimo quidem tempore in praecordijs commoratur: ad haec, quae & facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris: stomacho aduersatur (aluum enim conturbat) pituitam expellit. Si verò calida ad fons adhibeatur, elicit & discutit: nervorum vitijs, & perniciis, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmati ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmati. Ad mouendas deiectiones tepescētia insinditur & ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lentes, & mammæ rigentes

res, foueri utile est: liuores folu discutit: ad re-
 nenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem
 adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpio-
 num, phalangiorū, aspidumq;: etiam si quis in ca-
 lidam descendat, auxiliatur. Et malo habitus con-
 fectis iam diu corporibus, nervisq; , balneæ ex ea
 utiles: hydropicos, capitis dolores, aurium gra-
 uitates, feruentis vapor lenat. Syncera, & sine
 potabilis aquæ mistione reposita, virus deponit.
 Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant.
 Datur ad purganda corpora per sese, aut ex po-
 sca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectione-
 nem, dant gallinæ aut piscium inscula, ad do-
 mandam morsus acrimoniam.

Thalassiomeli.

CAP. X.

Quod thalassiomeli vocatur, vehementer pur-
 gare cōstat. Temperatur autem equis por-
 tionibus maris, mellis, & imbris ex
 alto, defecatis, & picato vase per Canis æstus in-
 solatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulis mel-
 lis adiiciunt, & vase condunt: huiusmodi mode-
 ratius est aqua marina & mitius.

Acetum.

CAP. XI.

Acetum refrigerat, & adstringit: stoma-
 cho utile, & appetentiam excitat: erūpen-
 tem vndecunq; sanguinem, potu in se sive sistit:
 prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruen-
 tus vulneribus inditur & inflammationes arcet,
 in succidis lanis aut spongia impositum: reprimat
 proc.

procidentia sedis, vuluæq; uem abscedentes gingi-
uas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines,
pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est: phag-
gedenis vlcerum, nomasq; solu continuo cohibet:
podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: su-
gillationes rapit, cum melle illitum. Contra capi-
tis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut
spongia imponitur. Ad aquam inter cutem, gra-
uitatē aurium, & sonitus, sibilosq; feruētis vapor
proficit: instillatum quoque aurium vermes ne-
cat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta ace-
to spongia admoueat, & pruritus permulcet.
Contra venenatos serpentium ictus, qui refrige-
rando nocent, calidum commodè fouetur: & frigi-
dum, ijs quæ exurens virus ei aculantur. Calidum
potum, atque vomitionibus redditum, aduersus o-
mnia venena efficax est, præsertim contra meco-
nium, & haustam cicutam, conglobatum in ven-
tre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, tax-
umq; cum sale. Haustu voratas hirudines, si sor-
beatur, eijcit: tussim veterem mitigat, & recens-
tem lacepsit. In orthopnœa calidum commodè sor-
betur, gutturu fluxiones gargarizatum inhibet,
anginis & vuæ procidenti conuenit: contra den-
tium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

A Cetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc
modo temperatur: Aceti heminas quinque,
salis

salis marini pondo, mellis minas decem, aqua sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atque ubi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ quam sepa vocant, haustum meconium, ixiámve, auxilio est. Anginus vtiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

Acida muria, quam Græci oxalinen vocant, contra nomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur, & prociduam sedem reprimat: dysentericis, si nomas sentiant, infunditur: oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat: surfures & manantia capitis ulcera exterget.

Thymoxaline. CAP. XIII.

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores, atrosq; trahit. Hoc modo faciliatur: Thymi triti acetabulum, salis idem modus, rutæ, pulegij, polentæ, singulorum exiguae portiones in vas conijciuntur, aqua terni sextarij, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito luteo subdio madescunt.

Scil

Scillinum acetum. CAP. XV.

Scillinum acetum hoc modo fit : Scilla , quæ candida fuerit , expurgata conciditur , traiecitq; lino segmēta modicis intervallis , ne se cōtingant , siccantur in vmbra quadraginta diebus : minima eorū in aceti boni sextarios duodecim immergitur , & vase diligenter operio septenis diebus in sole madescit : post eum numerum dierum scilla eximitur , & expressa abijcitur : defacatum acetum transfunditur , & repmutur . Aliqui scillæ minam , quinque aceti sextarijs miscunt . Alij citra exiccationem repurgantes , parem mensuram adijciunt , & senis mensibus macerari patiuntur . Id multo magis humorum lentitias digerit : gingivas humore prægnantes collutione stringit firmatq; , & motos dentes stabilit : purredines oris , & graues habitus tollit : durat fauces sorbitione , & callosas facit : vocem expedit , & lymphidam canoramq; reddit . Datur stomachicis , ægrè cibum concoquentibus , melancholicis , comitialibus , vertiginosis , mente captis : item viuarum strangulationibus , lienis incremento laborantibus , ischiadicisq; . Imbecillos admodum recreat : corpus sanum reddit , & bonum colorem præstat : oculorum aciem exacuit : tarditatem quoque aurium infusione purgat . In summa , ad omnia efficax . Cauendum tamen in intestinis exulcerationibus , in capitis dolore , aut nervorum vitijs . Datur quotidie ieiunus sorbendum , inter initia exiguum , paulatim ad

adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos
dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XVI.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vi
dictum est, scillam, & sole siccatam cōtunditō
to, minam eius tenui cribro incernito, & linteo
raro illigatam, in vicanos sextarios musti recen-
tis ac boni demergito: vbi trimestri spatio ma-
duerit, elutriatum vinum, obstructo diligēter va-
se, recondito. Licet quique sic humida scilla vi:
In orbiculis, rari modo, dissectam duplicato pon-
dere, quadraginta diebus insolari oportet, & val-
de inueterascere. Alia parandi ratio: Scille disse-
cte & repurgate res minas, in Italicam meire-
tam musti demittito, & senos menses in vase ob-
structo macerari sinuto: post id tempus defecatu
& excolatum vinum recondito. Vtile est contra
cruditates, & ciborum corruptiones: nem is qui
reuomunt cibum, et si pituita in ventre, aut stoma-
cho coierit. Prodest lienosis, malè habitus corpori-
bus, aque inter cutem, regio morbo, difficili vri-
ne, torminosi, inflationibus, resolutioni nervo-
rum, horroribus longis, vertiginosis, & vulsis.
Menses pellit, minimeq; nervos infestat. Hoc vi-
num vetustate fit melius. Cauēdus in febre vsus,
aut si interanea vlcus sentiant.

Marina vina. CAP. XVII.

Marina variè faciuntur: Aliqui enim
statim quum decerpta sunt ruæ, aquam
mar

maris admiscunt. Alij in area vvas sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius vvas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas exprimunt: id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint: aluum subducunt: prosunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex Aminæis vvas fiunt, caput tentat, stomacho aduersantur, flatu creat. Verum quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videamur, quod ad eorum rationem attinet. Sunt autem quedam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in vsus: uti quæ ex cotoneis, malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

CYdonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemplis seminibus, frustatim rapi modo sciuntur, & duodecim minarum podo, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defæcatum vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum tusorum pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria,

ric, hepaticis, renum vitijs, & urinae difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quam plurimum mellis, quo penitus demersa contegantur, coniunguntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

Hydromelum.

CAP. XIX.

Fit hydromelon duabus mensuris aque coctæ, & sub Caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Onphacomelites.

CAP. XX.

Onphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerbæ vix adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes mellis optimi, despumati singulæ partes addiuntur: & insolatur in vasa transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet stomachicis cæliacisq; conuenit. Vsus post annum est.

Apijtes.

CAP. XXI.

Fit & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apijtes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringunt: stomacho utilia sunt, atque intestinis fluxiones cohibent.

Foenanthinum. CAP. XXII.

Fit è feraci vite syluestri, quod vocatur anæ-

Dd

thinum: Sicci flores minis duabus musti cado
macerati, post triginta dies mutantur, mox
colatum vinum recoditur. Facit aduersus stoma-
chi imbecillitatem, cibi fastidia, celiacos, & dy-
sentericos.

Rhœtes.

CAP. XXIII.

Fit è punicis malis maturis quod rhœten no-
minant, succo expresso ab acinis eorum, qui-
bus lignosus nucleus abest, apyrena vocant, ac
decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est con-
tra fluxiones internas, & febrim cum alui pro-
fluuio exortam: stomacho vtile: adstringit aluum,
& urinam mouet.

Rhodites.

CAP. XXIII.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tussarumq;
minam linteolo deligatâ in sextarios octo
musti demergito: & post tres menses defecatum
vinum transfundens, recodito. Vtile ijs qui febrim ca-
rent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo
potum, & contra humidus aluus, & dysenterias.
Fit quoq; ex succo rosarum, addito melle, quod rho-
domeli vocant, quod arteria scabritijs conuenit.

Myrtites.

CAP. XXV.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem
excefferint, tussis, & organo expressis. Ali-
qui ad tertias coquunt. Alij baccis prius sole tor-
rent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas
aque heminas adijciunt, & vini veteris parem
modum postea exprimunt, & seruant. Magnope-
re

re adstringit: stomacho viile: fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas vlcerationes, & profluvia: denigrat capillos.

Myrsinites.

CAP. XXVI.

MYrsinites sic tēperatur: Rami nigre myrti cum suis bacis & folijs tuss, decem minarum pondo, in tribus musti congrjs feruescunt, donec duo supersint, aut ceriè dimidiū: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra furfures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aures efficax est: sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

CAP. XXVII.

Lentiscinum similiter vt myrsinites tēperatur, nec secus terebinthinum. Nanque bacciferi eorū rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, vesicæ, & stomachi, & sanguinis profluvio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia: solum ad cicatricem perducunt: fluxiones vuluæ ac sedis, in se sione cohibent.

Palmeum vinum. CAP. XXVIII.

Palmulas maturas, quas vocant chydæas, in vrceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obstratum, & quadragenis sextarijs ternos aque congios infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post de-

Dd 2

cem dies detracto ab ariditate linteo assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficax stomachicis, coeliacis, sanguinem expuentibus convenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoque faciunt, quod tandem acore vitatur.

Catorchites.

CAP. XXIX.

CAtorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem humoris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ quæ chelidoniæ aut phœnicæ appellatur, præsertim nigrae maceratur, uti diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in qua vinacea maduerint infunditur: simili modo intercedente spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est: flatus gignit, stomacho adversatur, fastidium parit, alio tamen prodest, urinam ciet, menses trahit, lactis ubertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam Zylion appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muriæ amphoram quod non facile vitatur, & alio idoneum fore censerent. Alij thymum & feniculum imo subijciunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vis expleuerint. Fit & sycomoræ eodem modo vinum, sed in acetum acre

de 2

degenerat: quoniam non ita praeualet vis eorum,
vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. CAP. XXX.

Resinatum vinum populatim facilius solet:
copiosum in Galatia: quoniam vinum illic
coacescat, vna nō maturescendo, ob calis algorem,
nisi picea resina temperetur. Resina autem cum
cortice tunditur, & amphorae dimidiata hemina
permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, sepa-
rantes resinam: alij relinquunt. Haec vna vetusta-
te dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & vertigi-
nes faciunt: concoctionem tamen adiuvant, & vris
nam cient: tussientibus, ac destillatione vexatis
conueniunt item celiacis, dysentericis, & hydro-
picis, & sceminis fluxione vulvae laborantibus: al-
tis exulcerationibus infunditur. In hoc autem ge-
nere nigricans magis albo constringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

Strobilites sit maceratis in musto nucibus pi-
neis, recentibus, fractisq; praebetq; resinati ef-
fectus. Si quis madefactus nuces pini musto de-
coquat, potum assatum conuenit ijs qui tabitudi-
ne conficiuntur.

Cedrinum vinum. CAP. XXXII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, lauri-
num, pineum, aut abiegnum, simili ratione
fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructu adunt,
aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet,
vti consudent, congioq; vini minam vnam permi-

scere, & post duos menses transfundere, & antequam recondantur, insolare. Factitiorum vinorum vasa impleri debent: namque non plenus vas, vina in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina, recte valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoque ex fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum libra: diebus quadraginta insolari debet, & defecatum in vasa transferri.

Fit etiam vinum ex baccis umperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem valens. Cedrites hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussi antiquae utile sine febre, pectoris laterumque doloribus, torminibus, ventris & interaneorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus vulvae causariis, hydropicisque: facit aduersus ventris tineaes & horrores: contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIII.

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primam marina aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & sincera maris aqua defluat, mox aqua dulci proluenda: congys octo musti, vncia picis una aut altera adijcitur: ubi efferverit & consiterit, in vasa diffundit

ditur. Hoc genus vini excoctificat, concoquit, purgat, abstergit: utile doloribus pectoris, alui, iocine ris, lienis et viduae, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in alio recedentibus, tussi, suspirijs, coctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositum.

Absinthites.

CAP. XXXIIII.

Absinthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Italiae rum amphorarum, admixtam absinthij Pontici libram decoquant ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conqueuerit, defecant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tussamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassiae, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarum singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & turbidantes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt: postea defecatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadum, Celticæ nardi drachmas quatuordecim, & absinthij drachmas quadraginta, linteo involutas: & post quadragesimum diem elutriant. Alij in senos sextarios musti, absinthij libram, & siccae pini resinae sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stom.

Dd 4

cho: vrinam cit: tardam concoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renū vitis auxiliatur: fastidia discutit: is prodest quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam precordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; vētris tineas, & remoratos menses: contra hausta ixiæ venena quā plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites.

CAP. XXXV.

HYSSOPITES ē Cilicio hyssopo maximè laudatur, sitq; similiter, foliorum hyssopi tu-
 forum libra in amphoram musti coniecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis, folia inuoluntur, ut degravatus pondusculo fasciculus sidat: vinum post quadraginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus, & horroribus februm circuitu repetentibus auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis facta.

CAP.

XXXVI.

SIMILI modo chamædryites fieri solet. Excal-
 facit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs, sex stæchadis minam addere oportet. Cras-
 sitiem, inflationes, laterū, neruorumq; cruciatu, & perfrictiones discutit: comitialibus commodè
 dat

datur, cum pyrethro & sagapeno. Fit ad eadem acetum è stachade herba, ut paulò ante diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum è betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa inieraneorum vitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in vniuersum dicatur, factitia vina, sibi: misturarum vires adsciscunt: quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorum vires coniectura quadam consequi: verum tamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum è betonica acetum, ad eadem vitia vtile. Tragoriganites fit quaternis tragorigani drachmis liueolo colligatus, in quaternos musti sextarios coniectus, & post tertium mensem transfusus. Prodest torminibus; vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discurfationi, agris concoctionibus. Enapis fit vinum, nomine bunites, drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Dictamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc

Dd 5

vinum pectoris vitijs, & omnibus quibus mar-
bium. Thymi tusi & cribrati uncias ceterum linte-
o colligatas, in amphoram musti adijcito. Valet con-
tra egras coctiones, fistidia, dysenteriam, nervo-
rum & prae cordiorum dolores, hybernos algores,
& venenata animalia, quorum morsum frigus
insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è sa-
tureia vinum fit, quod eadem quæ thymites præ-
stat. Sic quoque origanites ex heracleotico origano
conficitur similiter cum supradicto. Facit eadem
quæ thymites. E calamintha, pulegio, & abroto-
no vina sunt eodem quo thymites modo. prosunt
stomachicis, cibum fastidientibus, & regio mor-
bo: quod urinam moueant. Fit item è conyza vinum,
contra venenata ante alia efficax.

Aromatites.

CAP. XXXVII.

Aromatites ita fit: Palma, aspalati, calami,
nardi gallici, singulorum quatuor sextarios
sumito: postquam contriueris, passo subigito, coa-
ctis ingentibus offis & in sextarios duodecim au-
steri musti deiectis, operculato vase, quadragin-
ta diebus quiescere finito: deinde ubi fece expur-
gatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Cala-
mi uncia, pluri drachmæ septem, costi drach-
mæ duæ, nardi syriaci drachmæ sex, casti uncia,
croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quin-
que, asari drachmæ quatuor: omnia simul trita
& linteo colligata in cadum musti demerguntur,
& postquam vinum deferbuerit, transfunditur.

Fac

Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores: difficili vrina, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita crassitie extenuat: colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicae vijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XXXVIII.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit: Myrrhae duae drachmae, piperis candidi drachma una, iridis drachmae sex, anisi drachmae tres: omnia plenius iusa & lineolo inuoluta in sex vini sextarios coquuntur: vinum post triduum colatur, & in lagenam reconditur. Datur post deambulationem, meraculum, cyathi unus mensura. Fit quoque nectarites ex helenio herba: Radice sicca pondo quinque drachmarum lineolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitia: urinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; vinum facitatur, hac ratione: Singulorum selibra in binos musti congios mittito, post menses duos colato. Datur cyathus unus cum tribus aquae. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, regium morbum, & vrinae difficultatem: prodest stomachicis, atque ijs quos palior decolorat. Alij vnciam, aut sextantiem acori, & Celticae nardi quadrantem, in musti amphora

rarum

ram adiiciunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinam ciet hydropicus, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit. Radici syluestris nardi recentis & trita cribrataq; bessem, in congiuum musti conycito, duos menses quiescere finito. Utile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta.

CAP. XXXIX.

Radici dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & vuluæ menses pellit, ructus ciet, & urinam: prodest tussi, ruptis, vulsisq; Saluæ vnciam in musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos menses. Panacis vnciam in musti congiuum mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, contusis, orthopnoæ: lenis crassitiem extenuat: contra tormina, coxendicum dolores, efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur. Vrina ex acoro & dulci radice cōsimili modo sunt. Oportet enim singulorum vncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, &
uri

urinam mouent. Seminus apij recentis, maturi
& cribrati vncia nouē in linteis colligata in muc-
sti amphoram demittantur. Appetitum excitat:
stomachicis, & difficili urinae auxiliatur: facie-
les spiritus facit. Ex feniculo, anetho, & pe-
troselino, vina eodem modo sunt, & ad eadem ef-
ficacia. Fit & è flore salis vinum, multo ad
purgandum efficacius, quàm vinum aqua marie-
na temperatum. Fauces, vesicam, renes, & sto-
machum infestat: quare neque in secunda, neque
aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum
quod philhorion vocāt, quoniam partus necat, &
abortus facit, veratro aut scammonia, aut sylue-
stri cucumere, iuxta radices vitium sato: siquidem
vites sibi illorum vires adsciscunt. Id vinum par-
tus enecat: datur ieiunis mulieribus, quæ antè vo-
muerunt, cyathorū octo mensura, dilutum. Ra-
morum thymeleæ cum suis folijs & fructu trigin-
ta drachmas mittito in congios tres musti, & le-
ui igne coquito, donec cōgij duo supersint, defoca-
tumq; recondito. Aquosa purgat excrementa, &
lienem absunit. Chamelea dum floret, cum fo-
lijs tusa & cribrata decē drachmarū pondere, in
musti congiū additur. Post duos menses vi-
num in vas transfertur. Aquæ inter cutem, he-
paticis, & lassitudine contractis, efficax est:
item mulieribus quæ à partu ægrè purgantur.

Chamapityinum simili modo fit, ad eadem
conueniens: urinam quoque ciet. Librum radices

man

mandragoræ concidito, segmenta lino traicito, quod selibram æquat in musti cadum demittito, ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Media portio, hemine dimidium bibitur, passo in duplum addito. Aiunt heminam vini congio mustam, potu soporem adferre: cyathus unus cum sextario vini potus, enecat: mediocris vsus eius, doloris sensum auferi: fluxiones incrassat: olfactu, potuq; , & cum inditur idem præstat. In congium musti aqua marina dilui, drachmas duodecim nigri veratri triti in linteo mundo, mittito: dumq; efferbuerit, in marinæ aquæ congios quatuordecim aut quindecim, ubi plenuscule fregeris, inijcito: post aliquot dies colato, & vitior. Dato cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad aluum soluendam, ijs qui euomuerunt à cæna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, iunci odorati uncias duodecim, spicæ Syriacæ uncias tredecim, cribratas, & linteo colligatas in septem vini Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato: dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decoctæ marinæ aquæ ex alto petiti sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die, quàm madefeceris, colato, & vitior. Alia ratio: Veratri drachmas duodecim, & aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs diebus quinsideris macerato, mox colato: & semestri exacto, vitior. Id vini genus abortus facit, & partus necat. Aut vias
in

in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congius duo decim) & gypsum in vinum mittito pondo drachmarum viginti, & bi duo residere simulo, conijcito veratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrhæ & croci singulorum drachmam, inuoluës linteoli diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis heminas treis aut duos dilutas. Purgat à partu, & abortu feminas: factus extrahit, cōtra strangulatus vidue efficax. Scammonites sic fit: Radici scāmomiæ per messes effosse, trite, & linteo colligatæ drachmas quinq; in musti congium mittito, addies triginta. Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Metallica omnia, & primum Cadmia.

CAP. XL.

EX cadmiæ generibus optima est Cypria, Ebotryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinās, racemosa facie, colore spodi, quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quadam etiam placodes, id est, crustosa dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitæ appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet,

terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryus nomine, & onychitis, utiles: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodit. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, cana explere, sordes expurgare, exicare, corporis meatus infarcire, excrescentia in carne coercere, crustas creare, & ulcera, quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus camerisq; fornacum inherente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia connexæ & cōcameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohereant, & inibi detineantur: quæ cum spissius insident, in corpus concrescunt, & modo genus unum eius, modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte, qui Solis incumbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen est: in quo etiam monte quedam quasi venæ chalcitis, misyos, soeos, melutieræ, cœrulei, chrysocolle, atramenti sistorij, diphrygusq; inveniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione: qualis inuenitur, & apud Cumas lapis, nullam suam vim ostendens. In eo deprehenduntur, quod sunt cadmia leuiorēs, nullumq; alienum mandentibus

cap

saporem exhibent: commanducatus item lapis, dentes offendit: cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumeto: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumū igni similem ei aculatur: cadmia verò quiesca manet, fuliginemq; luteo colore aut aereo splendens expuit, vario xonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet. sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquam comparanda erariæ. Vritur Cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoreis, modo bullet: mox extinguitur vino Aminxo, quæ ad emplastra preparatur: sed quæ ad psoriarum medicamenta preparatur, aceto. Alij hoc modo existā conterunt in vino, rursusq; fictili crudo torrent, donec pumicosa videatur: iterumq; tritam ex vino, tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinēs: hac spodiū vice vitiur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx.

CAP. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodos nigricat, & ple-

E e

runque ponderosior est, palearum pilorumque plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab aeriarii officinarij pavimentis & fornacibus eueritur: pompholyx verò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auras evolare possit. Cuius duo fluxerunt genera unum ad aeris colorem vergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamque levitatem natum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiundo aere, fabri praestantiores facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insparserint. Namque tenuissima favilla, quae effertur, in pompholygen coit. Ceterum pompholyx non ex aeris modo materia, & fibrili industria facitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faciunde ratio haec est: In domo gemina contignatione operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat: domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipendam follis naurem ostium mediocre habeat, pro exitu ingressuque; artificis fabricatum domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camina succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit à locis supra infurnibulum extructis: idem negotium obit inferne artificis minister, simulque carbones adijcit, usque diu indita cadmiae copia prorsus absumatur. Itaque egesta
sufficit

suffitu tenuis pars, & leuis materie in summam domum euolat, & parietibus, tectis, furniciq; adherescit: conflatum autem inde corpus, interinitia erumpentibus, aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementū capessens, glomusculis vellerum simile redditur. Ponderosius autē in ima loca se recipit: sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento coheret. Quid tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcitia in aceruatione refertur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cæni horrido: & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, aëreum colorem contrahit. Antedictis autē notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouilo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus, quod facile cognitu fuerit, quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antè dicta sunt. Pompholygem in cōmune ita lauare oportet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrē contineat, & huc atque illic fasciculum deferēs, immergito: ita enim limosa pars eius ac vilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. Postea residere sinans, aquam cum cinere solis incernito, & nouam infus

dens, agitato, & effundito: malata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recodito. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur: deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili novo ad vsus recondunt. Quod verò resedit, sensim cribratum, in aliud vas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat: rursus lapidosa sidere patimur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenae expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur vino Chio marina aqua diluto, modis quos suprà diximus: & ita redditur adstringentior, quàm aqua elota. Vis pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur, qua leniter crustas obducunt. Quid si spodon torreretur libet, diligenter tritam, & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; novo, subiectis leuibus

bus prunis, orbiculos continuo versabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: verum post Cyprium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus, & baccis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habentes, vruntur fornacibus, donec siglinum percoquatur: iterum in fictile aliud crudum transferuntur, quod ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoque fit è termite syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut galis, aut laceratis lincolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubi folijs, vel è buxi coma, vel pseudocypere cum flore. Alij ficulneas frödes in sole antea siccatas, eodem modo parant: alij taurinum gluten: alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas: quæ omnia in spodij vicem vsurpantur.

Aes vstum.

CAP. XLII.

AEs vstum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarim imutetur: nigrum verò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clavis solutarum nauium, fictili crudo compositis:

Le 3

subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparsis, fictile, circumluto sigulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, vrunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximum in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimit, extenuat, attrahit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, ex crescentia in carne consumit, nomas cohibet, vomitus ciet, cum hydromelue potum, aut cum melle delinctum, illitumve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercesve quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecilliozem, habet.

Flos æris.

CAP. XLIII.

Flos æris, quem nonnulli clauorum veterum psegma quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, nilij effigie, & numero, breuis, ponderosus, modicè splendens, atque cōstringens, qui delimitam æris scobem non recepit, qua sepe adulteratur. Sed id facilièprehenditur, cum dentium illi-

sio

*In dilantur ramenta. Fit autem, cum es forna-
cibus fustum, in receptacula delabitur, per cola si-
stularum ad ea pertinentiū: tum huic negotio ad-
dicti ministri, sordes expurgantes, aquam claris-
simam infundunt, refrigerandi proposito: itaque
repentino concretu, ac addensatione, velut expui-
tur, & erumpit antedictus flos. Adstringit, &
excrecentia coërcet: ossum oculis caligine emen-
dat, sed magnopere mordet. Quaternum obolo-
rum pondere datus, crassam humorem extrahit:
carnis narium. & sedis vitia absunt: eruptiones
papularum cum vino cohibet. Candidus contra
diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per
fistulam flatu impellitur: ruam, tonsillasq; repri-
mit, farina eius cum melle admota.*

Squamma æris.

CAP. XLIII.

*S*quamma æris excussa ex Cypris officina-
rum clauis, crassa quidem ipsa præstantior
que helitis, id est clauaris, nominatur. sed ex vilē
promiscuoq; ære, aut candido, vitiosa intelligitur:
quam, utpote tenuem, & inuolidam, damnamus,
maximè approbantes crassam, rufam, præsertim
si aceti respersu æruginem contrahat. Vim habet
adstrictioriam, extenuantem, reprimentem, &
erodentem: nomus coërcet, vlcera ad cicatricem
perducit: pota ex aqua mulsa, aquam trahit.
Aliqui farina subactam, dant in catapotto. Adli-
tur ad oculorum medicamenta, quod genarū sca-
britiam absunt, & fluxiones exiccat. Lauatur

E e 4

hoc modo : Sicca æris squamma expurgata sex libra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousque pessum terit : abijcitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina celestis imbris adjicitur, & dislenta manu, squamma, quasi destringenda sit, vehementer conficitur : dumq; lentorem emittere coeperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo valide : squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur : quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro ficta, excipitur. Hoc est enim velut flos squammæ, valens viribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq; quod superest, Lavatur donec nullam prorsus lentitiam excernat, & linteo apertum biduo conquiescere sinitur, effusiq; extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cademiam lavant, & reponunt. Squammæ ex acie aut mucronibus decussa, quam vocant stomoma, eadem vis. Lavatur modo simili, & reconditur : sed ad moliendam alui deiectionem, inefficacior est.

Aerugo rasilis.

CAP. XLV.

Aerugo rasa fit his modis : In cadum, aut aliud cõsimile vas acetũ quàm acerrimum infunditur : superponitur inde inuersum æneum vas, præsertim concameratum : sin minus, planum : sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris, operculo : decimum post diem insidens ærugo deraditur.

Ant

Aut aeris lamina in cadis super acetum ita suspen-
ditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies ra-
ditur. Aut massala aeris, aut lamina una pluresve,
vinaceis non recentibus, sed iam acescentibus con-
duntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex
delimata aeris scobe aeruginem facere licet, nec non
è laminis, quibus bractea auri conclusæ malleo dis-
cuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut
quater verset, donec aeruginem contrahant. Tra-
dunt aeruginem in Cypris metallis gigni, lapidi-
bus quibusdam nonnihil aeris habentibus, quibus
ærugo efflorescit: adduntq; per Caniculæ æstus è
quodam specu manare: sed illam paucam & opti-
mam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam
quidè, & boni coloris, sed vitiosam, quòd lapides
multos collegerit. Pluribus autè modis adulterât:
aliqui pumice admixto, alij marmore, alij atra-
mento sutorio. Sed deprehendemus pumicem aut
marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto,
æruginis portiunculam altero atterimus: si quidem
eam diffundi constat, marmoris autem pumicisq;
partes coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione
crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin
& dentium appressu: si quidem sincera cedit,
levis, & sine asperitate. Atramentum verò suto-
rium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lami-
na, adulterata ærugine illinatur, & fermenti
cinere aut carbonibus incalescat alterutrum, mu-
tabitur, rubescetq; id quod atramentum sutorium

acceperit : quod id vñtum suapte natura talem
 sortitur colorem. Aeruginis, quam vocant scole-
 ciam, duo sunt genera : quedam fossilis est, altera
 factitia ad hunc modū : In mortario Cyprii æris
 dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cu-
 preo conterito, donec strigmenti crassitudinem
 imitetur: deinde aluminis rotundi drachmā vnā,
 cum salis fossilij, translucenis, aut marini quā
 albißimi, solidiq; aut certē cum nitri pari ponde-
 re terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sydu Ca-
 nicula, donec colorem æruginis contrahat, & con-
 cretu strigmentosum fiat : vbi autem se in vermi-
 culorum Rhodiacei similium speciem coigerit, re-
 condito. Efficax & valde boni coloris redditur, si
 duas partes vrine veteris cum vna aceti adiece-
 ris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui
 æruginem rasilem, quæ in apparatu non respon-
 dit, gummi misto digerant in formas, & ita ven-
 dant : quod genus, vt vitiosum, improbatur. Fit
 & quedam ærugo ab aurificibus, mortario &
 pistillo Cyprii æris, cum vrina pueri impubis, qua
 aurum ferruminant. Antedicta æruginum gene-
 ra, vñto æri omnino respondent, sed magis effectu
 valent. Sciendum fossilē scoleciā præstantissi-
 mam esse : derasam sequi : postremo loco facti-
 tiam. Mordacissima tamen est hæc, & magis
 adstringens. Aurificum autem ærugo rase respon-
 det. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,
 exsiccant : oculorum cicatrices emendant, lac-
 crym

erymas cicut, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem perducunt: callos & sordida vlcera purgant, cum melle coctæ: callum fistularum erodunt, cum amoniaco, collyrii modo in eas adactæ. Ad gingivarum autem excrecentias, & extuberantiam viles. Magnopere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ: verum post illitionem sponsia ex aqua calida locus fovendus est. Resina terebinthina exceptæ, cum are & nitro lepras abigunt. Vritur arugo, quancunq; velis, minutissimè fracta comminutaq; in sicili palina, flagrantibus prunis superposita: versaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam vrant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. CAP. XLVI.

Rubigo ferri restringit: sistit feminarum profluvia, admota, potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia, condylomatibus prodest, gingivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquave in quæ candens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadē potest quæ rubigo, sed inefficacius.

cus. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

Lotura plumbi sic fit: In mortariū plumbeum aquam inijciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crāssescat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato, aquam superfundēs, quo facilius quicquid est resolutū incerni possit. Hoc iterum facito, vsquedum satis tibi habuisse videatur. Vbi cōfederit, priore aqua effusa, novam adijciens, ut cadmiam lunato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quassitam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicā plumbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere cana, sistere oculorum fluxiones, & ulcerū excrecentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea quæ egrè cicatricem ducunt: & in totum spodiū effectus præbet, nisi quòd non obducit crustas. Syncerum plumbum affrictū, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

V Plumbum vstū. CAP. XLVIII.

Ritur plumbum sic: Super quàm tenuissi-

mas

mas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur
 inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interie-
 cto semper sulphure, usquedū vas expleueris, suc-
 cedito: flagrante autem plumbo, ferrea rude ver-
 sato, donec perfectē redigatur in cinerem, nihilq;
 ē plumbo non vstum hæserit: tum demum, ob-
 structis naribus, eximito alioquin halitus plum-
 bi noxius sentitur. Aut elimalam plumbi scobem
 in olla sulphure vrto. Alij laminas in fictili cru-
 do, vt dictum est, imponunt fornaci, aut foco, &
 circumluentes operculum, dato exili spiramento,
 vrunt. Alij pro sulphure cerussam aut hordeum
 inspargunt. Alij integras laminas imponentes,
 acri igne vtuntur, & rudicula ferrea cōtinuē mo-
 uent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis hu-
 iusmodi vstio, & si vehementius vratur, contra-
 hit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis
 placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum la-
 uatur vt cadmia, & reconditur. Eisdem effectus
 habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.
 Recrementum plumbi, quod scoriam vocant, opti-
 mum est, densum, fractu contumax, cerussam pla-
 nē representans, nihil plumboſi habens, quod ad
 luteum colorem accedit, & viiri splendorem imi-
 tatur. Eadem quæ plumbum exustum potest,
 sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infu-
 sa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lu-
 teum colorem duxit: idq; sepius, dum recremen-
 tum absumat. Dein vbi confederit crassamen-
 tum

tum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento vim habet, & eodem modo lauat. *siofa*

Stibium. CAP. XLIX.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedarum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi habens, friabile, quod sibi appellant, alij platyophthalmen. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, excrescētia in carne cohibere, ulcera ad cicatricē perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. Si sit & sanguinem è cerebri membrana profluentem: & ut in uniuersum dicatur, vis vsto plumbi similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. CAP. L.

Molybdæna optima est flaua, argentea spumæ amula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iocineris colorem trahit. *siofa*

tiosa est, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quedam fossilis, ad Sebastiam & Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flava. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur lavaturq; eodem modo. Miscetur convenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non convenit.

Argenti recrementum. CAP. LI.

Recrementum argenti quod scoriam vocant, aut helcysina, aut encauma, molybdæna vim habet: quare emplastris quæ phæis appellantur, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, utpote cum adstringat, extrahatq;.

Spuma argenti. CAP. LII.

Spuma argenti quedam gignitur ex arena, quam molybdum vocant, in fornacibus cōflata, donec perfectè igni incandescat. Altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda, Hispaniensis: has sequitur quæ sit Dicæarchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flavo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argena

to, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, ex-
 plere caua, excreſcentia in carne reprimere, ad-
 cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Uri-
 tur argenti ſpuma, confractis partibus ad magni-
 tudinem iuglandium, pruna ſuperpoſitis: ita ac-
 cenſa ſollibus, vt conflagret, abſtergitur inſi-
 dens ſpurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto
 aut vino reſtinguentes, rursus vrunt, & eadem
 proſequuntur, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt ar-
 gyritidi nominata, aut, ſi deſideretur, alteri
 candor detur, ea in parteis magnitudine fabarum
 confracta, chœnicis Atticæ menſura, ſicili nouo
 ſuperfuſa aqua, addito candidi tritici pari ponde-
 re, priuatimq; pugillo hordei, linteolo puro, raro,
 anſulis vaſis alligato, coquitur, donec hordeum
 fractum diſſiliat: deinde omnia in nouum crate-
 rem oris ampli tranſfunduntur: triticum abijci-
 tur, ſpuma argenti vehementer manibus affrican-
 do infuſa aqua lauatur, aſſiccataq; in Thebaico
 mortario teritur, affuſa feruente aqua, donec ſolu-
 ta fuſcat: excolata aqua, iterum tota die teri-
 tur, & veſperi inſuſa calida aqua ſinitur: mane
 colis excernitur, alia inſunditur, atq; ter die exco-
 latur. Id ſeptem diebus fieri ſolet: poſtea additis
 ad ſingulas minas ſpumæ argenti, quinis ſulis
 foſſilis drachmis, inſuſaq; calida aqua, ter die te-
 ritur, & addita aqua excolatur: cumq; inalbue-
 rit, calida inſuſa, idem facito, dum nullam pror-
 ſus ſalſedinem reſipiat. Demum ardenſiſſimo ſole
 ſiccat

siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum cōiicitur, aqua infunditur, ita ut superemineat: mouetur quotidie mane et vespere, aqua que superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc sit triginta diebus: nanque nisi moueatur, crasse= scit, vsque in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua donec nullum falsuginis indicium præbeat. Deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confectam, in ventre suillo crudo ex aqua coquunt, dum viscus eliquescens contabescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & vt supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram vnam, & spumæ argenti tantundem, in sole terāt, aqua continuè mutata, dum cādor ei deditur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanaq; non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterū coquito, cyathum aquæ & parē fabarum modum adijciens: eadem tertio, quæ supra facito: in summa,

Ff

tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossiij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensq; , nitri quàm albißimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundens eam ex alio in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi consistere desierit, colato: tum nouam superadijciens aquam, manibus probè versatam sinuito ut confidat, ac rursus per colum traicito. Alternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translatam, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Canicula sydus expunito, & siccata vitior. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendis, ad rugosas facies, & cicatriceas, laceratasq; , & macularum plenas.

Cerulea.

CAP. LIII.

Cerulea fit hoc modo: Infuso in vrceū oris latissimi, aut fictile labellū quàm acerrimo aceto, laminam plumbeā supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectusq; , velaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; , deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamētumq; transfundito: debet quoq; siccari in sole, mox trusat

fatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum, cribrandumq; vicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio vase appendant, & de raso ceu sitis imposito, ita ut acetū non contingat, inditq; operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento visunt: cumq; resoluta materia fuerit, reliquæ, ut suprà diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos vel in digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen suprà dictum opus obeundum est: ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, vrceis suprà furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascēdens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinibi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maxime Attico, tritam cerussam imposito, & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & vitior. Est & illud vrendi genus: Trita patinis nouis suprà prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat: extractaq; ad vsus ministratur. Quæ verò ita parata est, sandyx à quibusdā dicitur. Lauatur cerussa cadmia modo.

Ff 2

Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq; insuper excrementa leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris qualipara vocantur, pastillisq; est autem letalis eius potus.

Chrysocolle.

CAP. LIIII.

Chrysocolle laudatissima Armeniaca, colore rem porri quam simillimè reddēs. Secundum locum sibi vendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est: Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato, & statim quam confederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito: hæc vicissim proseguere, donec pura synceraq; spectetur. Dein siccato in sole, et ad usum recodit. Quod si vrere volueris, ex ea terens quod satis esse videbitur, putius supra carbones adpositum, & alia facito quæ supra diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices: excrementem carnem coercet: adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.

Lapis Armenius.

CAP. LV.

Armenius lapis præfertur leuis, colore cæruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in pal

palpebris alendos.

Cœruleus.

CAP. LVI.

Cœrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro: copiosior ex arena litorali: secundum quosdam sub cautos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis, lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum.

CAP. LVII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indici arundinibus exiens. Alterum infectoriæ dant officinæ: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur quod cœrulei speciem præbet, succum suū sorbet, & leue. Inter medicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt: purgat, & reprimat vlcera.

Ochra.

CAP. LVIII.

Ochram leuissimam, & omninò luteam eligere oportet, saturatam, nō, lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare: excrescentia in carne reprimat: caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

H Cinnabaris.

CAP. LIX.

Allucinantur qui cinnabarin minio ean-

Ff 3

dem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagentissimumq; colorem permutatur: in metallis verò strangulantiem halitū eructat: itaq; facies incolæ vesicis obvelant, ut per illius spectent, nec respirando noxiū aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris verò ex Aethiopia deferitur, & magno constat hacienus inuenitur, ut vix versicoloribus pictorum lineis satisfaciat: intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eandem: conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eruptionibus, cerato excepto, medetur.

Argentum viuum.

CAP. LX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusu suè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus imposita, ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succedunt: siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argentis fodinarum relictis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

riam omnem exedit, et defluere facit. Potum vim pernuciale habet: suo enim pondere interna ex-
est. Remedio est lac multum subinde potum & vo-
mitionibus reiectum, aut vinum cum absinthio,
aut apij decoctum, aut semen hormini, aut origa-
num, vel hyssopum cum vino: auri limata scobs, id
est, ramentum quàm tenuissimum epotum mira-
bili est auxilio.

Rubrica Sinopica.

CAP. LXI.

Rubrica Sinopis maximè probatur grauis,
densa, ad iocineris imaginem vergens, cal-
culorum expers, concolor, cum diluitur, impendio
fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibus-
dam, expurgataq; defertur in Sinopem urbem, in
qua venditur: unde cognomētum accepit. Vim ha-
bet exiccatoriam, quasi inducendo obstruentem,
& adstrictoriam: quapropter vulnerarijs empla-
stris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs
commisceri solet. Aluum sistit, in ore sumpta aut
clystere infusa: datur iocineris vitio laborantibus.

Rubrica fabrilis.

CAP. LXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide infe-
rior est. Optima Aegyptia, & Carthagi-
niensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam
in Iberia quæ ad occidentem spectat, ochra exu-
sta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra.

CAP. LXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata è
Lemno insula, palustri loco defertur, inibi

electa, & caprino sanguini permixta: quam incolae cogunt in pastillos, & imagine caprae signant: unde & sphragida agos, hoc est, sigillum caprae, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciosam venena singularem, pota cum vino, & praesumpta, euomi venena cogit. Contra ictus morsusque animalium, quae exitiale virus eiaculantur, prodest. Antidotus familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur: est & dysenteriae uilis.

Atramentum sutorium. CAP. LXIII.

Atramentum sutorium genere quidem unum & idem est, molle & coactum: sed in specie differentias treis habet. Unum nanque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab iis qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capessit, quod pecton, id est concretitium, proprie nominatur. Tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi haec est: Aqua madafactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complures formulas digestum, tesseraeque specie reddentes, quae racematim inter se cohaerescunt. Optimum esse creditur, caeruleum, graue, concretum, translucent: cuiusmodi stillatitium est

est, ab alijs lonchoton nominatū. Proximum, concretitium. Coctile verò ad infectus & denigra-
 nes, aptius cæteris esse compertum est: sed ad
 medicinæ usum inualidius esse, experimenta do-
 cent. Valet adstringere, calfacere, & crustas in-
 ducere: latus ventris tineas necat, drachmæ pon-
 dere deuoratum, aut cum melle linctum: vomitus
 ciet: aduersus hausta fungorum venena, ex aqua
 potum auxiliatur: purgat caput, aqua dilutum,
 & in vellere naribus instillatum. Vritur, ut pau-
 lò post in mentione chalcitis ostendemus.

Chalcitis.

CAP. LXV.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec
 lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus
 oblongis venis, splendentibusq;. Huic absterfo-
 ria vis inest, excalfaciens, & crustas ulceri-
 bus obducens: purgat quæ oculis & eorundem
 angulis hærent. In genere leniter exceditum est.
 Ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, effi-
 cax est. Sanguinem è vulua, & naribus erumpen-
 tem, cum succo porri sistit: gingivarum vitia, de-
 pascencia ulcera, tonsillasq;, eius farina compe-
 scit. Vsta, & cum melle trita, oculorum medica-
 mentis longè utilior redditur. Callum genarum,
 & scabritiam absunit, abstergetq;. Fistulas tol-
 lit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex chalcite
 medicamentum quod psoricon vocat, duabus eius
 partibus, cum vna Cadmiæ additis, & ex aceto
 tritis. Oportet autè in sicili obruere fimo, diebus

Ff 5

quadraginta, per Caniculæ ardores: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares utriusq; portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, viuis carbonibus superpositio. Modus autem vstionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, et perfecte inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum & miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, vsquedum luteo colore pallescat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Misy.

CAP. LXVI.

Misy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & vstionem cum chalcitide eandem, præterquam quòd psoricum ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, ut poie quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multò super dicto inferius.

Melanteria.

CAP. LXVII.

Melanteria geminæ est originis: quedam in faucibus cuculorum, quibus æs eruitur, salis modo concrevit. Alia verò in summa
fac

facie supradictorum locorū coit, quæ terrena est. Quæ etiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quedam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vinæ causticam eam obtinet, quam & misy.

Sory.

CAP. LXVIII.

Sory existimarunt aliqui melanteriā esse, aberrantes, siquidem sui generis est sory, et non absimile: verum sorēi virus inest graue, & nau-seam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina delih-scens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeq; magnum virus olens, ita ut stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & vñtionem supradictis similem habet: dolori dentium, cauernis inditum medetur, eosq; labantes firmat: ischiadici ex vino infusum auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit. Medicamenis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia, & alia quæ vñtionē experta non sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini facem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Combusta

buſta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

CAP. LXIX.

Diphrygis tria genera eſſe creduntur. Quodam enim metallicum eſt, quod in Cypro ſola gignitur: luſum nanque extrahitur, ex luto cuiusdam mibi ſpecus: extractum, ſole ſiccatur, mox circumpoſitus ſarmentis vritur. diphryges ideo vocatum eſt, quod & à ſole, & à ſarmentis vritur, areſcat, & fermè torreatur. Alterum perfecti aeris, quaſi ſubſidens fax eſt: ſiquidem poſt frigida aquæ offuſione, vt ſuprà retulimus, cum de flore aeris diſſereremus, ſublato aere, fornaci in parte coherens id genus inuenitur, & adſtrictionem & guſtum aeris habens. Tertium ſic fit: Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremant in camino: cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex ſola materia, quæ lapidem aeris gignit, fieri: quando in dictis arèis aſſata, & in ſcrobis translata perurit. Tunc enim ambientem ſcrobis locum cōprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur quod ſaporem aeris reddit, æruginisq; adſtringens, & vehementer exiccans linguam: quod ſibi exuſta ochra non vendicat: quæ cremata, diphrygis vice vānit. Vis eius adſtringere, perpurgare, extergere, ſiccare, excrescentia conſumere, vlcera ſerpentia, & quæ cacoëthe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes terrebithina aut cerato exceptum diſcutit.

AUS

Auripigmentum.

CAP. LXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandarachia, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiae permixtum, in squamas fissile: quale in Mysia Helleponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt: Vnum supra dictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua uis carbonibus subiectis, assiduoque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem, crustas cum vehementi uridine, & violento morsu excitat: reprimat quae ex crescunt, & capillos euellit.

Sandarachia.

CAP. LXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem & uestio, quae auripigmento: explet alopecias, resina excepta, & scabros ungues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisque vlcerum, & ceteras papularum eruptiones cum rosa ceo: item condylomata. Datur ex mulsio, purulenta extusisientibus. Sufficitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, raptio per fistulam nido re: vocem expedit, cum melle delincta: suspiriosis

cum

cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen.

CAP. LXXII.

OMne aluminis genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur: etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparu, Sardinia, Hierapoli Phrygiae, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species: verùm ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimū gustu perquàm adstringens, graue olens, calculorū expers, nec glebuloſe aut assuloſe compactum, sed sigillatim in capillamenta quadā canescentia dehiscēs, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natū. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod nō adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confictum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundi, bullis turgens, albo propius, atque validius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadā pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit lymphidum, lacteum, æquale, & semper succo madēs, sine lapidibus, atque quendā coloris igniculum expirans. Vim habet excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculor

lorum offundunt: genarum carnem, cæterasq; ex-
 crescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius
 intelligitur. Vri et torreris chalcitidis modo debet.
 Putrescentia vlcera compescunt: sanguinis fluxio-
 nes inhibent: gingiuas humore prægnantes com-
 primunt: motus dentium cum aceto & melle fir-
 mant. Prosumt cum melle vlceribus oris, eruptio-
 nibus papularum, & fluxionibus aurium, cum san-
 guinalis herbe succo: lepris conueniunt cum bras-
 sicæ folijs aut melle cocta: item pruritiui, & vin-
 guum scabrius, pterygys, & perniombus, asper-
 sa cum aqua. Valent cum aceti fece, & galla, pa-
 ri pondere cremata, ad phagedænas vlcerum, &
 cum salis duabus partibus, ad vitia quæ pascunt:
 fursures cum eruo & pice illita absterguunt: ad-
 lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio
 sunt. Contra tumores, & graue alarum ingui-
 numq; virus, illinuntur. Ex Melo autem aduectum,
 mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori-
 vulæ inditum: partus quoque extrahit: gingiuas,
 si caro excreuit, rube ac tonsillis accommodantur:
 ori, auribus & verendis cum melle illinuntur.

Sulphur.

CAP. LXXIII.

Sulphur optimum existimatur viuum, quod apy-
 ron vocat, nitedule modo splendidum, perluc-
 cens, minimè lapidosum. Probat in genere sul-
 phuris igne experti, quod viret, ac præpingue spe-
 ctatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur.
 Supradictum sulphur calfacit, discutit, & cele-
 riter

riter concoquit : prodest tussibus, suspiriosis, puerulenta extussientibus in ovo sumptum, aut suffitum : praeterea partus, vsti nidore extrahit : lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert : cum aceto aut e illitum, ad lepras efficax est : vitilignes tollit : scorpionis ictibus, addita resina, medetur : cum aceto vero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum, sedat : regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ovo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes : sudores quoque conspersum inhibet : podagricus, cum aqua & nitro illitum, conducit : grauiatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat : lethargicos suffitu excitat : erumpentem indecunque sanguinem sistit : contusis auribus, cum vino & melle illitum medetur.

Pumex.

CAP. LXXIIII.

PVmicis probatio, vt magnopere leuis, spongiosus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbombus obrutus, & vbi canduerit, extractus, vino restinguitur odorato : iterumq; incensus extinguitur : & tertia vstione exēptus, & per se refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere : purgat cum calfactione, quae caliginem pupillis offundunt : explet vlcera, & ad cicatricem perducit : excrescentia colibet. Fit ex
far

farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit: auellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quisquam in bullientem vrceum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal.

CAP. LXXV.

SAl fossilis efficacior est: communiter, si est candidus, calculus vacans, & perspicuus, densus, aequali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, aequalis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris praefertur: sed multo validissimus est Phrygius nomine tapeus, aut tritæus, aut gantæus. Salis natura in commune perquam utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, quod alius alio sit praestantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus. Excrecentia in oculis reprimat, & pterygia consumit, cæterasque carnis extuberationes tollit: clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur, doloresque in saccis foetu mitigat, & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriectus ad ignem, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasque. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus leuat: tonsillis vixque, cum melle tostus. Vlceribus in ore

Gg

manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedenis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus, cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerassten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur. Contra scolopendrea morsus, cum melle & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos cum rua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano, & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morsibus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita ut vinculus loca cōstringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle: ambusus igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto: ignes sacros, & ulcera quae serpunt cum aceto aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis, vsquedum efferuescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, & carbonibus subijciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo vri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat. Spuma salis, spumosi maris lauugo siue ramen-

tuna

tum est, in exilibus petre inuentum, cui vis eadem quæ salis.

Muria.

CAP. LXXVI.

MVria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiamsi nome istina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad solus, aquæ marinæ usum præstat.

Flos salis.

CAP. LXXVII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. Interdum longè magis virus olet, gustuq; mordacior, & pinguiter lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncerus non nisi oleo resolvitur: adulteratus nōnulla ex parte, etiam aqua, diluente facilius colorem. Ad vlcera quæ cacoëthe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est: oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastis unguentisq; coloris causa, ut rosaceo, miscetur: sudorem cit: aluum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum malè habet. Additur acapis, & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componitur: & in uniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

Nitrum.

CAP. LXXVIII.

Prefertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi.

Gg 2

Spongiosum quiddam, quale ex Bumis affertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens: qualis ex Philadelphia Lydiae deferitur. Secunda est Aegyptia. Quin & in Magnesia Cariae gignitur. Vim & vstionem salis habet, tam nitrum quàm spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, vti ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida aut vino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum moribus ex asinino adipe aut suillo medetur: resinae terebinthinae admistum furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex piscapitum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: ijs verò qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpitio: ijsq; qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonusq; iam remissioribus, & luxatus, cum cerato: in resolutione linguae, panu commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Fæx.

Fæx.

CAP. LXXIX.

ELigenda fæx maximè à vino vetere, Itali-
co: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti
viribus longè acrior est. Crematur vt alcyonium,
antè diligenter siccata. Sunt qui noua testâ igni
largo vrant, vsque dum penitus incendatur. Alij
vius carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem
opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ
vstionis, vt aërio nitore inalbescat, linguamq; ta-
ctu vrere videatur. Eadem vrendæ fæcis aceti ra-
tio. Vis ei supra modum vrens, & abstergens: vl-
cera ad cicatricem perducit, adstringit, vehemen-
ter exest, siccâtq;. Sed recenti vtendum est, quo-
niam celeriter exanimatur: proinde nō nisi in re-
conditorio, & vase aliquo reponi debet. Lauatur,
vt pompholyx. Quæ vstionem experta non est, u-
mores & per sese, & cum myrto cohibet: ventris
stomachiq; fluxiones illita sistit: muliebri proflu-
uium, imo ventri aut genitalibus imposita, miti-
gat: panos discutit, nondum exulceratos, & tuber-
cula: rigentes mammas, sinq; lactis impatientes,
cum aceto peructa extinguit. Cremata verò, vn-
gues scabros cum resina aufert: addito leniscino
oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculo-
rum medicamentis, vt spodos, adiicitur: cicatrices
eorum & caligines eadem abstergit.

Calx viua.

CAP. LXXX.

CAlx viua hoc modo fit: Marinorum bucc-
inorum testas igni condito, aut feruenti cli-

Gg 3

banis, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrto, usquedum vehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidam immersa fuerint, in fictile novum conijcito, & exacte pannus operiens, noctem unam conquiescere finito: mane eam extrahens, ubi perfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è litoralibus calculis igne crematis, necnon è vili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calci in cõmune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit & dissipat: vlcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum.

CAP. LXXXI.

GYpsum vim habet adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet: sed potum, strangulationis modo iugulat.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

SArmentorum cinis vrendi vim habet: cum Saxinria autem vel oleo illutus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit: serpentium canumq; morsibus illutus ex aceto medetur crustas obducentibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixiuum contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto, sale, & melle.

Alc

Alcyoniam.

CAP. LXXXIII.

Alcyonij quinque esse genera comperitum est: unum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. Alterum pinnule oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succulis velleribus non dissimile, multis inaequalitatibus hians, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris laue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achmen vocant. Duo priora in foeminarum sinegmata assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vñtum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus apium est: in alia sinegmata, psilothraq; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum sigillum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recendat. Lauatur vt cadmia.

Gg 4

Adarces.

CAP. LXXXIIII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta falsilago, humidus & palustribus locus siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cano proxima, ut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

Spongix.

CAP. LXXXV.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. Feminas autem, quæ contrariis doctes habent. Vruntur eæ ut alcyonium. Recentes sine pinguetudine, vulnerariæ sunt, & tumores reprimunt: recentia vulnera ex aqua piscinæ conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungunt. Vetusæ autem inutiles. Aride ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant, siccæ recentes & vacuæ senilia vlcerant, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excidunt, impositu siccant: sanguinis profluvium sistunt. Crementarum cinis ex aceto, aride lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crem

crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candide cura sunt, è mollissimis recentes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret: insolantur inuersæ, hoc est, parte caua sursum spectante, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æstina serenitate ad lunam sternantur, perfusæ salis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

Corallium. CAP. LXXXVI.

Corallium, quod aliqui lithodendron appellant, marinum esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus concre scat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promotorio cui Pachyno nomen est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili usquequaq; concremēto, rursus algæ aut fuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: excrescentia coëret: oculorū cicatrices abstergit: vlcera caua, & cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, vrinæ difficultati auxiliatur. Quin & potū ex aqua lienem absomit. Quod antipathes vocāt, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Gg s

Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

Phrygius lapis, quo infectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem vino optimo perfusus, viuisq; carbonibus obrutus, perflatur assiduè follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & trinis vicibus faciendum: attendendum tamen, ne minutim cōfringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quādamtenus inducit, ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut cadmia.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

Asus lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: admotus linguae aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, & modicè erodentem: admistus liquidæ pici, aut terebinthine, tubercula discutit. Longe validior flos existimatur. De cætero siccatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnātia sanat: excrecentia cohibet, tetraq; vlcera & fungus similia, cum melle expurgat vlcerum cana explet,

&

Et expurgat cum melle: depascentiaq; cum cera-
to sistit. Fit cataplasma ex eo podagrus, misto
fabæ lomento: Et lienosis, ex aceto Et uina cal-
ce. Prodest flos ex melle phthisicus linctu. Pod-
agrici inuantur, pedibus in solio ex eo lapide exca-
uato indutis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora
erodunt, Et luxuriantem carnem, Et corporum
crassitiem absumunt, cum vice nitri in balneo spar-
guntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

Pyrates. CAP. LXXXIX.

Pyrates lapidis genus est, à quo res conflatur.
Eligi debet æris similitudine, facile scintillas
ædens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna
continuè flatur follibus, donec rufescat. Alij in
multos carbones igni candentes, lapidem copioso
melle perfusum deiciunt, Et ubi ad fuluum colo-
rem vergere cœperit, extrahunt: efflatoq; cinere,
rursus madefactū cremant, donec æquabiliter as-
siccatus, friabilis reddatur: siquidem sæpe fa-
cies summa solū vritur. Ita crematus, siccatusq;
reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet ut cad-
mia. Tam crudi quàm vsti vis est, excoalfacere,
abstergere, offusam oculis caliginem expurgare,
duritias concoquere, Et concoctas discutere. Re-
sina exceptus excrescentia in carne cohibet, sed
calorem quendam Et adstrictionem parit. Ita
vstum nonnulli diphryges appellant.

Hæmatites. CAP. XC.

Hæmatites optimus habetur friabilis, satur-
rato

rato colore niger, durus & suapte ingenio equalis, nulla sordide admixta, nulloq; zonarum discursu. Vim habet adstringentē, & excalfactoriam aliam quantum extenuantemq; oculorum cicatrices & scabritiā cum melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit: bibitur contra difficultatem vrinae, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo prunici mali. Fiunt ex eo coticulae & collyria oculorum vitis apta. Vritur ut Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, ut modicē leuis fiat, & bullis quibusdā intumescat. Sunt qui hematiten ita adulterari: Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices vocantur, in vrceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, cōdunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hematitæ colorem reddat: quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruant, & subinde conspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur male confectus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hematites longè secus se in colore habet: nanque hic floridum reddit: hematites verò saturatiore, atque cinnabarinimitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer ambusto. In Aegypto sponte natura cum metallis nascitur.

Sch

Schistus lapis. CAP. XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probaturn maximè qui croci colorem æmuletur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium venarum discursu, petelinum modo, Ammoniaco sali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus: ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & ruas oculorum, magnopere efficax est.

Gagates. CAP. XCII.

In gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit: niger est plerumque, & squalidus, crustosus, perquam levis. Vis ei molliendi, & discutiendi: deprehendit fonticum morbum suffusus, recreatq; vuluæ strangulationes: fugat serpentes nidore: podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus hi lapides inueniuntur.

Alii plures lapides. CAP. XCIII.

Lapis thracicus dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo resistit: quod in bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, densus, nec admodum grauis.

Dat

Datur cum aqua misa, trium obolorum ponde-
re, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magne-
tem crematum pro hæmatite vendant. Arabicus
lapis maculoso ebori similis. Istritus illitu hæmor-
rhoidis exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Galactites appellatur, quod lacteum succum re-
sudat: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis.
Ad oculorum fluxiones & ulcera convenienter il-
linitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide
plumbea recondere, propter vim glutini, quod ei
obheret. Melitites omnia galactitæ similis: hoc
tantum interest, quod dulciorem succum renit-
tit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochibus la-
pis, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vo-
caverunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli,
& facile liquecente, linteones dealbandis vesti-
bus viuntur. Spiracula corporis obstruere vide-
tur, conveniens quæ qui sanguinem expuunt, coelia-
cis, & vesicæ doloribus, cum aqua potius itidæ flu-
xionibus vulvæ, & impositus velleri. Mollibus
oculorum collyrijs miscetur: explet enim cava, atque
de lacrymationes sistit. Idem cerato exceptus, ul-
cera quæ sunt in teneris partibus corporis, ad ci-
atricem perducit. Alabastrites vocatus onyx,
crematus, resina aut pice assumpta duritias di-
scutit: stomachi dolores cum cerato leuat, & gin-
guas comprimit. Lapis nomine thyites, in Ae-
thiopia gignitur, subviridi colore iaspidem imita-
tus: cum diluitur tamen lacteum succum reddit.

Vcl

Vehementer mordet : tenebras , quæ pupillis ob= uersantur , expurgat. Iudæicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis equaliter inter se distanti= bus quasi industria detornatus solutus nullâ qua= litatem manifestam gustui representat. Potest ci= ceris magnitudine tritus ad colem, vt collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesica comminue= re. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alu= mini similis: quo, utpote flexili, telas & vela tan= tum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis iniecta splendoriora exeunt. Sapphirus lapis, percussus à scorpione, po= tu prodesse existimatur. Contra intestinas exul= cerationes bibitur. Excrescientia in oculis, vnasq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas co= git. Memphites in Aegypto iuxta Memphin in= uenitur, calculorum magnitudine pinguis, ver= sicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu inueni= tur lunæ imaginem reddere, quæ cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candi= dus, translucēs, leuis. Huius ramēta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem fru= giferæ redduntur. Iaspidium quædam smarag= duma

dum imitatur, alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aëri, ob id vocatur æriza: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur: quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata: alia terebinthinæ similis, quæ terebinthiza dicitur: alia colore callida gemmam æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum femoribus appensæ. Aërites lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante. Gravida continet partus, cum lubricæ sunt vulvæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturientibus è brachio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. Furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quin etiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Trilus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitæ genera multa: quidam ponderosus & niger: aliter cinereo colore spectatur, punctis distinctus: tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur qui lineas habent, leiargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapides in spongijs inveniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur: conflat autem ex marmore, lapide Parisio,

rio, & taurino glutine. Poteſt candente ſpecillo admotum, incōmodos oculis pilos replicare. Oſtracites teſtæ ſimilitudinem habet, cruſtoſus, & in laminas fiſſilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtuntur. Menſes drachmæ pondere potus ex vino, ſiſtit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur ſcilici pōdere, ſcēminis præſtat ne cōcipiant. Cum melle autem impoſitus, mamma- rum inflammationes lenit, & nomas cohibet.

Smyrus lapis eſt, quo annularij ſculptores lapides expurgant, ad erodendum & vrendum utilis: gingiuis, quas humor vexat, prodeſt: dentiſcicio commendatur. Arena è litoribus ſole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, ſi capite tenuis, in ea obruantur. Torreri ſolet ad aridos ſotus, pro milio aut ſale. E cote Naxia, quod exacuedo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit: virginum mammæ cohibet, nec increſcere patitur: potum ex aceto, lienem abſumit, & comitialibus prodeſt. Geodes lapis, adſtringit, ſiccat, caligines oculorum diſcutit. Illitus autem ex aqua, teſtium mammarumq; inflammationes ſedat.

Terra.

CAP. XCIII.

Omnis terra ad medendi uſum recepta, ſummam & primam vim habet refrigerandi, meatuſq; obducendi, occludendiq;: ſed ſpecie diſtat, cum alia adiunctis quibuſcūq; ad alia ſit utilis. Eretriades duæ ſunt, vna vehementer alba eſt, altera cinericia. Optima habetur ad cinereū co-

H b

lorem vergens, per quam mollis, quæ si per æra-
 menta tractim ducatur, lineam violaceam refert.
 Lavatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur
 seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, hu-
 mor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum te-
 ritur interdum, adiecta aqua, ut respere confidat:
 antelucanis colo excernitur, & demum in sole tri-
 ta si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si to-
 sta desideratur, pastilli magnitudine ciceris in si-
 cile perforatum coniunguntur, oreque vasis diligen-
 ter obturato, supra carbones candentes continen-
 ter follibus perflantur: ubi verò cinis in favillas se-
 conuertit, aut aëreum colorem contraxit, exempti
 reconduntur. Vim habet adstringentem, & refri-
 geratoriam, leuiter mollientem: caua explet, &
 sanguinolenta conglutinat. Samia præferitur can-
 dida, leuis, tangenti lingua glutinis modo adhære-
 scens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est quam
 aliqui collyrian vocant. Due enim species eius:
 vnā, antè diximus: altera aster appellatur, cru-
 stacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac laua-
 tur ut eretria, vniūque consimilem habet: sangui-
 nis reiectiones sistit, & feminis fluxione vuluæ
 laborantibus, cum flore sylvestris punice datur.
 Testium & mammarum inflammationes, illita
 ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arceat: con-
 tra serpentium morsus & venena, pota ex aqua
 auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inueni-
 tur, quo aurifices vtuntur polliendo auro, ut res-
 splen

Splendeat. Probaturn candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis potus: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est: partus, vt tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit. Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiæ similis: est autem crustosa, albaq; , sed fictitius formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ: extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie & corpore toto commendat: in balneis pro nitro deterget. Eadem præstat Selinusia: maximè laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimoliæ duo genera, candida & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtræque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit: ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, vtræque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ pniigilis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoveat, refrigerabit: tactu linguae, usque adeò glutinosa, vt pensilis hæreat. Cui effectus idē qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade vendunt. Fornacæ testæ vehementer

toſta, cruſtas vlceribus obducunt: quare prurigi-
 ni & papularum eruptionibus medentur. Podag-
 ricis proſunt: ſtrumas diſcutiunt, cerato excepta.
 Fornacum terra quæ retorrida fulueſcit, eiſdem
 cum teſta effectus. Melia colore cinerea cretiam
 imitatur, aſpera tactu: ea digitis friata, deaſi pu-
 micis modo crepitat. Vim habet aluminofam, ſed
 remiſſiuſculum, id quod guſtu deprehenditur: nam
 modicè linguam ſiccatur: purum corpus reddit, &
 colorem commendat: pilos extenuat: vitilignes,
 & lepras abſtergit. Pictoribus uſum præbet ut
 colores diutius perennent: emplaſtris viridibus,
 quæ chloræ dicuntur, efficaciter inferitur. Ex
 omni Melia terra & omni alia in vniuerſum,
 eligi debet recens, mollis, non lapidofa, friabilis,
 quæ cum humorem attigerit, facile reſoluatur.
 Ex ampelitide terra, quæ pharmacitis nomine,
 in Seleucia Syriæ naſcitur, laudatur in primis ni-
 gra, pice æ longos carbonem referens, modicè aſſulo-
 ſa, æquabili ſplendore, quæ detrita, accepto oleo,
 ſtatim eliqueſcit. Vitioſa cenſetur candida, & ci-
 nereæ, quæ in liquorem non reſolvitur. Vim diſ-
 ſipandi & refrigerandi habet: ad calliblephar.
 additur, tingendis capillis idonea. Uſus eius ad il-
 linendus vites ſub germinationis tempus, ut pote
 cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria.

CAP. XCV.

Fuligo qua pictores utuntur, ex vitrarys offi-
 cinis colligi ſolet: ſiquidem ei palma tribui-

itur.

tur. Vis ei ad adstringendum & erodendum effi-
cax: fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem
perducit.

Atramentum librarium. CAP. XCVI.

Atramentum quo scribimus, fuligine è tedis
coacta colligitur. In singulas libras gūmis,
terne fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiam è re-
finarum & pictoria fuligine, de qua paulò ante
diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gum-
mi, sesquilibra, glutinis taurini, atramenti suto-
rij, singulorum sescuncia. Additur conuenienter
erodentibus medicamentis: Ambustis, ex aqua
commodè crassius illinitur, sed non antè solua-
tur, quàm cicatricem induxerit: sanatus si-
quidem vlceribus, sua spòte decidit.

Cæterum habes, amicissime

Aree, ferè quæ tradeda

duximus pro ope

ris modo, quæ

destina-

ueramus & materia auxi-

liorumq; medicina-

lium copia.

QVINTI LIBRI
FINIS.


Hb 3

PEDANII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

venenis, quoq; modo arce-
antur, vitenturq;

Liber VI.



UPERIORIBVS amicis-
sime Aree libris tradidimus de
aromatibus, oleis, vnguentis, ar-
boribus, & earundem fructibus,
lacrymisq; : item animalibus,
melle, lacte, semine, frumentis, oleribus, herbis, radi-
cibus, liquamentis, vinis, metallisq;. In hoc verò to-
tius operis vltimo, facultates medicamentorum
recensuimus, quae prodesse nobis, aut officere pos-
sunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus in-
stitutum prosequamur. Huiusmodi autem tra-
ctatus, cum bifariam distributus sit : in partem
venena praecauentem, ita ut ne fallant iumentes,
aut si quando per imprudentiam deuiur, ut tum
quoque innoxia fiant, irritaque : & in ratio-
nem ipsius succurrendi, qui iam noxiam sentiunt : pri-
mum differam de praecauendi modo, quem esse dif-
ficillimum plerique maiorum arbitrantur, quod
dantes clam venena, ita insidias temperant, ut pe-
rit

ritissimum quenque decipiant. Siquidem venena
sua amaritudine, permistis dulcibus, spoliant, &
grauē odoris virus mistura odoramentorum exi-
munt: aut medicamēta immiscēt, quæ tuendæ sa-
nitatis gratia dari putantur: & præsertim in va-
letudine, vt absinthium, tragoriganū, satureiam,
aut hyssopum, quinetiam thymū, irim, origanum,
abrotonum, castorium, aut si quid medicamentis
purgatorijs cognatam habere qualitatem videat-
ur. Aut potionibus inserunt: vt vinis asperis, iu-
ribus, passis, mulsa aquæ, musto: succis, vt in cre-
more lentis, polentis: aut medicaminibus, aut alijs
quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Qua-
re qui in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare
debent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salso-
rum, aut acidorum, abstinere: nec sitibundi affa-
tim bibere, aut esurientes voraciter comesse, sem-
perq; ad saporem horum diligenter attēdere, præ-
sertimq; potu frigidam aquam præsumere. Satia-
to enim appetitu, qualitates ægerrimè postea
concoquuntur. In ægris quidem facillè cauemus
potiones auxiliij prætextis dari solitas, quas offe-
runt improbi veneficiorum artifices: itaque ob id
laborantes morbo non perinde audentium iniurijs
patent. Et hæc quidem ne facillè incauti seductiq;
homines capiātur dolis veneficorum, ratio est, &
facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspi-
ciosi aliqua præsumāt, quæ venenorum vires he-
betent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi

caricæ sunt cum iuglandium nucibus manduca-
te, & quæ cedromela vocant, id est citria, semi-
nisq; napi drachma cum vino. Item folia calamin-
tha, aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur,
pondere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis
iuglandis nucleum: aut caricæ duas, & salis cal-
lum ieiuni sumant, & nullo veneni genere leden-
tur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum
præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithri-
datium, & quod scinco, & quod sanguine tem-
peratur. Quin & sepe venenis obsistunt peculia-
res quidam corporum affectus certo quodam mo-
do constitutorum cum quadam cibi potusq; qua-
litate, tum vini copia ita temperatorum, ut cum
venenis dissentiant: siquidem ingesti veneni vires
frangunt, atque iam priore alimento fartis præ-
clusisq; meatibus, obstant ne membratim per di-
gestionem insinuetur. Verumenimvero, quoniam
fortune necessitas interdum similia discrimina
peregrè agentibus affert, absque ullis insidijs ho-
minum, non nihil differendum mihi de hac re ne-
cessarium duco. Iam primum igitur culinam ap-
parare loco subdiali conuenit, cibosq; & potus in
huiusmodi loco struere. Si id fieri commodè ne-
quit, secunda erit conditio hæc, apparandi appo-
nendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia
animaduertenda: frequenter enim à superioribus
contabulamentis animalia decidunt, exigua qui-
dem, sed quæ non modicam perniciem moliantur,

ut phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet: namque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdum verò delapsa immersa; expirarunt, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hætenus dicta sint, ne cauti & providi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quo rûdam insidijs sumptulerunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit: siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper neglectum, medicamentis agrè cedit. Quare si qui pro comperto se virus sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eorum qui aderant testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari nativæ; constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo morbi, quorum causas cæcæ latentes; corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur? Aequè verò omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, pro; antecedentibus affectionibus qualitatibus; quibus sit opportunum corpus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsam obmutescentes, aut temulentis, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum pro-

Hb 5

tinus accedendum ad ea quæ communiter epotis
 quibuscumq; venenis opitulari consueverunt. At
 qui nullum magis in omnia valens auxilium da-
 ri potest, quàm ut proximo loco virus foras exhau-
 riatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, ca-
 lidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut vomitare
 cogantur, dari convenit. Aut si oleum natura loci
 negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut
 lini semine, aut trago, urtica, faxogræco, aut hæ-
 licæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non
 modo vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice,
 aut nauseam ciēte, sed alium quique subducent,
 & corporum inanitione ita aduersabimur, ut
 acrimoniæ venenorum hebetent. Id quod euidenter
 huiusmodi argumento deprehendere licet: Esto,
 ut quisquam viui calce vel fece, aut cantharidi-
 bus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare sta-
 tuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulceratio-
 nē non accipiet. At qui neque vehemēter adstrin-
 gi corpus, neque refrigerari poterit, si antea pere-
 ungatur. Quinetiā vomitus non ob id modò quòd
 vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamen-
 tum adfert, sed quòd assumptum virus nunquam
 odore, coagulatis grumis aut colore, prodat; qui p-
 pe cum odore & amaritudine, meconium: colo-
 re, cerussam, gypsūve: grumis lac aut sangui-
 nem animalis recens iugulati ostendat. Nam
 grauis odor regestorum, leporis marini, aut rue
 betæ veneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab q̄s
 rem

remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transcurantibus. Oleo etiam malue decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps asserinus, aut pinguium carnum iura, aut lixiuum lignorum cinere factum. Vbi verò vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, vetustæ carnes pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Alium nanque subducunt, uti diximus: & stomachum resoluētia, proximorem ipsum ad vomitionē reddunt: & venenorum acrimoniis hebetant, atq; meatus obstruentia, celerem virium penetrationē inhibent. Quin etiam medicamenta dantur, quæ communi dote prosunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenum, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magudariam appellant, aristolochia longa, syluestris rutæ semen, & betonicæ, quam cestron nominant, folia: singula cum vino drachmæ pondo sumi debent. Effectum præbet polydecoctum, & seseli, & liquida pix linctæ. Magnificè ferunt opem antidota, quæ in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio
præ

præstandi auxilij ita se habet. Caterū ab ijs quæ consueuerunt euenire, communia remedia sumptuari possunt. Ferè enim vires venenorum quàm plurimorum, in affectus consimiles corpus tandè redigunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxilia: varia etenim sunt venenorum genera, communes tamè nec multi ydem affectus oriuntur. Neque fieri potest, vt omnes concurrentesq; casus, quæ symptomata vocant, vnum venenum sequantur. Alioquin superuacanea fuisset venenorum singulorum traditio cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemq; promptum est inuenire, vt quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & vesicæ dolore vehementer crucietur, vt singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, vertigo prematur, vertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre confluetur, agrè lotium reddat, torminibus vexetur, crebrò vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore sugilletur, palleascit, desipiat, stertat, viribus deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturq;: singula enim in generales affectus deducta, paucanumero, & communia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ supra diximus, non facile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam oris & lingua erosio, stomachi, ventris, vesicæ ac renum inflammatio, vehemens vrinæ

ne difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò potius reperiuntur, sed in erucis quoque pinorum, & bus præste, & salamandra. Porro non modò eos qui meconium hauserunt, veterno aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupescere, toto corpore pruritus sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mædragoram aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyoscyamus tantum infert, verum etiam quæ toxica appellantur: itidem aconitum, & mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerussa, gypso conspicitur. In summa, difficile vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum, gustatumq; virus prodere possit: maxime, quòd hæc cæterorum etiam vitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possit, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quòd pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt, transmutata in longos affectus, communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesq; flagitent, cum venefica proprietas non amplius insit. Si verò longa sit affectio,

in

in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæc tenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam vim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cauè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur. quòd nonnulla eorum quibus vtuntur, venenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo vsu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt: cantharides, bu præstis, salamandra, pinorum erucæ, lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata e hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liguamenta: meconium, opoparison, thapsiæ succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, veratrum, iuxia, agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Herbae oleraq;: smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum, solanum manicum, quod & dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ ranunculi genus est, corniculatum, papauer, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi. Ab animalibus: taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metallum: gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, duo

duo sandarache genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E liquoribus domesticis: vinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides.

CAP. I.

Quibz datae sunt cantharides, signa eueniunt gravissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur, picē aut simile quiddam cedri resipiunt, dextra praecordia inflammantur: urinam agrē reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine concidunt: postremo mente abalienantur. Ergo antea quā tale nōnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur: mox ubi vomitione purima reiecerunt, bulicæ aut oryzae, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum maluae, aut seminis lini, aut fœnigræci, aut radicū althææ, quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea utrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in alium ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nucleī, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo lique

quefactus. Inflammatae autem partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, ut in principio se partes insinuet: ipsa tamen, interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur, utpote quae dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lavare, ut per cutem summam, quae corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et deiectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeßat. Gallinaceis carnibus & hœdianis, aut suillus catulus, maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem alium cient, atque venenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest iheris cortex, & Samia terra, quae aster appellatur, si quaternae singulorum drachmae cum passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detrui. Longè omnium potentissime, antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

Pinorum erucæ.

CAP. II.

Is qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, lingue ac stomachi inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem sentire videantur:

tur: corpus totum exæstuat: fastidium vrget. Quibus est succurrendum remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

30. Buprestis.

CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt, stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam venter quam stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies cõtenditur: urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post vomitus & vacuationes, quas clysteribus molimur, arida ficus profuit: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

CAP. IIII.

SI Salamandram hauserunt, lingue inflammatio consequitur, mens & sermo præpeditur, tremor cum corpore aut horrore quodam ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; sugillantur: sæpeq; diutius immorante veneno putrescentes, defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ potis cantharidibus. Peculiariora verò remedia, resina pinus, aut galbanum

II

ex melle linctum, & auge decoctum, in quo nucleus pinei conterantur: urticae quoque folia, cum lilij & oleo decocta. Prosumt etiam omnia testudinis marinae aut terrestres, cocta: item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

Ephemerum.

CAP. V.

Sumpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrem bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque is qui urtica aut scilla lacessuntur: interna rosionem sentiunt: stomachus cum ingenti gravitate exaestuat. Caterum inualecente morbo, cruor strigmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut is qui salamandram hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari conveniet: sed antea quam venenum inualescat, dandum est decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: lac bibere prodest, in quo serpillum sit decoctum: item succum sanguinalis herbae, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medullae recentis ferulae, aut myrti cum vino. Baccae autem myrti tuse tritaeque, & aqua maceratae, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tunica, similem effectum praebet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptitetur: origanum quoque cum lixivio epotum: eximie inuariantur asini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

Dij

Dorycnium.

CAP. VI.

Dorycnion, quod aliqui manicon solanum
appellarunt, epotum, lactis saporem in gu=
stu refert: continentes singultus ciet, humor lin=
guam vexat, sanguis conferim reijcitur: muco=
sa quaedam perinde quasi dysentericus, alio ege=
runtur. Itaque antequam aliquid ex ijs eveniat,
auxilio sunt antedicta, vomitus, clyster, & que=
cumque potum venenū expellere possunt. Priuatim
ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprillum, aut asi=
ninum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bi=
batur, amygdalæ amaræ, gallinacea pectora de=
cocta. Quinetiā conchylia omnia, tā cruda quā=
tōta esse salutare est. Conueniūt & locustæ ma=
rine, & gammari, & pota eorundem iuscula.

Aconitum.

CAP. VII.

Aconitum statim in lingua inter bibendum,
cum adstrictione quadam dulcescit: & sub=
inde, potissimū cum exurgere conatur, vertigines
offundit: lacrymas ciet: grauitatē pectori, & præ=
cordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur.
Quare venenū vomitione abigi, aut clystere per
aliū egeri opus est. Vtimur inter propinandum,
origano, ruta, marrubio, vel absinthij decocto,
cum vino absinthite, vel semperuiuo, vel abroto=
no, vel chamælex, aut aiuga. Prodest etiamnum
opibalsami drachma, cum melle aut lacte, cum
castorio, pipere, & ruta, aqvis ponderibus ex vi=
no. Coagulum hœdi, leporis, aut hinnuli cū aceto,

ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum, ferrum, argentumve candens restinguatur, potum: lixiuiaq; cum gallina & vino decocta, aut carnis bubularum prae pinguium iura, cum vino sumpta. Fertur & a iuga priuatum ipsis subuenire.

Mel Heracliae.

CAP. VIII.

Mel in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur: quod qui edunt bibuntve, non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. Iis eadem quae poto aconito conueniunt: adiuvantur in primis continuo vini mulsi potu, cui rursus folia sint adiecta.

Coriandrum.

CAP. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest: epotum autem vocem exasperat, insaniam adfert, à temulentis non abhorrentem. Qui sumpti sunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore, venenum fatentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum, nec secus ova in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina & anseris: passum quoque cum lixiuia sumptum.

Psyllium.

CAP. X.

Psyllium epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & macrore quodam affert: ita ut animum despondeant. Cui omnia quae exhausto coriano auxiliantur.

Cicm

Cicuta.

CAP. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat: oculisq; caliginem offundit, ita vt minimum cernatur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: deniq; conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulantur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutam vomitu excutiemus: postmodum deiectione moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus: repetendum per interualla, in quibus proderit lac asininum, aut bubulum potum datum, aut absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha cum vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passô, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

CAP. XII.

Smilax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus vniuerso corpori strāgulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ cicuta conueniunt.

Carpasi succus.

CAP. XIII.

Epotus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

Sardonias herba.

CAP. XIII.

Sardonias ranunculi herbae generi assignatur, quæ rescentibus mentem adimit, & quæ

dam nervorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infansto omine manavit. Post vomitum peculiariter convenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciētibus: in calidam aquam oleumq; descendant, sed tum multum perficere & inungere expedit: & in summa, curam omnem, quæ convulsioni nervorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

CAP. XV.

HYOSCYAMUM potum aut comesum, similem Ebrys ab alienatione movet: sed facile medicamenti cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininum, si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficium decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semen ex passo sumptum, & vinum salsum cum adipe suilla recenti, passoq; itidem utriusq; semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium: & hæc singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodum qui vinum bibunt, ut excoquant.

Mandragora.

CAP. XVI.

MANDRAGORA si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulsa prod

proderit: postea nitrum & absinthium, ex vino dulci aut passo sumatur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorei, & rutæ, tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quod si agere renocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs vi conueniet.

Meconium.

CAP. XVII.

EPoto papaueris succo, quem meconion vocat, consequitur veternus cum perfrictione & pruritu vehementi, ita ut sæpe inualefcente veneno, tanta erumpat prurigo, ut hominem excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitione, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum: nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio & aceto mulso, vel cum saturiæ aut origani decocto, cum vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foveantur. Post lauerium prodest iurium pinguium usus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer. CAP. XVIII.

Quod corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuevit, quæ pa-

pauers succus nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum.

CAP. XIX.

Quod pharicon vocant, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem nervorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen aliqui vocauerunt aut spicae nardi duas drachmas, & myrrhae totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum.

CAP. XX.

Toxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorum sagittae eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguae inflammatione torquentur: incoercitus furor varias ijs imagines obuersat: quare vix medicinae locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur: rapi semen bibendum cum vino. Primitim ijs conuenit, quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus: roboris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus: malaq; cotonea trita esse, aut cum pulegio & aqua bibere, conueniet, amomum & balsami semen ex vino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquam vitam tempus degunt.

Ixi.

Ixia. CAP. XXI.

IXia, quæ xlophonon appellatur, inter potan-
dum aliquid ocymo simile gustu & odore redo-
let: vehementem linguæ inflammationē excitat:
mentem mouet: omnes excrementorum exitus sup-
primit: strepitum cum animi deliquio ciēt, ijsq;
intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post
vomitionem aluumq; resolutam, auxiliū præstat
aqua, in qua absinthiū maduerit, ex vino largio-
re, aut aceto mulso pota: rutaq; syluestri semen,
aut laseris radix: item tragorigani decoctum, cum
aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina tere-
binthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio,
quorū singuli oboli conueniunt. Quin & nuces in
glandes ex vino, cum resina, castorio, & ruta tri-
ta, ita ut singula drachmæ pōdus aquent. Itidem
chamelææ aut thapsiæ aut absinthij succi sicilicus
cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

Cerussa. CAP. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim,
mox palatum, gingiua, lingua, & commis-
suræ dentium, candore quodam inficiuntur: sin-
gultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: ijs
extrema frigescent, mens labat, membra torpe-
scunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut
ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut
sesamam ex vino tritā, vel lixiuiam ex sarmentis
factam, amaricinum oleum aut irinum, persico-
rum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum

ihure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod vlmus plorauit, aut humor quem vlmica folia reddiderunt, cum tepida aqua: sed tum quoque vomant. Conuenit etiam thapsiae succus, aut scammonia, cum aqua mulsa potus.

Fungi. CAP. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia laedunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes concitant. Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi: mirifice iuuat lixiuia ex sarmentis aut pyraetri surculis, epota cum sale, posca & nitro. Fructus, aut folia pyraetri cum fungis decocta, strangulantiem illam vim auferunt, esitataque eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiae drachma: item absinthium cum vino melleque sumptum, & ex aqua potum: apiastrum ex nitro, panacis radix & semen in vino, fex vini cremata cum aqua, atrametum sutorium ex aceto: radix, vel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum. CAP. XXIII.

Lapidescens gypsum strangulationem creat: quare eadem proferenda sunt, quae mansis fungis, auxilia, & ad haec maluae decoctum, quod etiam olei vice pensat: utpote cum pingue sit, euomendo lubricas vias & faciles reddit, deradique corpora non sinit. Quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest oleum ex aqua mul

mulsa, aut sicorum decocto: & lixiua è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiosiore pota: & origanum aut thymum cum lixiua, aut aceto, aut passo: hîq; decocto malua proluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

Tauri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatamq; concitat: faucium tonsillarumq; meatus cum nervorum distentione praecludit: lingua rubescit: dentes inficiuntur, & quaedam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restant. Quare vomitum vitabimus: sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gula inculcatur. Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem discutiant & alui subducunt. Grossi lacteo succo turgentes ex pisca, & nitrum per sese, auxiliantur: nec secus coagulum omne cum aceto & laserpici radice, aut lasere iidem & brassica semen, & è cinere ficulneo lixiua: conyza folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Ius qui seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri consueverunt. Stomachum aluumq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

Lac coagulatum. CAP. XXVI.

Eos qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sepius cogimus. Damus & calaminthæ folia arida,

da, item succum: aut laserpitij radicem, aut laser cum posca: thymumq; ex vino, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in cascum densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gula angustias insinuans, strangulat.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, ventri, & intestinis grauitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina vulnerat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plumbumq; deformitatem concipit. Quibus si aduenit secundum vomitionem, potum syluestris homini semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis simum, cum nardo & vino.

Argentum viuum. CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ spuma argenti infert, eisdemq; vtendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

CAP. XXIX.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum & intestina cum vehementi erosionem excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admiſtu illorum acrimoniam hebetant, ac solvunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi ibiscus & malua succus est: natura enim utriusque perlubric

brica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen
tragi herbae, vel oryzae, lacq; cum aqua mulsa co=
piofum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium vi=
rus olent: procedente tempore, alius dolo=
re afficitur & urina sistitur: et si
quando eam reddere contingat, purpureum colo=
rem referet. Omne piscis genus auersantur, &
odio habent: fetido ac graui sudore manant: bis=
liofus vomitus, interdum sanguini promiscuus,
subsequitur. His dandum lac asininum, vel pas=
sum continuè, aut radicis maluae foliorumq; deco=
ctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut ve=
ratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum
aqua mulsa, puniciq; mali acinus. Cedria cum vi=
no efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, po=
tus. Sed cum pisces omnes respuant, aspernèturq;
solis fluuiatilibus cancris resciri possunt, bibuntq;
eos admisto vino, adiutiq; ab his percoquunt.
Cumq; appetere & comesse pisce cœperint, sua sa=
luta indicium habent.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

Rubeta aut rana palustris assumpta tumo=
res ciēt, pallor corpus vehementer decolo=
rat, ut planè buxeū spectetur, spirandi difficultas
torquet, & grauis halitus oris, singultusq; & in=
uita interdum geniturae profusio cōsequitur. Ad=
iuan

iuuantur secundum vomitionem multo meri potius, & arūdinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauari sunt.

Hirudo. CAP. XXXII.

DEuoratæ cum aqua hirudines, si ori ventriculi adherent, tractione partium, nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & cyrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum aceto, aut pota niuis globula, cum piscia. Nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniecta lupinorum farina, aqua frigida ore cõtineatur, & ad eam hirudines exiliēt. Prouidendum etiam ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen cæteris venenis pericula sæpius adferūt. Qualia sunt album veratrum, thapsia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones movent. Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coërcebimus. Neque negligenda quæ parū quidem nocere videtur: interim verò vitā in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, gith, noue glacies, pappi recètes: flores autē sunt eius spinæ quæ cactos dicitur.

Citur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, imminetia solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hæcenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclarè auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, et quod scinco temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione super sedemus.

Venenata. CAP. XXXIII.

DE bestijs quæ virus eiaculantur, & exitia libus venenis, ideò scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicū perducatur: siquidem pars hæc non minus quàm ceteræ aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conveniat. Hæc autem in summa fastidia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspicientibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui verò de amoliendis veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ
seq

sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum
quæ nonnihil auxilij ferunt. Omnia autẽ in prom-
ptu, & ad manum habere artificem oportet, pro-
pter urgentem sæpenumero necessitatẽ: siquidem
paucæ venenis & virulentis animantibus, tarda
& grassantia sensim pericula cient, ita vt dilatio-
nem admittant: pleraq; verò præsentaneam per-
niciem afferunt. Hominum autem partim malè
alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficiũ ita
temperant, vt spatium curanti liberum non relin-
quant: partim sceleris admissi conscientia, aut
tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ve-
neno, mortem sibi consciscere conantur. Qui post-
ea deprehensi, aut resipientes, & vitæ cupidi,
præsentaneam opem poscunt. Non desunt qui ho-
stiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; pu-
teanas hac labe polluentes, certam & inuitabi-
lem aduersarijs perniciem moliuntur. In quibus
ipsis etsi maleficiũ non subito, sed aliquanto
post grassari natura sua comparatum est, tamen
nisi primo quoq; tempore coërceatur, & remedijs
subinde excipiat, frustra tandem succurritur,
occupatis iam corporibus exitiali vi veneni. Pro-
inde non vulgari industria diligentiaq; in ea re
utendum est, vt quod in alijs incommodis ars con-
suevit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat.
Quin & apud priscos genus hoc vnum existima-
batur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat:
sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes
præc

præcautionem, & modum præcauentem, salubris
sanantisq; medium statuentes, parua & leui su=
pra modum persuasione decepti. Siquidem tres in
humanis corporibus constitutiones esse contien=
dunt: vnā, qua sani degimus: alterā, qua sini=
stra valetudine corpora laborant: tertiam, quæ
medium inter utrasque locū sibi vendicat. In qua
positi, sanitatem specie mēimur, facileq; in mor=
bos & pericula concidunt, ob vim corruptricem
quæ corporibus nostris incumbit: quemadmo=
dum in ijs videre licet, quos excandescens rabie
canis momorderit, necdum tamen aquam hor=
rent. In ijs quoq; qui cantharides hauserunt, sed
nondum vrinæ tormento cruciantur. Tripartitò
igitur artem digeri, tripliciq; corporis consti=
tutioni meritò respōdere tradunt. Salubrem par=
tem esse volunt, quæ sanitatem tuetur: præca=
uentem, eandemq; prohibentem, quæ obstat quo=
minus in morbos incidant: & sanantem, qua vi=
tia discutuntur. Quibus ita responderi potest,
quòd primū ex ista ratiocinatione non tres cor=
poris tantum, sed quatuor haberi constitutiones
fatendum esset: quippe vt aliqui sunt, qui necdum
morbo laborant, morbo tamen maximè ob impen=
dentem causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iam
priore morbo defuncti, nōdum tamen secundæ va=
letudini restituti sunt: id quod in ijs qui à mor=
bo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui vi=
rum recreationē & robur desiderāt. Sed quem=

Kk

admodum curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcēdas enim valetudines vehementibus vimur auxilijs, altiore scarificatu, vstionibus, amputatione, derodētibz epithematis, potionibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim vero sunt vsque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellēt, quæ morbos arceāt. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum verbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxiliare remediariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi etiam sua illa distributione partium eos complectuntur qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt: pesti tamen, propter obuersantis aëris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcēdorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus vitijs obnoxia nitamur, ut inoffensa valetudine degant, nec morbis conflētentur. Neque id silentio prætereūdum, quod maximè præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis constitutionibus respondere: sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à virul

ruentis animalibus venenisq; contrahuntur, vocari cacos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter questionibus observatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus verum apprehenditur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullum in quibusdam necessarijs usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cacos eos affectus concedimus, qui ab exitiis venenis, & animantibus quæ virulento morfu sæviunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datq; medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cecum, nullæ causæ obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis apprehenduntur. Diocles autem in eo commentario quem Plutarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbum ita scribens: Nosse quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in viperis, & scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quamvis exiguo sint corpore, vixq; conspectui subijciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quædam corporis exiguitatem.

vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morsu conficiunt, attingitur? quorum aliqua vehementes cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliatur. Aut quantulum est quod à phalangij morsu ingeritur, & vniuersum corpus extruciat? neque enim quis magnitudinem ipsorumprehendere posset, cum prorsus exigua mole constent. Ergo quod hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum quod exactè deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus molestiarum, quæ exorimur nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur vsque adeò contentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseneret, quàm à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat quod inter vtilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quenam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos ledat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit cum deprehensa est. Ideò Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit, inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo quem de causis scrip

scripsit commentario aptissime prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in venenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus irita medendi ratione contentos esse. Neque satisfacturam sibi observationem eam, quæ à causarum comprehensione separata est. Primum enim genere comprehendere facile possunt. Quod autem sit letifera vis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem vagantur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum verò subiungit: Ad aquam dulcem, & potui idoneam venit quis, & ante observationem ad vomitum, ad vulneris dilatationem, ad demorsæ partis suctum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vrètia medicamenta, aut ea quæ vim eadem adipiscuntur admonuit, postremò partem amputauit: secū reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre, & applicari solita, immisæ ad intima perniciæ repugnarent. Hæc itaque quæ disseruit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam negotiorum, quæ ipsa facebat, esse causam diffiteantur, verum rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palàm immissa vis φθοροποιός, id est mortifera, nominatur: φθοροποιόν autem nullius officij alius esse potest, quàm canisæ. Aiunt hæc nomina, μαρσίππος, & αἰνία

καλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enumero quem admodum in his vocibus μαρσιππιον & ἀνκαλύπτειν, partes neque certos neque principes retinet significatus: sic in hoc verbo φθοροποιον partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque causarum aliquas evidentes esse, quæ dum aduersam valetudinem crearunt, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, æstus, & similia. Quasdam continentes, quæ permanent postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus presentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, effectus augentur: decrementibus, minuantur: & cum desinunt, iidem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phiboropœon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit: quemadmodum accidit ijs qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque evidens causa neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phiboropœon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod aut

autem asserunt, vocabula quædam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda, & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia, sed perpauca talem nancisci conditionem existimandum est: neque enim $\omega\omicron\iota\varsigma\pi$ in hoc nomine $\phi\theta\omicron\rho\omicron\alpha\omicron\iota\delta\pi$ perinde atque assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim $\phi\theta\omicron\rho\alpha\varsigma$, id est corruptionis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc verbum $\omega\omicron\iota\varsigma\pi$ sumi debet, ut nihil amplius ex eo quod hanc dictionem $\phi\theta\epsilon\gamma\alpha$ secum habeat, declaret: neq; prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt, & huic simile redditur, $\omega\alpha\delta\iota\iota\chi\epsilon\iota\pi\delta\iota\psi\theta$. Si dant à corruptione sanis fieri morbum, concedunt utique vim in huiusmodi verbo $\omega\omicron\iota\varsigma\pi$ subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quæ corporibus subiiciuntur, idq; tam in letalibus venenis, quàm in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verum nonnihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, non exactam diuisionem assumentes. Qui verò se dogmaticos proferunt, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt: ut inguinum vlcus, & inguinariam febrim, & quæ affectui tum assistat, tum etiam separetur, ut à fractis præcipitatio. In summa, quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione cõprehenditur.

vitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ
idem genus sortiuntur. Sed quòd phthoropicon
causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs
quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud
causæ arbitrantur esse post impressum à serpen-
tibus ictum, quàm ex animante vim, & illapsum
in corpora virus? Neque enim frigus, neq; æstus,
neque sectionem corporis, neque cruditatem, neq;
aliud quicquam simile causari possunt. Verùm
quoniam causarum differentijs gaudent, & ali-
quas continentes, alias evidentes appellant, ipsis
dicendum, utroque istorum modorum evidentem
quidem causam esse, quod affectum præcedit, &
quod corporis substantiam præoccupat: continen-
tem verò, quod morbis præsentibus adest, qua se-
parata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de
ijs hæcenus. Statuendum itaque moriiferam vim
intrinsecus manifestissimã esse causam, ipsamq;
principem facere scopum oportet. Et antequam
ad ima decumbant morbi, varijs modis est cer-
tandũ, donec vis tota corporibus excutiat. Mo-
dò enim reuocari debet ea parte, qua pestis in-
trauerit: modò aliqua alia, præsertim principa-
tum non obtinente, aut è coërceatur, quàm altius
irrepens viscera tangat: aut eius perniciēs elua-
tur, retundaturq; cum iam membratim peruaga-
tura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vo-
mitionibus: si morfu impressa, scarificatione, af-
fixis cucurbitulis, exuclis, carnis circumscriptione,

ne,

ne, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur. Retinentur verò infusione, & impo-
tu medicamentorū acrium cohibentur. Hæc simul
vtique arcere virus, & eluere possunt. Restin-
guuntur, & euincuntur meraciore potu, aut passo
nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quæ acri-
monia sint prædita. Postremò deiectio alui, euo-
catus sudor, & alia quædam in commune, quæ
membratim demonstrabimus, auxiliantur. Ve-
rumenimvero non letiferam modò materiam, sed
& magnitudinē, & tempus, pro scopo considera-
re oportet. Etenim ab ijs remedia quàm plurimū
discrimen capeffunt. A magnitudine quidem,
cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus
pericula minantur: alia putredines altas aut ex-
teriores excitant: alia vehemētissimos dolores aut
cæcos cient: alia rix medicamentis cedūt, & ma-
gis minimæ molestias excitant. Oportet autem
ea, quæ pericula ferunt, perniciosis auxilijs
expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe
absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus me-
dicamentis homines in discrimē adducere: in mi-
noribus verò, vehemētium auxiliorū iniuria cor-
pus lacerare. Finitio à temporibus in promptis
est: hoc enim subito in pericula, & præsentis mo-
lestias adducit, illud verò sensim, & dilatas in
diem longam aut breuiorem producit. Itaque in
acutis quidem confestim multa simul auxilia re-
præsentari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quæ

dam artis formula breuiter definita sint. Iam mem-
bratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum
ab eo. CAP. XXXV.

DE rabiosi canis morsu sermonem alijs præ-
posuimus, quòd id animal domesticum ac
frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agi-
tur, ac perit, ab eoq; cauere difficile: inde pericu-
lum ineuitabile hominem manet, nisi multis
utatur auxilijs. Canis plerunque flagrantissimus
æstibus in rabiem efferatur: interdum quoties
frigora inceserunt. Rabiosus autem potum, &
escam auersatur: largam spumantemq; pituitam
naribus, & ore proijcit: toruè & solito tristius
intuetur: in omnes passim sine latratu irruit, &
æquè feras hominesq; tam familiares, quam igno-
tos mordet: nec protinus infestum quicquam in-
fligit, nisi, ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille,
qui ab aque metu hydrophobicus Graia est voce
appellatus, contrahitur. Euenit autem cum disten-
tione nervorum, totiusq; corporis rubore, præ-
sertim faciei, cum sudore, & languore quodam.
Aliqui auræ splendorem fugiunt: alijs sine ulla
doloris intercapedine vexantur. Sunt etiam qui
canum more latratus adant, & obuiam factos
morsu adoriuntur, ac mordendo simili vitio labe-
factant. Proinde ex ijs qui hoc vitium senserint,
neminem seruatum vidimus, nisi forsitan ex hi-
storia vnum aut alteru euasisse audiamus: siqui-
dem

dem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fitemur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum cōcordia similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequam ipsam experiretur, vindicauimus: & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso.

CAP. XXXVI.

Ratio medendi duplex: una communis, qua utendum in omnes morsus, quos virulenta animantes impresserūt: alia peculiaris priuataq; eorum dūtaxat quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre cōsueuit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationē pertinent. Cancros itaque fluminales in sarmentis alba vitis cremare oportet, & cinerem eorū quā minutissimè tritum habere reconditum: itidē gentianæ radicē tusam cribratamq; reponere. Quoties autē canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris cancorum cochlearia, vnumq; gentianæ conijciantur: hæc in polentæ dilutiori modum subacta, quatri-

duo

duo bibantur. Inter principia medicamentis hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu bini ternive dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque vnum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil ceteris uti prohibet. Satius autem multo fuerit etiam si in vanum recidat, medicamentorum in manus tolerare cruciatus, quam per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora vulnera vereri oportet, uti minora, & vlcusculis cutis similia: quippe maiori vulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaustire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpellum circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsellula carnem amputare oportet. In virisque circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitula cum multa flamma agglutinata id inuamenti præstant, ut veneni vis extrahatur. Contra virulentos ictus, vstio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cetera viribus præstet, simul quod virus domet, & ferri penitus non patiatur, simul quod pars ignem experta, postea non vulgare fundamen

mentum curationi futurae præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crusta decident, ne vlceris ora coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tempus, vlcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritum: item cepe, succusq; præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tam mansa quàm non mansa imponantur: siquidem subacta pistatæ à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat: verum id certum non est. Cæterum tempestiuus eorum vsus minimè est contemnendus. Si verò, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi verò propositum tempus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendū, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus: nec multo post sinapismo vtendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

CAP. XXXVII.

QUæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum victus rationem ex ijs quæ veneno aduersantur, cōiectura

Etura quadam colligere oportet, simul ut veneni vires hebetet restinguatq; , simul ut arceat, quo minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta perniciosarum virium penetrationi resistunt. Quorū virunq; præstare potest vini meracioris, passi, et lactis potus: quippe qui hæc omnia capiunt ad curam, nonnihil veneno obijciūt, quod omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorum, porrorum, ceparumq; cibis: quod ea difficulter conficiantur, vixq; aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanēt, quo tēpore nec euincuntur, nec permutātur à mortifera vi, sed contrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorum vsus accommodatur, & theriaces, Mizridatij, & eius quod eupatorio temperatur. Denique omnium quæ magnam aromatū partē sibi vendicant: quippe aromata omnia viribus & substantijs agrè permutantur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet: Nosse conuenit, pauorem aquæ non statò definitoq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimū vsque diem neglectus differri consuevit. Post semestre etiam nonnullos inuadit: quendam post annum aquam horruisse constat. Quæ nobis visu cōperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorforum à cane rabiosa curandi ratio talis est. Verum enimvero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro carnem
 cit

circinare, nec vstionem experiri operæpretium est. Non enim quod iam pertransiit, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed in cassum corpora doloribus sternuntur. Alter verò curationis modus accedat. Deiectiono magnum præbet iuuamentum, utpote cum mouendo, corporis habitum transmutet: & quæ colocynthidem recipit hiera. Item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterum sudores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi sinapismi; alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus uti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam vitio tentato nemo vnquam seruare potest. Itaque primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus: iã ad alia, quæ venenatis morsibus scire consueverunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursim deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxili-
lium

lium præstare possunt. Postremò subnectentur etiam venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum, qui à venenatis demorsi sunt. CAP. XXXVIII.

DEmorsis à phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impacto aculeo rubet, nō intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit: ubi verò contrariorum occursum reflexit, consequitur corpore toto tremor, distentiones poplitum & inguinum, convulsionibus nō dissimiles. In lumbis collectio exoritur, & perpetua urinae libido lacepsit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor emanat, collacrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopendra aut dicta ophioclene, morsum intulit, locus per ambitum liuore sigillatur, & computrescit: interdumq; licet rarò, fæculentus atque ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus incipit, vlcusq; id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum: præterea toto corpore prurigo sentitur. Scorpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intensus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modò siquidem exæstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliuscule habet, aliquando vero recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem flatus exeunt, capilli eriguntur, pallor membra

bra decolorat & dolor, tanquam ex pungente
acu, per vniuersam cutem sentitur. Si marina
pastinaca percussit, protinus accidunt molesti
dolores, assidue conuulsiones, lassitudo, & im=
becillitas. Mens percussis labat, postea obmute=
scunt: oculi caligant. Percussus autem locus in
ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita
obstupescit, vt tangentem non sentiat. Hunc si
quis premat, atra sanies, crassa & male olens ex=
cernitur. A mure araneo percussus, circa mor=
sum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pu=
stula, diluta sanie turgens, exurgit: proximæ par=
tes liuent. Rupta pustula, depascens vlcus, non
ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum
quoq; tormina, difficultas vrinae, & frigida asper=
ginis offusio consequuntur. Si vipera momor=
dit, corpus intumet, vehementer arefcit, subal=
bidumq; colorem concipit. Sanies à vulnere pro=
funditur, primum suppinguis, mox cruenta: pu=
stulae adustis similes erumpunt: & antea depa=
scens vlcus, quod in proxima repens, non summa
modò corporis, sed intima quoq; corripit: gingi=
uæ ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa
iecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequun=
tur. Sopor, tremor, & vrinae difficultas accedit,
& frigidus sudor offunditur. Consimilia eue=
niunt ijs qui à cæcilia nomine, aut amphibæna
demorfi sunt, eademq; ferè auxiliantur: quare hoc
venenū priuatam descriptionem sortitum non est,

neq; visum est dignum quod alio genere comprehendatur. Adryno morsis pustule molestiq; dolores incidunt, præsertim quæ diluæ saniei emissarium subest: quin etiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab hæmorrhoo ictus vehementes cruciatus accidunt, qui angustia contractaq; corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus cruor effluit, & quacumq; parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Excrementa per aluum cruenta eijciuntur, profluensq; sanguis in globis coit. A pulmone sanguinem extusum sunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; usq; eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine vlla intercapidine excruciet et si potum pleno ore assatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs qui antea potus nihil hauserint. Quare propter continuam sitim, & prester, & causon, aut dipsas appellatur. Ab natrice demorsis vlcus dilatatur, & lividum ac ingens evadit. Sanies ex eo multa, & atra, & male olens, non secus atque ijs quæ serpunt ulceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est, putridum vlcus sequitur. Carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumide, defluunt. Lethargo corripuntur, & veterno pressi somnos captant. Erasistratus eos iocinare, intestino ieiunio, coloq; conflictari auctor est. Quippe
dis

dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. A cerasæ percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. E plaga sanies profluit, modò atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale interdicitur: mens labat, & oculorum caligo exoritur: deniq; rigore nervorum distenti commoriuntur. Ab aspidè ictus vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaucta acu citra tumorem conspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit: At vir perit absq; labore, virens atq; discolor: mediocris stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellitur: genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillant. Hos mors tollit, ad diei trientem non dilata.

Erasistratus in libro quem de medicaminibus & venenis condidit, de vocato basilisco sciè ita refert, Cum basiliscus momorderit, vulnus ad auri colorem efflauescit. Itaq; in plurimis quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se habent. Transerentes utiq; ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. CAP. XXXIX.

ADuersus quidem omnem animalis ictum, quod venenum vibrat, oris suctio conuenit. Sugentem verò oportet ieiunum nō esse, sed & ci-

bum sumpsisse, & vino os abluisse : postea exi-
 guum olei in ore continens plagam exugat. Lo-
 cus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus:
 sed vlcuscula altius imprimere expedit, quo viro-
 sa materies profundo euocetur. Circinatio autem
 carnis, & sectio, scarificatione longè potentius
 opitulantur: nanque ab ijs duo peculiaria præ-
 sidia sunt. Vnum, quod virus è loco tollitur. Al-
 terum, quod eius veneni pars, quæ ad interiora
 grassatur, cum multo copiosoq; sanguine excerni-
 tur. Quod si locus sectionem non admittat, cucur-
 bitula cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed
 iam de vstione suprâ in rabiosorum morfu disse-
 ruimus. Si verò icta pars, utpote extrema, eam
 sectionem commodè non respuat, præsertim in
 omnibus serpētium ictibus, ut aspidis, cerasæ, si-
 miliumq; proculdubio amputanda est. Conuenien-
 tiora suprâ dictis auxilia sunt, quæ epithemata vo-
 cant. Imponatur sarmentitius cinis, aut ficulnus,
 cum lixiuio stillatitio subactus, garo, & acris sal-
 samento: porri, cepæ, & allia modò minutissimè
 contrita illiniuntur, modò cremata vulneribus inij-
 ciuntur. Quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum
 maximè tepent, percussò loco applicentur. Nec
 desunt qui huc tanquã discordia quadam natu-
 rali pugnantibus viantur: verum huius rationem
 inire facillimū fuerit. Gallinæ enim calida natura
 præditæ sunt, argumento, quod deuoratum insigne
 virus conficiunt, & aridissima quæq; semina con-
 sum

sumant : item nōnunquam arenas lapillosq; inglu-
nie sua deuoratos, dissolunt. Itaq; animantis ad-
moti calore adiutus spiritus, ab icta parte impe-
tum capessens exiliensq; secum venenum exigit.
Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum
spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam ha-
bent, & appensam fasciam: tūc enim maximè ser-
pentium iniurias expauescunt, tum propter spici-
legij tempus, tum quòd opacis simul abditi & spe-
luncis & cauernis, densiq; aruorum cespite deli-
tescunt. Molestissima enim animalia & virus
eructantia, Aegyptus in campis ferre consuevit.
Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, mor-
sum intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis
coniiciunt, & semel aut iterum brachium aut
crus paulum supra vulnus obligant, & arctissi-
mè duo è presentibus dstringunt, locumq; secan-
tes qui circumactus est laqueus, picem instil-
lant. Cumq; satis vulnus excepisse videtur, la-
queum resoluunt, & cepis alijsq; supra memora-
tis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito
& feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugi-
ter innouetur. Conuenit & cedria, & finum ca-
prarum ex vino decoctum. Locum aceto calido,
calaminiha in lotio, maris aqua, aut acida muria
decocta, foueri salutare est. Quinetiam non desunt
emplastra vehementissima, & calidissima, quæ
venenum elicere, expugnare, & discutere possunt.
Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, &

cachrye componuntur: de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodilive sanguinem ovaq; , testudinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quaedam literis tradidisse videntur, planè in hac sola incidentibus impulerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficile, nisi regia facultate, peruestigari possint: neque, quò nostra fides ijs obstringatur, frequentiori obseruatione, sufficiens experimentum praestiterint. Quae autem ad communem omnium usum pertinent, quaeq; facile suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaq; , Erica, & astragalus, cum aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Item bitumen, & virescentes plantani pilulae in vino diluto coctae, & paliuri decoctum: radix aristolochiae, & eryngij: decoctae etiam lauri baccae & deuoratae, piperq; largius esiatum, ruta, anethum, & cyclaminus: comaporrorum priuatim ex pane, aut allium, aut cepae, salsamentaq; quam acerrima: origani decoctum cum vino potum, feniculi, pulegij, calaminthae, porrorumq; succus cum melle desorptus. Haec quidem à plantis conquiruntur. Ab animalibus verò quaedam vtiliter peti solent, gallinaeorum cerebella in cibo, leporinum coagulum cum vino, iidem castorij sextans: testes mari-

ne

ne testudinis sumpti multum prodesse traduntur mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Commendatur in primis exenterata, quæ sale siccescens inueteratur, ex qua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus, quæ dari solent hæcenus. Percussis à serpente prodest alui deiection, diffluens sudor, urina copiose reddita. Sunt & composita quædam potiones, quæ mira remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicum: ea melle excipiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dantur cum vino. Itidem sylvestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones trita, & cum erucæ succo subacta, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent: dantur ex ijs terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia virulentorum
ictuum. CAP. XL.

INter ferientium venenatorum notas nihil de vespijs & apibus articulatim digestimus, quod conspicue omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficul-

neum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fctus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito & vino, imprimatur, aut radice sylvestris punice quàm tenui tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris proluerentur, aut apias tri decocto, foliaq; eiusdem illinenda. In uacris perpetim utendum, & propinandum. Roton seminen, anisum, aristolochiam, cicer, fenest, cuminum Aethiopicum, cedrides tritas, plantani corticem, & trifolia herbae semen: prout autem, singulorum ex ijs binis drachmis dare cum vini hemina conuenit. Item myrice pilulus, & chamæpit yos, & viridiu cupressi pilulæ decoctum, admisto vino. Sunt qui flumatis cæteri expressi succu, cum lacte, assumpto apij semine confestim molestijs liberare prodant. Si scorpionis morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus ex aceto vulnere inspergendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locustæ acida muria fruendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpillum, aut calamintha, aut ruta sylvestris. Percussis à scorpione, præsent est auxilio ficulneum lac in vulnus instillatum. Scorpium ipse qui ictum vibravit, tritus, & pressus loco impressus, sue plagæ remedium est, ob eam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. Præterea tritus & impressus cum sale, lini semine, & althæa, scorpium conuenit. Sulphur igneum

ignem non expertum, resina terebinthina exce-
ptum. & emplāstri modo adiectum auxiliatur.
Galbanum ad splenij formam ductum, &
calaminta, quæ trita illinatur, & farina hordei
in vino posita, in decocto rutæ. Semen trifoliæ
herbæ tritæ, & vulnere iniectum titulatur. Hæc
ad effectum huius pertinent. Post hæc quàm effi-
cacissimis rationibus utendi, cuiusmodi sunt ari-
stæolæ, & reserum corticis binæ drachmæ cum
rosmarino, & pulegium decoctum, & bac-
cubum paulo numero tritæ, & calamintha cum
p. an quæ magnopere discoqui debet: cupres-
sus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac. la-
serpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani suc-
co utendum. Efficax est potus trifolij, & ocymij
semen. Horum autem omnium vicem pensat in-
guis lauari vsus, euocatus sudor, & dilutæ vini po-
tiones. Ei qui marina pastinaca icitur, omnia
quæ de viperarum morsu paulò post referemus, si-
mili modo conueniunt. Peculiariter autem ictus
à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui
molestos cruciatus cient: interdum autem, sed ra-
rò, nimias excitant. Quibus absinthij, saluæ, aut
suloburis ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca
dilatata & vulnere imposita, sui ictus medela est.
Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galba-
no spleniũ, per se vulnere exterius impositum, ut
medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea fa-
rina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse

qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus
sui veneficia luit: resistunt quoque acini dulcis pu-
nici decocti, & illiti. Item porri, & allia contri-
ta, necnon aquæ calidæ fotus: sed hæc ad locum
pertinent. Prodest pitum abrotoni decoctum, ma-
ximè si in vino detur. Præterea serpillum, & gal-
banum, & eruca vino madesacta, recētes cupres-
si pilulæ cum aceto, & cyclaminus ex aceto mul-
so, & pyrethri cum vino, & chamaeleonis herbæ
radix. Nec desunt qui literarum monumen-
tū diderunt, tritum murem araneum contra
ictus commodè bibi. Quam historiam apud alios
inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ an-
notaretur. Alij asseuerant demorsum non aliàs
exulcerari, nisi prægnās mus araneus fuerit: tum
sanè auxiliari ferunt. Si vipera morsum im-
pressit, simum caprinum cum vino, studiosè im-
positum opitulatur. Item laurus, & abrotonum,
& galbanum splenij loco superiectum, & origa-
num viride inditum. Pulli gallinarum discerpti,
& confestim admoti: erui farina vino subacta:
radicis cortex usque eò tusus, ut in puluerem solu-
tus abeat, & scilla tostā: detritum chamæme-
lum hordeaceæ farinae cataplasma in aceto mulso
præparatum: sed locus antè eo calido foueatur.
Hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus ru-
bus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui fo-
lio constantem auxiliari produnt. Leporini coagu-
li in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi
hem

hemina in mero, & foliorum apiastri succus, &
 syluestris ruta: hæc in vino potari debet. Vinum
 frequenter bibendum, allia mādenda, & cepæ, &
 porri recentes, falsamenta acerrima, & opi para.
 Simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclare
 auxiliatur medicamentum, quod myrrha, piperis,
 castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio
 acetabulo constat: hæc omnia in Cretico passo
 teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo
 libro qui περὶ διωκτικῶν, id est de viribus, in-
 scribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis ab vi-
 pera auxilium ferre possunt: inter quæ talia ma-
 ximè laudantur. Gallinacea cerebella cum vino
 pota, semen sativæ brassicæ tritum, & acetabuli
 mensura cum vino potum. Quinetiam bonū est di-
 gitum in liquidam picē intingere, deinde vinum,
 quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ
 contra viperae ictus auxiliantur. De amphibana
 mentionem hoc loco fecimus, quoniam ferè reme-
 dijs ad viperæ scriptis, percussi ab ea adiuuari so-
 leant. Adryino ictis conuenit aristolochia cum vi-
 no pota, trifoliū herba, radix hastulæ regiæ simi-
 liter assumpta, & fructus ex omni quercus gene-
 re, & iusæilicis radices, & illiæ parti ictæ auxi-
 liantur. Hemorrhoidisq; morsus velut im-
 medicabiles à plerisque maiorum deplorati relin-
 quebantur: quare si peculiaribus contra dipsa-
 dem remedijs egeamus, cōmunia experiri operæ
 pretium erit. Protinus autem scarificatione uti,
 vñtion

vñtionem facere, & si locus patiatur, extremorū
 amputatione opus erit: consequenter quā acer=
 rima cataplasmata admonere, de quibus sepe nu=
 mero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maxi=
 mē à salsamentis, vtilēs esse. Meracæ potionēs &
 lauacra prosunt, quæ subinde interiecto breui spa=
 tio assumenda sunt, priusquam morbi genus emer=
 serit, quo semel erumpente, opem ferre non potest
 vlla medici opera. In iclu hæmorrhoi eadem pro=
 sunt. Insuper quæ in commune opitulantur, vt sca=
 rificationes, vñtiones, acres cibi, meraci potus, &
 quæ nunc in dyspnoea definiuimus. Quinetiam de=
 cocta vitis folia, & cum melle trita. Si morsum
 natrix adegit, prodest origanum tritum & aqua
 subactum, luxuria cum oleo indita, aut aristolo=
 chie cortex, aut querna radix minutim contrita,
 & hordei farina cum aqua & melle colliguata.
 Bibuntur etiam binæ aristolochie drachmæ in
 potione poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij
 succus, vel decoctum alterius cum vino. Fauus
 recens datur in aceto. Morfs à cenchridio auxi=
 liatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, &
 satireia trita, & syluestris ruta, & serpillū cum
 duabus hastulæ regie drachmis, & tribus vini
 cyathis, aut aristolochie radix. Item cardamo=
 mum & gentiana. Si ceras tes percussit, cita
 partis amputatio suffragatur: quare sine mora
 iclam partem amputare, aut scalpro confestim
 circumcidere, & ijs similia prosequi oportet.

Vren

Vrentia insuper reliquis admonenda: siquidem
virus hoc veneno basilisci simile est. Iis qui ab
aspide feriuntur, quæ de ceraсте scripta sunt
auxilia dari debent. Nam venenum hoc,
quemadmodum basilisci, aut sanguis bu-
bulus, celeberrimè in arterijs sangui-
nem cogit. Ad basilisci morsum,
vt Erasistratus author est,
auxiliatur caſtorij drach-
ma in vino pota: item
papaueris succus.
Ictuum reme-
dia ita se
habent.

SEXTI ET VLTIMI
LIBRI FINIS.

NOTHA ET DIO-
SCORIDI FALSO
adscripta, quæ ut facile, si quis ita uelit,
suis singula locis applicentur, numeris
notantur: quorum primus Dioscoridis
paginam, secundus uersum signat.

6. 12. Iris ab aliquibus Illyrica, ab alijs thel-
pide, ab alijs vrania, à nonnullis catheron aut
thaumastos, à Romanis marica radix, à quibus-
dam gladiola, ab alijs opertricos, ab alijs conse-
cratrix, ab Aegyptijs nar appellatur.

8. 2. Aliqui choron aphrodisias, Romani ve-
neream, aut radicem nauticam, Galli piper apium
vocant.

9. 6. Romani iunci radicem aut iuncum.

13. 23. Magi sanguinem Martis, Latini per-
pensam, alijs bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij
cerea, alijs nardum rusticum, Galli bacchar, He-
trusci succinum: odorata herba est, qua in coro-
namentis utuntur.

15. 8. Quibus odor inest cinnamomo proxi-
mus: asperum siccumque solum amat. Eius radix,
ruptis, conuulsis, in tussi vetere, & spirandi diffi-
cultate, & si urina egrè redditur, opifera est: men-
ses ciet: contra serpentium ictus, eam in vino bibe-
re salutare est. Folia, ut quæ adstringat, illita ca-
pitis doloribus, oculorum inflammationibus, inci-
piunt

N O T H A.

pietibus egilopys, mām̄is tumētibus à partu, ignē
bus sacris auxiliatur. Odor somnū gignit. Crate=
nas herbarius de eo ita scriptū reliquit. Asarum.

24. 17. Alij sphagnon, alij phasganon, Syrō
diaxylon vocant.

27. 5. Ab aliquibus caſtor, ab alijs cynomor=
phas, à magis Hercules sanguis appellatur.

28. 23. Symphyton aliqui vocant, alij persicā,
alij medicā, alij oreſtiū, alij neſtariō, alij cleoniā,
alij idēabaton, aut phlomiū idēum, Latini termi=
naliūm, aut enulam Campanam, Aegyptij lenen.

68. 29. Iuniperum parvam Græci arceuthi=
da, aliqui mneſitheum, alij acatalidem, Aphrō
zurinſipet, Aegyptij libyūm, Galli iupicellum,
Romani iuniperum vocant.

69. 15. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus ma=
gna, quam aliqui sylueſtrem cupreſſum appella=
lant, alij mneſitheum, alij acateram, Romani iu=
niperum, vulgò cognita eſt, cupreſſo aſſimilis: aſpe=
rus maritimiſq; locis plerunq; naſcitur, eaſdem
quas ſupradicta vires habens.

69. 17. Brathy, alijs baryton, alijs baron, Ro=
manis herba Sabina appellatur.

76. 7. Rhamnum alij perſephonion vocant, alij
leucacantham, Romani ſpinam albam, aut cerua=
lem ſpinam, Aphri atadim.

67. 21. Halimum alij damaſonium vocant, alij
erymon, alij britanicā, alij rhabdion, alij baſilion,
magi Mercurij baſim, aut Oſiridis diadema. alij
elyſt

D I O S C O R I D I S

elystephanon, aut sacrum caule, Pythagoras anthenoros, Aegyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri, alij asariphen. Latini albucium aut ampeluciam.

85.6. Agnon aliqui agynon, alij lygon vocant, alij amictomænon, alij tridactylon, magi semnō, alij hemaideos. Aegyptij sum, Romani salicem marinam, alij piper agreste, alij lecristicum.

122. 20. Eorum venter sale conditus, & in umbra siccatus, contra eximias vacuationes medicamentorum, trium drachmarum pōdere, praesenti est auxilio: quandoquidem protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

158. 18. Telin, alij carpon, alij buceron, alij egoceron, alij ceraitidem, Latini fixum graecum appellant, Aegyptij itasin.

159. 5. Aliqui linocalamin vocant, alij annon, alij linon agrion, Romani linum, Pæni xeraphoës.

164. 15. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij brechon vocant.

165. 10. Gongylen satiuam, alij gongylida, alij golgosium, Romani rapum vocant.

166. 10. Alij polyides eryngiū, Aphrit horphat.

167. 5. Syluestris raphanus, quam Romani armoraciam vocant, alij montanum raphanum, alij apium, alij ischada, alij chamaebalanum. Romani etiam radicem syluestrem: ramulos tenues, iunceos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs rutæ syluestris, oblongioribus, & angustioribus

NOTH A.

ribus: semine paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lactea succo madet. Pars radice superior vomitione bilem pituitamq; extrahit, inferior per aluum, tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succu extrahere, radix tusa in ptili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesquibolo potus, utraque parte purgat.

168.12. Romani napium dicunt.

168.14. Aegyptij echlotripam appellant, alij riplam, Romani blitum, Daci bles.

168.21. Pythagoras anihema vocauit, Zoroastres diadema, Aegyptij chocortem, magi lienem capræ, aut muris urinam.

169.12. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij ochi vocant.

169.19. Cramben Romani brassicam vocant.

170.22. Romani rusticam appellant.

172.13. Portulaca syluestris. Cap. Syluestris portulaca, quam aliqui ai Zoon syluestre vocant, alij telephon, Romani illecebram, aliqui portulacam. Aphri meemoen, Daci lax, Aegyptij mochmutim, folijs pusillis, ad satiuam accedentibus, hirsutus, latioribus: nascitur in petrosis, nonnunquam in hortu, folia oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubentes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantum sulfi. Vis ei excalectoris, acris, exulcerans: discuit.

Mm.

DIOSCORIDIS

strumas, cum axangia illita.

173.3. Aliqui petræon, alij myacantham, alij myon vocant.

173.27. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probation, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneurō, Magi eurechnemona, Aegyptij asomh, Romani plantaginem, Hispani thesaricam. Pœni atyrcon.

175.10. Syri ius plantaginis, & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia cōpertum est.

175.12. Aliqui aquatilem anagallida, alij darenion, alij lauer, alij schinon aromaticū vocant.

175.21. Alij Veneris coronam, Romani veneram, aut eusteralem.

176.24. Aliquibus animonos, alij astrion, Pœnus atirsite, Romanis caciatrix, alij stilago, alij sanguinaria dicitur.

177.2. Sōchon asperū alij cichoriū vocant, Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem.

177.26. Alij picrida appellāt, Aegyptij agon, Romani inubum.

180.9. Thridaca hemeron, Romani lactucam sativam, Aegyptij embrosi dicunt.

180.21. Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrū, Romani lactucam sylvestrē appellāt.

181.3. Romani bisacutū, Aegyptij dorisatrum,
Syri

NOTHA.

Syri adonium, Aphri tirieta appellant.

181.16. Romani herbam scanariam, aut aculam nominant.

181.21. Alij caucum, alij myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedem puli, Aegyptij seselin vocant.

181.28. EuZomon Romani Erucam vocant, Aegyptij ethrericem, Pæni asuric.

182.27. Alij cynomorion appellant, à similitudine canini genitalis, alij leonem, Cypry thyrsinem, communiter lycon.

185.27. Crommyon aliqui polyidos vocant, magi calabotim, Romani cepam.

186.26. Græci scorodon, alij geboscon, alij elaphoboscon vocant.

188.9. Romani sinape vocant.

189.9. Cardamon alys cynocardamon, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis nasturtium dicitur.

189.25. Aliqui thlaspidion, alij sinapi persicum, alij myiten, alij sylvestre sinapi, alij dasinophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij suitepsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedem gallinaceum vocant.

190.20. Aliqui chamæplion, magi Herculis alphita, Aegyptij erethmon.

194.4. Ab aliquibus cerdon, ab alijs catharissis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamærrhyton, à magis callirrhylon, ab Aegyptijs æno, à

DIOSCORIDIS

Pœnis syris, à Latinis lanaria herba aut radice-
la appellatur.

194.18. A quibusdam cissanthemon, ab alijs
cissophyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyo-
theron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphalites,
ab Osthane aspho, à magis miaspho, Aegyptijs
thesce, à Romanis rapum terræ, aut terre umbili-
cus, ab alijs arcar vocatur.

160.14. Dracunculus. Cap. Draguntium ma-
gnum aliqui aron, alijsaron, alijsaron, alijs hiera-
cium, alijs hiaron, alijsarmiagrion, alijs ciperida vo-
cant: in umbrosis sepibus gignitur. Caulem habet
rectum, leue, duum cubitorum, baculi crassitudine,
versicoloribus draconum maculis, purpureis tamẽ
eiucentibus: folia rumicis, inflexa: fructum sum-
mo caule facit, racemosum, coloris primum cine-
raci, mox per maturitatem in crocum & purpu-
ram vergentis: radicem prægrandem, rotundam,
candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, &
dum maturescit, succus exprimitur, siccaturq; in
umbra. Radix quoque messibus effoditur, elotaq;
particulatim conciditur, & funiculo transfixa
siccatur in umbra. Cum diluta potione, crudam,
coctamve, cum melle delingi prodest, contra or-
thopneas, rupta, conuulsa, tussim, & destillatio-
nes: pota cum vino venerem stimulat: vlcera quæ
cacoëthe vocantur atque phagedenica, expurgat,
præsertim cum vite alba: ex ea & melle collyria
ad fistulas & partus euocandos componuntur: ad
vit

vitilignes cum melle, efficaciter illinitur: polypus
& carcinomata absumit. Succus ad oculorū me=
dicamenta, item contra nubeculas, caliginem, al=
buginesq; effectum præbet: herbe radicisq; odor,
teneros conceptus abortu vitiat: item si triginta
grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc=
cum cum oleo aurium doloribus insudere: quin=
etiam folia, vipote quæ adstringant, vulneribus
recentibus imposuere, & cocta in vino pernioni=
bus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem
exemerit, posse à vipera ferri inficiantur.

197.23. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracō=
tiam, Cypri colocasion dicunt.

198.13. Græci asphodelon, alij narthecion, Ro=
mani albucum vocant.

199.11. Floret messibus albucum. Quare aequi=
noctio verno, antequam semen adoleuerit, deme=
tendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupidita=
tem inhibere, quod herbarius Crateus assene=
rat: addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ
pondere bibatur.

200.7. Cocti cum polenta, & ex suillo adipe
impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad sup=
purationem perducunt, & rumpunt.

202.4. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij
coruimalum, alij ophioscorodon, alij phyllostæ=
phylon, quidam thalliam, aut petream, alij olo=
phyton, alij ionitè, nonnulli oligochloron, aut acon=
tion, aut hippomanes, alij trichomanes, magi po=

DIOSCORIDES

tera, alij peniheron, aut cor lupi, alij atoschorodon, alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum finapi, aut inturim, Aphri herbiæathon.

203.16. Ranunculum aliqui syluestre apium vocant.

204.8. Anemonem, alij agriam, aut nigrā vocant, alij anemonem phœnicam, alij enemion, nōnulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinen aut barbylam, Osthānes berilion, item ornios ceranion, Pythagoras atractilida, magi cnicum agriam, Aphri chuffit, Romani orci tunicam.

205.16. Aliquibus ænone vocatur, alijs anthemus, alijs homonœa, aliquibus flos campestris, Romanis concordialis, aut pergalia, alijs liburnia, Gallis corona.

205.22. Ea, ut herbarius Crateus author est, contusa cum axungia, strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro, & sulphure ignem non experto cōtra vitiligines efficax est: easq; sicco linteo antea confictas in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Altera argemone. Cap. Altera est Argemone, quam artemonen aliqui, alij arselam, aut sarcollam vocant, Romani argemoniam. Ea folijs syluestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones impositas sanat: oculorum inflammationes mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur: vulnera conglutinat: cōuulsis, & vellicatibus imposita medetur, inflammationibus utilis, contra
ser

serpentium morsus cum vino bibitur.

205.24. Anagallis purpurea, quibusdam aëria
tis aut ægitis vocatur, alijs sauritis, magis oculi
sanguis, aut chelidonium: Romanis macia, Hetrus
scis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphron.
Anagallis communis, quibusdam corchoron, alijs
halicacabon, alijs Xeliaurus, magis nyctleritis,
Aegyptijs mecij, Romanis aneciaton, Aphris asir-
risœ.

206.12. Aliquibus citharon, alijs cissaron, a-
lijs chryscarpus, alijs poetica, alijs corymbethra,
alijs cyssion, alijs dionysia, alijs iithytherion, alijs
persis, alijs cemos, alijs asplenos, Romanis fylua
mater, alijs hedera, Gallis subites.

207.17. Chelidonium magnam nonnulli pœo-
niam vocant, alijs cruceam, alijs aubium, alijs glau-
ciam, alijs pandios radix, quidam philomedion,
alijs othonon, Romanis fabium, Galli thonan, Ae-
gyptij mohoth, Daci crustana.

290.13. Auricula muris. Cap. Myosota alijs
myoton, alijs anthyllion, alijs alsinen, nonnulli
myorthochon, alijs myrtosplenon, Latini muris au-
riculam vocant, Aphri labatholabat. nomen ideò
accepit, quòd muscutorum aures folijs imitetur.
Lucos & sabulosa loca amat, ideò alsine dicta
est. Ea helxinæ similis, sed humilior, ac folijs mi-
nor. Vim refrigeratorem habet, oculorum inflam-
mationibus còuenienter ex polenta illinitur. Suc-
cus eius aurium doloribus instillatur: in totis ea-

D I O S C O R I D I S

dem potest, quæ helxine.

209.24. Isatis sativa aliquibus augion, alijs egne, magis arusion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

210.3. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, sativum glastum, luteum florem, tenuiores, multifidosque ramulos proferre, in cacumine autem folliculos linguæ speciem representantes, in quibus semen continetur melanibio simile, caulēque supra binum cubitorum altitudinem attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiorē: florem purpureum, aut cœruleum, fructū cruciformem, asperum, in quo semen, folijs exilibus quinquepartitō diuisum.

210.10. Aliqui sylvestre sempervivum, alijs portulacam sylvestrē appellant, Romani illecebram, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurim.

213.3. Aliqui Rhiam vocant.

213.29. Aliqui centauriam radicem, alijs aloen Gallicam, alijs narcē, alijs chironion, Dardani aloiotin, Romani genus aut cicendiam, alijs ciminalē vocant.

214.29. Alijs melocarpos, alijs teuxinon, Latine aristolochia.

216.4. Appellatur à quibusdam ararisa, & mele caprum, ephestios, lestiis, pyxionyx, Dardanion, ionitis, Gallis theximion, Aegyptijs sophoeph, Siculis chamemelon, Italis mālun
ter

terra, Dacis absinthium rusticum : nascitur in montibus, & calidis locis, aut campestribus, & petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nido= re subditis carbonibus febricitans suffiatur, febris leuabitur. vulnera impositu sanat : carcinomatibus narium, cum cypero, & dracunculi semine, & melle prodest. rigoribus medetur, cocta in oleo aut adipe suillo, illitaq;. Cratenas herbarius, & Gal= lus, eadem de hac tradiderunt, & praeterea poda= gricis eam auxiliari.

216. 6. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidam symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylubram, alij libyestason, alij homœnomœon, alij peenthaomœon, Latini dulcem radicem ap= pellauere.

216. 24. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronem alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestim, magi Hercules sanguinem, Romani phieri, & vneferam, & fel terræ.

217. 17. Panacia appellata est, quoniã omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs. pulsationes vulne= rum, vrine stillicidia, calculorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

217. 19. aliqui limnesion, alij helleboriten, alij amaranton, magi Hercules sanguinem, Latini fe=

DIOSCORIDIS

brifugiam, alij auram, multi radicem, Daci tul-
belam appellant.

218.27. Quibusdam chrysisceptron, alij ixia,
Romanis cardus varinus, Aegyptijs epher dici-
tur, alij ephthofechin.

219.18. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij
ixiam, alij cynomaſon, alij ocimoides, alij cnidion
coccon, alij cynoxylon, Latini carduum nigrum
aut vernilaginem, Aegyptij sobel vocant.

220.22. Aliqui crocodiliō vocāt, alij chamæleo-
nem, alij onocardion, alij Veneris lauacrū. Roma-
ni labrum Veneris, alij carduum Veneris, Aegy-
ptij seseneor, alij chir, alij meleta, Daci sciaram.

221.11. Aliqui agriocinnarā, alij donacitin, alij
erysisceptron vocant, Romani spinam albam aut
regiam, alij cardum ramptarium.

22.26. Quæ acanthis aliquibus dicitur.

222.3. Alias pherusa, alias pyracantha nomi-
natur, in Aegypto cñus.

222.12. Aliqui phrynion, aliqui acidoton.

222.25. Acantham aut herpacātham, quidam
melamphyllon, aliqui topiariam, alij mamolariā,
quidam crepulam vocant.

224.7. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij
ischiada vocant, Romani spinam albam.

225.2. Aliqui eryngen, alij eryneren, alij ca-
ryon, alij gorginon, alij hermion, alij organum,
chlounion, alij myracanthon, alij moly, Aegy-
ptij crobysen, magi siserton, Romani capitū-
lum

N O T H A.

lum Martis, Daci sicupnoëx, Hispani centumica-
pita, Aphri cherdum, alij oriam chloëm, alij chi-
da appellant.

225. 22. Aloë aliquibus amphibion, alijs her-
minion, alijs eryngion, alijs tragoceros, Romanus
aloea, Barbaris aloë dicitur.

227. 16. Aegyptij somi, Romani absinthium.

228. 24. Latini Sandomicum vocant.

229. 13. alij abutonon, alij absinthium, alij he-
raction, alij cholopæon, alij absinthiomenon, alij
thelyphthorion, alij procampylon, magi aëura
phænicos, alij cynanchiten, Romani absinthium
ponticum, nonnulli thelythamnium, alij glycin an-
cona vocant.

230. 7. aliqui later vocant, alij cassialam, Aeg-
gyptij pesalem.

230. 26. aliqui syncliopa, alij alcibiadem, alij
pancration, nonnulli styphoniam, Aegyptij suphlo,
Magi pythons oculum, Romani scirolebinam vo-
cant.

232. 27. vers. vlt. Glichona alij blechron, alij
arsencanthon, Latini pulegium vocant, Galli ale-
uolum, Aphri apoleium, quidam galisopsim.

233. 16. alijs embactron, alijs belouacos, alij arc-
temedeion, alijs cretica, quibusdam ephemeron,
nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidiō,
aut helbanion, Romanis vstilago rustica.

234. 19. alij elaphoboscon, aliqui phacon, alij
siosmin, alij phagnon, Aegyptij becion, Roma-

13

DIOSCORIDIS

in saluam vocant.

235. 4. Hedyosmon sativum alij miniham, alij calamintham, Latini mentham vocāt, alij nepetam, Aegyptij tis, alij pherithru merithumonthu, alij perxo, alij maceto.

235. 24. quidam cephaloton, alij epilhymida, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij stephanen, Daci mosulam.

237. 23. aliqui Zygin sylvestrem, alij polion vocant, Aegyptij merupium, Latini serpyllum.

238. 14. aliqui nominant amaracum, alij triphyllon, alij agathides, alij cnecon, alij acapnon, Pythagoras thrambem, Aegyptij sopho, Armenij myuron, magi ichrei asinum, aut hecigonō Isidis, Latini maioranam.

239. 20. aliqui organida, aut hysobriū vocāt.

239. 28. alijs sylvestre basilicum, Latini ocimastrum.

240. 25. ruta montana, quā aliqui rhyten montanam vocant. & hortensis, quā Aegyptij epnubū, Syri harmala, alij besafa, Aphri churma.

242. 25. Sylvestris ruta Cap. Rutā sylvestrem aliqui appellant hypericon, alij androsmon, alij coron, alij chamæpityn, Romani hederalem, aut centonalem, Aphri churma semmaced. odor seminis resinusus est, ideo chamæpitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia rutæ figura: flores lutei, qui digitis triti sanguineo succo manant, vnde androsmon vocitant. Ramuli sub

subhirsuti, siliqua teretes, hordei effigie, in quibus
semen nigrum resinam olens, gignitur incultis &
asperis. Urinam ciet, menses appositum trahit, pota
cum vino quartana liberat. Folia cum semine am
bustis illitum medemur, & diebus quadraginta
epota ischiadicos sanant.

243.13. aliqui sylvestre leucoion appellant.

247.2. aliqui cerascomen vocant. Latini ru
sticam pastinacam, aliqui carotam, Aegyptij ba
bibyron, Aphri sicham.

247.19. nonnulli sphagnum vocant.

248.3. Aegyptij cyonum phricem vocant.

249.23. Anethum quod estur, aliqui polgida
vocant, alij anicetum, magi cyncephali gentu
ram, aut capillos, alij Mercurij semen, Latini a
nethum, Aphri sicciriam, Aegyptij arachu, Daci
pulpum.

250.18. siue cuminum syluaticum.

251.11. Ammi, Latini ammiun Alexandrinu,
quidam regium cuminum appellant.

251.24. Aegyptij ochion vocant, Aphri gaed.

252.9. alijs sonchites, Romanis lampuca, Pœnis
subileas.

252.17. aliqui sonchiten, alij emimon agrion,
Romani intybum sylvestrem vocant.

253.18. à quibusdam pedinon, ab alijs hydrose
linon agrion, Romanis apiu rusticu appellatur.

253.19. aliqui petroselinon sylvestre appellant,
Aegyptij anonim.

254.6.

DIOSCORIDIS

254.6. aliqui grielon, alij agrioselinum.

255.22. aliqui elaphicon, alij nephron, alij ophi-
genion, nonnulli ophioclonon, aliqui herpyæen,
alij lymen vocant, Romani cerui ocellum, Aegy-
ptij chemin, Aphri ascaucau.

256.25. hippomarathrum, aliqui marathin,
alij marathrum agrion, Aegyptij sampsoth, magi
thymarnolion, Latini fœniculum erraticum, ali-
qui mion, Galli sistrameor.

257.29. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs
paralysis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs
delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut so-
sandron, aut cronion, Romanis bucinus minor
vocitatur.

258.14. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij py-
roton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, magi py-
riten, Romani salinarem vocant.

258.25. aliquibus zea aut campsanema ap-
pellatur.

260.19. aliqui arangē vocant, alij phalāgion,
alij asterion, nonnulli nesyrin aut sphondylin, qui-
dam chorodanon, aut tenanthen, Romani herbam
rutinalem, Aegyptij apsapher, magi osirin.

261.21. aliqui agrion vocant, alij agriophyl-
lon, magi bonum demonem, Romani satariam.

263.8. aliqui melanthium, alij mecona agrion
melana, Romani papauer nigrum appellant.

269.2. herba est ex qua ammoniacum fit sus-
fimen, quod thymiama vocant, aliqui agaxyllon,
alij

N O T H A.

aliq criotheum, aliq heliustrum, Romani guttam.

271. 18. aliqui ampelocarpon, aliq omphalocarpon, nonnulli philanthropon vocant.

271. 29. aliqui aspidion, aliq haplophyllon, aliq accyseion, aliq adyseion nuncupant.

272. 12. aliqui cission, aliq cissophyllon.

272. 20. aliqui armyron vocant, aliq cnicon syluestre, aliq aspidion, magi aphedron, Aegyptij chenon, Romani praesepium, aliqui fusum agrestem, aliq colum rusticam.

273. 2. quidam clinopodion, aliq polygonaton, aliq Iouis colum, aliq echeonymon vocant.

273. 8. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, is qui affectibus laborant, quæ violentiæ vocantur, magno esse praesidio.

273. 10. aliqui cleonicon, aliq ocimoides, aliq xopyron vocant.

273. 21. aliquibus leontopodion, alijs leuceorõ, alijs leontiõ, alijs doris, aut doriæteris, alijs lychnus agria, alijs pardale, alijs thorybethron, alijs rhaepeion, alijs cornutum papauer, alijs anemone, Romanis patabelclon, aut semen leoninum dicitur.

274. 4. aliqui athanaton vocant, aliq acyloniõ, aliq ballarion, aliq geranopodion, quidã corymbiõ, aliqui taurion, aliq sceptron, aut maloion, Aegyptij semeon, magi sanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

275. 7. aliâs tragonaton, aliâs atocion, aliâs hieracopodion, aut lampas vocatur, Aegyptijs
semen

DIOSCORIDIS

semura, magis apocathemenes taurus. Romanis
agreſte intubum.

275.13. Crinon baſilicon alij crinanthemon vo-
cant, alij gallirion, Magi Marius ſanguine, Oſtha-
nes aurem crocodili, Aegyptij ſymphlephon, qui-
dam tiulon, Latini lilium, aliqui roſam iconis, Sy-
ri ſaſa, Aphri abiblabon.

276.6. Alij magnū vocāt, aliqui nophthan, alij
notianoſcemin, alij noſſpraſſon, alij nothera, alij
nochelin aut noſtellin, alij nophryn, alij gnoto-
rim, alij gnotera, Romani apnium, aut medatam,
aut ulcerariam, aut marrubiū nigrum, alij cāthu-
rinum. Aegyptij aſphon, magi Iſionis ſanguinem.

276.18. Alij melitæon, alij meliphryllon, alij
erythran, alij temele, Latini apiāſtrū aut citra-
ginem, Galli meriſimorion vocant.

277.5. Praſion, alij eupatorion, alij phyllopha-
res, alij tripedilon, alij camelopodion, Aegyptij a-
ſteropen, magi tauri ſanguinem, aliqui aphedron,
alij Hori genituram, Latini marrubium, aliqui
labeoniam, Aphri atierberziam.

278.6. Aliqui phrylin, alij acaulon, alij ſylue-
ſtre lapathum vocitant.

278.16. Aljſ leucacantha dicitur.

278.26. Alj crucion vocant, Romani trifolium
acutum, aut odoratum.

279.24. Polium montanum, aliqui tewhrion,
alij pheux aſpidion, alij achamemū, alij ebenitin,
alij meloſimon, nonnulli belion, quidam leontocha-
ron

ron vocant.

280.22. Aliqui scorbion, alij pleuritin, alij dy-
fosmon, alij syluestrem calamitum, quidam cha-
medryn, alij mithridanion, magi Podotis sangui-
nem, Aegyptij apho, Romani trisagmē palustrem
appellant.

281.13. Bechion quidam rhichion, alij petri-
nam vocant, alij peganon, alij pithion, alij pago-
naton, alij chamaleucen, alij procheton, alij arco-
phylon, alij chamægeron, Aegyptij saarithan, La-
tini tussilaginem, quidam pharphariam aut pu-
stulaginem, Bessi asa.

281.28. Quibusdam polycloms, alijs monoclo-
nos, alijs toxitesia, alijs ephesia, alijs anaëtorios,
alijs soxusa, alijs leia, alijs licophryx, magis ho-
minis sanguis, alijs chrysanthemon, Romanis va-
lentia, aut serpyllum, aut herba regia, aut arte-
misia, alijs rapium, aut tertiana, Gallis pona. Da-
cis quoque dicitur.

282.16. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuio-
ribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarū di-
ctus, nascitur: cuius flores & folia contrita, sam-
psuchi odorem reddunt. Si quis stomacho laborans,
herbam cum amygdalino oleo bene contundat in
malagmatis lentorem, & stomacho imponat, sa-
nitati restituetur: qui nervorum dolore crucian-
tur, si succum ex rosaceo illinant sinantur.

282.18. Romani caprum syluaticum vocant,
quidam botryn, alij apium rusticum, Aegyptij

N n

merfeon.

283.6. Aliqui Pelonitin, alij tricam, alij gera-
nogeronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen ap-
pellant.

283.9. Aliqui mertryga, alij myrrhin, alij oxy-
phyllon, alij cardamomon, alij origanum vocant,
magi hierobryncas, Latini gruinam, aut pulmo-
niam, aut cicotriam.

282.15. Gnaphalion, alij hires, alij ampetocor,
alij anaxiton, alij anaphilin. Aegyptij semeon,
Galli gelasonem, Latini centunculum vocat, qui-
dam tucularem, alij albinum.

284.8. Aliqui cerascomion, alij leucanihon vo-
citant.

284.15. Conyza magna. Cap. Conyza ma-
gna aliquibus cynoxematitis, alijs danais, alijs
tanachion, aliquibus phycos, alijs ischys, alijs dy-
nosmos, magis brephoctenos, quibusdam anubias,
nonnullis hedemias, Aegyptijs ceti. Romanis in-
rybum, aut militaris, aut deliarium, aut febrif-
uga, alijs phragmosa, alijs musteros, alijs pissi-
nuncupatur.

285.2. Aliqui conyzam paruum, alij panion,
alij libanotidem, magi cronon vocant.

285.10. Alij hemerocatalacton, alij crinon a-
grion, alij crinanthemon, alij porphyranthes, alij
bulbum hematicon, alij anticaniharon, Aegyptij
iocri, Romani bulbum, aut lilium sylvestre, aut
marinon, Aphri abiblabon vocant.

NOTHA.

285.28. Aliqui basilicon vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

288.11. Alij melion aqueum, alij entaticon, alij priapicon, aut satyriscon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

288.21. à Latinus geminalis, à Dacis hormia dicitur.

289.14. Aliqui osmada, alij ononin, alij phlo= nitin appellant.

290.13. Hanc nymphona alij vocant.

290.20. Sunt qui picrida appellent, alij leucen, alij thalassiam.

290.28. Alij pteryx, alij lonchitum, alij aturion, alij phrygiam, aut phrygitum, aliqui philerodoten, magi mustela sanguinem.

291.26. Quidam anthyllon, alij anthemida vocant, alij eranthemin, alij leucanthemon, alij foranthin, alij campestem florem, Romani solastrum.

292.11. Anthemida aliqui leucanthemon, alij eranthemon, quoniam vere floreat: alij chamemelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli metanthemon, alij chrysocomam, alij calliam, Romani malium, Aphri astertiphen appellant.

293.11. Alij anthemida, alij leucanthemon, alij chamemelon, alij chrysoalin, alij melabathron, nonnulli campestem florem, Romani solis seculum, aliqui millefolium, Hetrusci cantam, Aphri thamath.

DIOSCORIDIS

294.5. Alij balsamenā, magi hemorrhan, alij Mercurij geniturā, alij aphthuis semen, aut mine= silheum, Romani cappacoraniā, Aphri narat.

294.14. Alijs orobelion, quibusdam orob. ix, alijs hemagogon, alijs pæsedon, alijs monogenion, alijs menion, alijs pæonion, alijs panthiceratos, alijs idei dactyli, alijs aglaophotis, alijs theodonion, alijs selenion, magis selenogonon, alijs phthisis. Ro= manis casta.

295.12. Alij agonychon vocant, alij leontion, alij leoninum lapidem, alij gorgonion, alij tantali= tin, alij diosporon, Romani columbam, Daci go= noletam, alij heracliam.

296.3. Aliqui tembrion, alij dracanon, alij cin= nabarim, Latini rubiam, Hetrusci lappam mino= rem, Aegyptij sophobi vocant.

296.25. Aliās cestron aut medusa dicitur, La= tine venerea aut lanceola.

297.5. Latini longinā, aut calabrinam dicunt.

297.12. Alij alihiocon vocant.

298.21. Aliqui cannabion, alij schinostrophon, alij asterion appellarunt.

298.26. Aliqui hydraclinam, Romani termi= nalem dicunt.

299.6. Aliqui acopon, alij anagyron, alij agna= copon vocant.

299.27. Alij alccam, alij acyron, alij lyron.

300.13. Aliqui onobrochilon, alij eschasmenē, alij hypericon, alij corion, alij chamæpytin. Ro= mani

mani opacem, alij brichilatam, alij loptam, alij
iocinalem, Daci aniaffexe appellant.

301.24. Alij ascyron, aut dionysiadem.

302.21. Alijs pitysorysis, alijs orixelon, ijs qui
Pontum incolunt olocyron, alijs bryonia sylue-
stris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, magis Miner-
ue sanguis, Latini aurga aut cypripum, Dacus de
chela appellatur.

306.6. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in
pratis & montibus, locus mundus, & opacus, circa
frutices: animas hominum & corpora custodit,
nocturnas ambulationes, & loca sancta: grambus
somnia resistit: ad omnem medendi usum commen-
data. Radicem habet rubram, odoratam, porracea
folia, medio eorum puniceo, in recto calamo trian-
gula, floribus in cacumine purpureis. Farina re-
centis vulneribus capitis indita, dolorem finit: vul-
nera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quotidie im-
poni debet, dum persanescent: dolori capitis me-
detur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus
cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

306.21. Aliqui polygonatum appellant, alij cy-
nochalam, alij heracliam, alij asphalton, alij chi-
liophyllon, alij clema, alij polycarpon, alij carci-
nethro, alij teuthalida, alij myrtopetalon, alij cno-
podion, alij zaritheam, alij pedalion, Aegyptij
theplin, aliqui stemphin, magi geniturā herou,
aliqui vnguem muris, Latini sanguinariam aut
seminalem, Aphrichulum.

DIOSCORIDIS

307.27. Alijs philetæron, alijs daphnoides, alijs smyrnoides aut polygonoides appellatur.

308.7. Aliqui epigeton, Aegyptij philacron, Romani ambuxum vocitant.

309.23. Romani soldaginem vocant.

310.1. Rutaceæ similes.

310.20. Alij tobion, Romani st. p. am vocant.

310.26. Alij calycanthemon, alijs periclymenon, alijs heliophyes, nonnulli hepatitum, alijs milacem, alijs anatolicon, alijs diticon, alijs merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptij oxyui, alijs clymenon, alijs clymenion, quod & agonon nuncupant.

311.8. Aliqui Aeginam, alijs clymenon, alijs carpathon, alijs splenion, alijs epatitum, alijs axinā mazore, nonnulli clematitum, alijs myrsinen, alijs calycanthemon, magi polion Veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

311.26. Tribulus aliquibus bucephalus, alijs tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicitur.

312.18. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon alijs qui sarxiphragon, alijs empetron, Romani saxiphragiam vocant: frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest: singulium sedat: calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.

312.19. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs

NOTHA.

alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Mys-
sus mendruta, Syrus neida, alijs lycosemphyllion;
alijs helleborosemata, alijs scyllion, magis lupicor,
Romanus viartum nigrum, quibusdam tintinabus
lun terra, Gallis iumbarum, Dacus dacina.

312.27. Aliqui leporis cuminum appellant.

313.2. Aliqui medicam appellant, aly triphyl-
lon, aly clemation, nonnulli ofmon, quidam trigo-
non, aly cypellion, aly polyphyllon, Romani trifo-
lium odoratum, Aegyptij epaphon.

313.11. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à non-
nullis polyrrhizō, à Romanis vindicta nominatur.

313.21. Aliqui anaetorion, aly phasganon, aly
macheronion, aly arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genutalem.

314.10. Aly bolon vocant.

314.16. Ab aliquibus irus agria, ab alijs cas-
cos, à Romanis gladiolus, aut iris agreſtus, à Dacus
aprus dicitur.

315.2. Anchusam aliqui catanchusam vocāt,
aly libycam, aly archibellion, aly alcibiadion, aly
onophyllon, aly porphyrida, aly mydusam, aly
salyca, aly noneam, Aphri buinesath.

316.1. Aliqui aridam, aly alcibiadion, Roma-
ni alcibiaccum nominant.

316.25. Aliqui & hāc echiō vocāt, aly scorpiu-
ron, aly sparganō, aly alihæam, aly amarantida,
aly probatæam, aly elaphion, aly animumon, aly
porphyrida, aly augiō, aly nemefion, aly philete-

DIOSCORIDIS

tion, alij hyempsolon, alij thyrstium, alij thermu-
tin, alij misopatios.

317.8. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

317.14. Agrostin aliqui egicon, alij amaxitin,
Aegyptij amphi vocant, Latini gramen, aliqui
asyphyllion, alij sanguinalem, alij violam, Hispa-
ni apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

318.9. Magi genituram, aut sanguinem Tita-
ni, alij scorpionis urinam, Pythagoras parmiron,
Andreas xanthophanea, Osthane boephthalmō,
Aegyptij sendionor, Romani vertemni, alij sole-
astrum, Aphri vdedomin.

319.8. Aliqui myriomorphon nominant, alij
chiliophyllon, alij stratioticon, alij heracleon, La-
tini supercilium Veneris, alij acron syluaticum,
alij militare, alij millefolium.

319.19. Batos, ab alijs cynosbatos, ab alijs se-
linorition, ab alijs asyntrophos, à magis Titanis
sanguis, ab alijs ibidis sanguis, à Romanis ru-
bus, ab alijs sentes, à quibusdam mora baticana, à
Dacus mantia, Aegyptijs hæmoos, alijs ametros
appellatur.

321.2. Alij hepatorium, aut hepatitis, Romani
volucrum maius.

321.17. Pentaphyllon aliqui pentapetes, alij
pentatomon, alij pentadactylon, alij pseudofeli-
ni, alij callipetalon, alij xyloloton, nonnulli xylo-
petalon, alij asphalton, alij pentacænon, alij thy-
miatitin, Aegyptij orphitebeocen, alij enotron,
mag

N O T H A.

magi ibidis vnguem, alij ibidis pennam, alij hermodactylon, Romani quinquifolium, Galli pempe-
dulam, Daci propedulam appellant.

322.27. Aliqui rhon, alij anchinop. i, alij phæ-
nicopteron, alij rhon stachyos, alij osthaleu, Ae-
gyptij alimon nominant.

323.14. Alij rhodida nominant.

323.20. Hippurin, alij trimachion, alij anaba-
sin, alij cheredranon, alij Phædran, alij itianden-
dron, alij gis, alij schæniostrophon vocant, Aegy-
ptij pherphram, magi Saturni cibum, Romani
equinalem, alij equi salicem, aut anabasion, alij
ephhydron.

324.4. Aliqui equition, & alij chedran, alij gy-
non, Romani salicem equinam appellant.

325.1. alij scorpion, alij garganon, Romani cor-
mulacam, alij bituensia, Daci saliam, Aegyptij so-
ber, Aphri achæosim.

325.20. Oxy schænos aliquibus schænos leuis,
alijs oxypternos, alijs Solis supercilium, Romanis
iuncus marinus, aut manualis, Aphris chudua di-
citur.

326.13. Alijs adocetos, alijs neuras, alijs phry-
nion, Romanis bouinalis.

326.17. Alijs chrysitis, alijs chrysanthemon,
nonnullis amaranton, alijs diosporon, Aphris di-
bath, vel burchumath, Romanis Iouis barba ap-
pellatur.

326.26. Aliqui chryso spermon vocant, alij da-

DIOSCORIDIS

Spin, alij origanum, alij arcophthalmon, Romani
axilariam.

327.19. Aliqui chalchitin vocant, alij chalcan-
thon, alij chalcathemon, Romani acantham, He-
trufci garuleum, Aphri churfeten.

328.8. Alij trigonion, alij bunion, alij hierobo-
tanen, alij philtrodoten, Aegyptij pemsempie, ma-
gi Iunonis lacrymam, nonnulli mustela sangui-
nem, alij sanguinem Mercurij, Romani cristam
gallinaceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij
exuperam, alij herbam sanguinalem.

328.20. Alij erigenion, alij chamædycon, alij si-
deritin, quidam curitin, alij persephonion, alij Io-
uis colum, alij dichromon, alij callesin, alij hippa-
rison, nonnulli demetriada, Aegyptij pemphihen-
phtham, Pythagoras erysifceptron, Romani cin-
cinnalem.

329.11. Aliqui chamæfycen, alij gatalen, alij
onycha vocant, Romani pinum triniam, aut ficum
terra, alij glandulam, alij tium, alij nonariam.

329.22. Aliqui heloniam, alij porphyranthes,
Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

330.4. Nonnulli oxytonon, Romani papau-
ralem, Aegyptij nanti.

330.23. Papauer satium alij chamæfy-
cen, alij papauer rhœada, alij oxytonon appel-
lant, Romani papauer, Aegyptij nanti.

333.13. Aliqui paralion, alij sylvestre papauer,
alij thalassion, Romani fabulum marinum, Aphri
sifim

stigmatam vocant.

334.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia accident, quam qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

334.17. Alij pythionion, aliqui dioscyamon vocant, alij adamata, alij adamenon, alij hypnotico, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dubnambriion, magi Pythagoras & Osthane, xeleo, Zoroastres iiphonion, magi rhapsontica, Romani inananoentariam aut apollinarẽ, Aegyptij saphitho, Hetrusci fabulum, Galli bilinuntiam, Daci dieliam.

336.5. Aliqui cataphysin, alij cynocephalion, alij chrysalion, alij cynomyam, alij psyllerin, alij siceloticon, Siculi comidyri, Romani herbam pulicarem aut silbacium, Aphri vargugum appellat.

336.27. Romani strumum vocant, alij cacubalum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismunim vocant.

338.2. Aliqui dircion appellant, alij strychnon manicon, alij dorycniõ, alij calliada, Romani apollinarem minore, alij vlticanam herbam, aut opsaginem, Daci cycolidem, Pæni cacabum.

338.19. Strychnon manicon, alij anydron, alij pentadryon, alij enoron, quidã orihogyion vocat.

339.22. Alij exeranthes, aliqui antimnion aut antimion, alij bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras anthropomorphon,

D I O S C O R I D I S

phon, alij alæten, alij thridaciam, alij cammaron, Zoroāstres diamōnon, aut archinen, magi hemionos, aliqui gonogeon. is, Romani caninum mālum, alij terrestre mālum.

342.18. Alij cyanion leucon, Rom. colōmēstrū.

343.4. Conion, aliquibus æginos, alijs ethusa, alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurosis, alijs paralysis, nonnullis aphron, quibusdam creidion, alijs cæten, alijs catechomenion, alijs abioton, alijs apseudes, alijs ageomoron, alijs timoron, alijs polyanodynōs, alijs dardanis, alijs catapsyxis, Osthani babathy, Aegyptijs apemphi, Romanis cicuta appellatur.

344.8. Aliqui cynanchon appellant, alij pardalianches, alij cynomoron, alij cynoctonon, alij phaleon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippomanes, alij onistīn, alij ophioscorodon, alij cynaricam, alij elaphoscorodon, magi paralysin, Romani brassicam rusticam aut cannam.

344.20. Alij spongon, alij hæmoſtarin, Romani rhododendron. Lucani icmanen, Aegyptij schimphen, Pæni rhododaphnen dicunt.

346.23. Aliqui elitim vocant, alij canocerseam, alij amelxinen, alij eufinen, alij amorginen, alij sucotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij cittāpelon, alij cissameithon, alij anateamenon, Romani volutūlaparon, Aegyptij apap, alij part henion, alij sideritin, alij heracleā, nonnulli agriam, quidam clubodion, alij polyonymon.

347.9. Alij myortochon dicunt, alij myorto=
splenon, Romani muris auriculam, Pœni laba=
tholabat.

347.20. Agriam phacon aliqui, alij epipte=
ron, Romani viperalem, alij iceosmugdonon vocāt.

347.27. Aixoon maius, aliqui anthales, alij
ambrosion, alij chryssipsermon, alij xophthal=
mon, alij bubophthalmion, alij stergethron, alij æo=
nion, alij aichryson, alij holochryson, nonnulli chry=
santhemon, alij protogonon, alij boron, alij notion:
magi paronychiam, alij chrysitin, Romani ceriam
cuspiam, aut Iouis caulem nominant, alij leapetes,
alij sedum maius. Aegyptij pamphanes.

348.17. Aixoon paruum, alij petrophyes ap=
pellant, alij brotion, alij theobroton, crobysson,
alij chimerinen, alij cerauniam, Romani vitalem,
alij semperuium, Aegyptij etyceliam.

348.24. Semperuium quod tenui constat fo=
lio, aliqui aixoon paruum, alij petrophyes, alij ai=
xoon sylvestre, Romani semperuium minus ap=
pellant.

349.2. Aliquibus cymbalion, alijs scytalion,
alijs hortus Veneris, alijs terræ umbilicus, alijs
stexhis, alijs stergethron, Latinis umbilicus Vee=
neris dicitur.

349.19. Acalyphen aliqui cnidem, alij adicen,
Latini urticam, Aegyptij selepsion, Dacidyn ap=
pellant. Acalyphen etiam alteram aliqui cniphen,
Romani urticam mollem vocant.

D I O S C O R I D I S

350.12. Alys galeobdolon, vel galephos, Aegyptiis ætopi, Latini vrtica labeo dicitur.

350.23. Alys galation, aut gallerion.

351.4. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, aliàs erechthites.

351.25. Marinum bryon, aliqui ballarin, alijs iranen, Latini gnomeusilon vocant.

352.14. Aliàs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

352.20. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nuncupatur, Aegyptiis tibus, magis æluri sanguis.

353.11. Phlomon, alijs phlonon, Latini verbasum, alijs pheminalem vocant.

355.8. Arcion alijs prosopida, alijs prosopion, alijs aparinen, Latini personatam, aut lappam appellant.

355.24. Alys borion appellatur.

355.28. Capion, aliqui corydalion, aut corion vocant, alijs syluestre corydalion, alijs capnon in hordeis, alijs capnuten, alijs marmaruten, alijs capnogorgion, alijs chelidonion micron, alijs peristerion, alijs cantharida, alijs chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptiis cnyx, alijs tucin.

356.7. Alijs tripidion, alijs tribolion.

356.12. Aliqui libyon, alijs triphyllon.

356.22. Aliqui telinen, alijs lotu magnum, alijs triphyllon, Romani trifolium maius appellant.

357.18. Alijs melophyllon, alijs stratioticem, alijs achillion, Latini millefolium vocant, aliqui su-
per

NOTHA.

percilium veneris, Galli beliocandas.

356.27. Alij myrrham, alij comlen vocant.

358. 23. Aliqui buglossum magnum vocant, Romani spinam mollem.

359. 6. Ab aliquibus bubonion appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyoplihalmon, Romanis inguinalis, Dacus rathibus.

359.19. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter qui ignari antea nō viderūt, esse mane simulacris arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autē ab opilionibus. Crateus rhizotomus hæc de ea refert: Si viridis cum axungia vetere tundatur, contra rabiosorū morsus, turgentia guttura, proderit. suffitu quoq; serpentes fugat.

359.27. Aliqui dasypidion, alij priapeion, alij ion syluestre, alij cybelion, Romani fetialin, aut murariam, aut violam purpuream vocant.

360.5. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maximè pueris, in aqua potum.

360.16. Aliqui aton, alij actinen, alij anemosphoron vocāt, magi paradacry, Aegyptij exxoēn, Romani scopam regiam, Aphri xigar, nonnulli thepso.

361. 2. Alio nomine chamæleuce, alio cissos acarpos, aut terra corona, aut selinitis, Latine hœdera pluuiatica dicitur.

361. 17. Magi eluri gonon, Osthanez txanuchi, Aegyptij autnenrinbesor, Romani linguam
bub

DIOSCORIDIS

lululam, alij libanium, Pœni asanaph vocant.

362.2. *Alij phyton, alij caballation, alij spli=*
neion, alij scolymon, Romani linguam canis, aut
caninam appellant.

362.14. *Aliqui xonnychon vocant, alij aëtony=*
chon, alij cemos, alij damnamenē, alij idiophyton,
nonnulli phytobasilam, alij croßion, alij croß=
sophthoon, magi sanguinem crocodili, alij croco=
merion, Aegyptij daphnœnen, Romani minerciū,
alij palladium, alij neumatium, alij flammulam.

362.23. *Aliqui & id antirrhinon, alij anarrhi=*
non, nonnulli lychmida agriam vocant.

362.29. *Nonnulli lychmida agriam appellant.*

363.8. *Catanance aliquibus damnamete, alijs*
dionysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs cemos,
alijs crotion, magis archaras, alijs arcopus, Ro=
manus herba filicula, alijs dutisca, Dacis caro=
pithla dicitur.

363.21. *Aliqui psychen, alij merida, alij pota=*
mogitona, alij stachyiten, Romani caliummarem
nominant.

364.11. *Alij callitrichon, alij trichomanes, alij*
ebenotrichon, alij argion, alij corion enygron, Ae=
gyptij epier, Romani cincinnalem, alij terræ ca=
pillum, alij supercilium terræ, Daci phithophthe=
thela vocant.

365.4. *Aliqui pterion, alij opteron, Romani*
capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli
& eam adianton appellant.

N O T H A.

365.11. aliqui phasganon, alij antithesion, alij chascanon, alij choeradolethron, alij & hanc aparinam nominant, Latini lappam.

365.24. aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs bromos, Romanus auena dicitur.

365.29. aliqui siphonion, alij acrospelon vocant.

366.28. alijs epapitis, alijs lycanhemon, alijs cyziosbatō, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs anatonicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lysthe, Romanis mergina, Hetruscus radia appellatur.

367.23. alijs hieromyrton, alijs myacanha, alijs agonon, alijs scincos, alijs minha, alijs catangelos, alijs anangelos, alijs acaron, alijs ocneron, alijs cinnen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamæmyrte, Bæotis gyrenia, magis Hercules genitura appellatur.

368.10. aliqui idean, alij danaën, alij hippoglotron, alij Zaliam, alij stephanen, alij daphnon, alij samothracicen, alij methrion, alij hypoglossion vocant.

368.19. Daphnoides alypo simile, flos ut nymphææ, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in quo semen: aliqui chamædaphnen, alij peplion, alij eupetalon vocant.

369.2. aliqui & hanc alexandrinam appellant, alij daphniten, alij hydraggon, Romanus laureolam, alij lactaginem, Galli vsu bim.

369.11. aliqui ascida vocant, alij atomon, alij pigatoxarin, magi sanguinem Hercules, alij polyio

DIOSCORIDIS

dos, alij anaphyston, Aegyptij semphia, alij vnre,
Galli laginum, aliqui anepsa.

370.22. aliqui melampodion vocant, alij ecsto-
mon, alij polyrrhizon, alij protion, alij melanorri-
zon, alij cyiranion, magi xomarition, Aegyptij
iseam, alij elaphine, alij cemeleg, Latini veratrum
nigrum, alij saraca, Daci prodiorna.

372.10. aliqui sesamiten, alij sesamin, alij lyco-
cytalion, alij helleborum album appellant.

372.17. aliqui coronion, alij sesamon syluestre.

372.27. aliqui elaterion vocant, alij grynon, alij
balin, alij syncrison, alij bubalion, alij scopion, alij
pherombron, alij peucedanon, alij notion, Romani
ancetum, alij agrestem, Persi cufimezar.

375.15. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris
trita radix, & drachmae vnus pondere pota in hy-
dromelite, vomitus ciet. Si quis facile secundum coe-
nam vomere velit, binis obolis sit contentus.

375.16. alij triphryllon, alij stesion, alij astaphia-
da, alij phthiroctonon, alij phthirion, alij apanthro-
pon, alij polyides, alij pseudopithes, alij arsenoten,
Aegyptij ibesaceden, Romani herbam pediculariam
vocant.

376.4. aliqui hypopyon vocant, alij pancranon,
alij scammonion, alij thelyterim, Romani ferulagi-
nem, alij ferulam syluestrem, Persi baeden.

378.17. aliqui lygon, alij lobon appellant.

379.26. aliqui narcission anydro, alij autogenes,
alij bulbon emeticon, alij lirion, Romani bulbum
morbie

NOTHA.

morbitarium dicunt.

380.16. alij hippophyes, alij hippophanes, alij hip-
pion, alij echinion, alij pelecimon, Romani lappagi-
nem vocant.

381.17. aliqui sesamon sylvestre vocant, alij se-
seli cyprion, alij crotona, Aegyptiys sythanna, ali-
qui trixin, magi sanguinem febris, Latini ricia-
num, alij lupam.

382.5. aliquibus cometes, alijs gobios.

385.8. aliqui clema, alij crambion, alij paralion,
alij campicon vocant.

386.13. aliqui sycen, alij mecona aphroden.

387.5. alij spumsum papauer vocitant.

387.20. aliquibus scambonia radix, alijs colo-
phonia, alijs dactylion, Romanus colophonium, ma-
gis apopleumonos, Aegyptiys sanilum dicitur.

389.5. alij chamaelea nigra, alij pyros achnen, alij
heraction, alij bdelyram, alij coccin guidion, Ro-
mani citocacium, nonnulli oleaginem, quidam olea-
stellum vocant.

389.16. alij chamaeleam, alij pyros achnen, alij
cestron, aut cneoron vocant.

390.15. Acten aliqui dend. on arctu, alij hemes-
ron, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci se-
bam vocant.

390.23. alijs heliosacte, alijs agria acte, alijs Ene-
boica, Gallis ducone, Daci olma.

392. 2. nonnulli ischiada, alij chamabalanum
agriam, alij linozostin, Latini radicē sylvestrem,

DIOSCORIDIS

Pœni i thorphaithsadæ appellant.

392. 16. aliquibus colocyntha egos, alijs sicya picra, alijs alexadrina colocyntha, Zoroastri i hymbra, Osthani autogenes, Romanis cucurbita syluatica, Dacis tui rastra dicitur.

393. 8. alijs cedæes, Romani inuolucrum vocant.

394. 15. alijs ophioſtaphylon, alijs chelidonium, aut melothron, aut psilothron, aut archexoſtin, aut agroſtin, aut cedroſtin appellant.

395. 22. alijs chironion ampelon, alijs bucranion, Romani oblameniam, alijs batanutam, alijs betisalcam, Daci priadelam, alijs pegrina, Aphri lauothien.

396. 8. Pterin alijs pterio, alijs pterineo, alijs dasyclonon, alijs anasphoron, alijs blechnon, alijs polyrrhizon vocant, magi hermubain, Romani filicem, alijs laculam, alijs filisfanariam, Aegyptij asini sanguinem.

396. 23. Thelypterin aliqui nymphæam pterin nominant, Romani linguam ceruinam.

397. 9. Polypodion aliqui scolopendrion, alijs pterin, alijs polyrrhizon, Latini filiculam vocant.

398. 2. aliqui pterion, alijs nymphæam pterin nominant.

398. 21. alijs argyron, alijs aritrillin alijs chryſitin, Aegyptij aphlopho, Latini mercurialem masculam, alijs tessiculatam, Aphri asumes.

399. 6. aliquibus linoſtis, Aphris armas, alijs asumes labon dicitur.

399. 14. aliqui scorpiuron vocant, alijs heliotropon,

NOTHA.

pon, alij dialion, alij heliopon, alij scorpioctonō, alij
sesamon agrion, alij scorpy vram.

400.4. alij qui scorpiuron vocant.

405.3. Idem adstringit: prodest stomacho qui
cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit.
Item is qui ilei dolore conflantur: conuenit in
gravidarum malacia: sorptum auxiliari constat,
cum populatim grassatur pestifera lues. Huiusce-
modi omphacium non nisi post annos multos bibi
potest.

429.17. quam alij Medicinam, alij symphyton,
alij idæum phlomon, alij orestion, alij nectarion
vocant.

448.6. alij larbasen, alij gynæcion, alij Chale-
cedonion.

458.20. alij pecton, hephton, aracton, lonchoton.

505.7. Athenis ionia, in Eubœa sideritis dicitur.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum
ferat, contra venena & improbos homines prode-
rit: pecoribus iuuandis appenditur: nauigijs cir-
cumponi solet: valet contra capitis dolores &
laruas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter fa-
cit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, be-
stias & lemures abiget: si sanguis circa artus coa-
luerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, &
locum totum oblinito, cum somno indulgendum est:

DIOSCORIDIS

strangulati vulnē mirum in modum auxiliatur:
vrinę stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylū si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tōsillarum tumores, vnam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, pforam perniciali fame cōtractam iuuat: remoratos à partu menses eicit: infusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fascinum, & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito herbam cum luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appensa doloribus oculorum auxilia tur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores, statim discutit: febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnū siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentium iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas præpurgans explet: adactis corpori aculeis oblinitur, vt præsentis sit auxilio: ad venem & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, radactum in farinam illinito. Herbam vere, magnis æstibus, autumnūq; eruit.

De

NOTHA.

De Saluia.

Salvia singultum tussimq; discutit: omnibus malis vlceribus cum cera & rosaceo sumpta auxilia-
tur: lienis dolorem dysenteriamq; pota cum vino al-
bo pari modo sanat: sanguinem excreantibus, po-
tu medetur: ad extrahenda vuluæ onera efficax est:
pessimæ mulieres pessum ex ea subiciunt, vt par-
tus excutiant.

De Cupressu.

Cupressus herba contra rauedines auriculasq;
prodest: induratos tonsillarum tumores, aquam in-
ter cutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centaurio.

Centaureum contra inflammata vitia & pul-
santes ictus valet: feminis vuluæ malo laboranti-
bus auxiliatur: stillicidij vrinæ, calculorumq; tar-
menta leuat. Herbam vere oriente sole legito.

De Buphthalmo.

Bupthalmum crescente luna legere oportet.
Facit autem contra pauores, laruas, & mala me-
dicamenta, fascinationes, vtpote cum eas auertat
Radicem si quis mandat, denem expuet, fluxio-
nemq; confestim sistens auxiliatur: quin & ven-
trem resoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æstus Caniculæ ante Solis
ortum vellitur: appensaque contra ueneni, fasci-
num, pauores & laruas prodest: item contra fe-
brem cum horrore venientem, diurnam nocturnam-
ue, & aduersus tertianam. Proditur lemures à m-

D I O S C. N O T H A.

te, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorū;
& fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misce
to, & faciem illinito cum ad negotia te conferes:
vegetiores reddit pueros, imo ventri appensa: & ad
arcendos pavores nocturnos manu teneto. Contra
fascinum, & omnia maleficia prodest: corpus tue-
tur: cum enim fascinantes recedunt, arescentem ra-
mulum occludit, & cum propius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemō si terra ante solis ortū eruatur,
& collo appendatur, veneficas mulieres omnesq;
fascinantes amolitur.

De Erysimō.

Erysimon cum vino tritum, aduersus ventri
dolorem bibitur: si quis grana septem domum
iniecerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion di-
citur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans.
Bibitur contra omne venenum, & iecinoris vitia.

F I N I S.

CVRA

CVRATIONVM

MORBORVM IN

DIOSCORIDE

contentarum

index.

ABSCESSVM remedia.

M^{El}
Cucurbitæ

Thlaspi

Mentha

Viscum

Bechion, siue Tussilago

Pentaphyllon

Buglosson.

ABORTVM facientia.

Asparagus

Arisaron

Ampeloleuce

Hedysaron

Populus alba

Oxyacanthos

Coagulum

Brassica sativa

Cyclaminos

Draunculus duplex

Onosma

Elaterium

Scammonium

Thelypteris

Vinum phthorion, siue

abortium

Vinum helleborites

Conyza.

ABORTVS

remedia.

Sabina

Galbanum

ACONITO

contraria.

Balsamum

Morus

Lac schiston

Coagulum

Chamæpitys

Vinum in comuni

Scoria, siue recremen-
tum ferri.

Diosc. lib. 6. cap. 7.

ACVLEOS ex-

trahentia.

Vide, spicula corpori

infixa extrahentia.

ACVLEATORVM

ictus remedia.

Laurus

Malua

Sisymbrium

o o s

INDEX

Anisum

Althæa

Oxalme

Vinum thymite

Adipum medelæ

Diosc. lib. 2. cap. 68.

ADVRENTES

medicinæ.

Buprestis

Cantharides

Ptyocampæ

Salamandra.

ADVSTIONVM

remedia.

Vide, ambustorum re-
media.

ABGILOPIAB

remedia.

Afarum

Myrtus

Iuglans

Oriza

Malua

Plantago

Myosota, vel myosotis
altera

Baccharis

Anthemis

Strychmon sativum siue
Solanum hortense

Aegilops

Vua ænanthe

Alica.

ALARVM virus

extinguentia.

Myrrha

Myrtus

Scolymos, siue Car-
duus

Alamen.

ALGORIS RE-

media.

Laurinum oleum

Ocimum vnguentum

Cinamomum

Aristolochia tertia

Abrotonum

Vinum scilliticum

Oleomel, vel elcomeli.

ALLII acrimoniam

extinguentia.

Ruta.

ALOPECIAB mor-

bi remedia.

Harundo

Iugulans

Auellanæ

Erinaceus terrestris

Hippocampus

Ranæ

Locustæ

Adeps

Fimum

Rhaphanus

Beta

Cepe

Milium

Sinapi

Cyclaminus

Asphodelus

Batrachion

Myosotis

Nymp

C V R A T I V V S.

| | |
|--|--------------------|
| Nymphæa | Mespilus |
| Cynoglosson | Cornus |
| Adianton | Ficus Aegyptia |
| Thapsia | Caprificus |
| Aerugo ferri | Cerasia |
| Sandaracha | Melimela |
| Halcyonium | Citrea mala |
| Cotes | Pruna |
| Cinis vngularum ca- prinarum. | Amygdalæ amaræ |
| A L V V M con- turbantia. | Morus |
| Eruum | Ficus |
| Orobis | Tellinæ |
| Brassica sativa | Chamæ |
| Allium | Iuncus odoratus |
| Capparis | Cochleæ terrestres |
| Pepius | Sepiæ |
| Vux recentes | Silurus |
| Vinum dulce | Pisces saxatiles |
| Aqua maris | Lac |
| Flos salis. | Lac schistum |
| A L V V M soluentia atq; purgantia. | Butyrum |
| Asarum | Medulla |
| Crocus | Fel |
| Crocomagma | Fimum |
| Oleum amygdalinum | Tragus |
| Oleum cicinum | Linum |
| Oleum balaninum | Lens |
| Oleum cnidium | Phaselus |
| Olea Aethiopica | Rhaphanus |
| Fagus | Lapathum |
| Galla | Nasturtium |
| Faba Thebaica | Eruum |
| Siliquæ | Bruca |
| | Scandix |
| | Lactuca |
| | Cucumis |

Cud

INDEX

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Cucurbita | Cici |
| Atriplex | Scammonium |
| Brassica sativa | Ampeloleuce |
| Brassica marina | Thelypteris |
| Malua | Passum |
| Blitum | Melicratum |
| Asparagos | Vinum albanum |
| Porrum | Vinum lesbium |
| Cepe | Coccimela |
| Struthion | Vinum melitite |
| Zinziber | Thalassomeli |
| Cyclaminos | Vinum absinthite |
| Scilla | Vinum helleborite |
| Bulbus esculentus | Vinum scammonite |
| Agaricum | Rubrica sinopis. |
| Aloë | A L V V M sistentia. |
| Absinthium seriphium | Aspalathus |
| Hyssopum | Mastichinum |
| Ammoniacum. | Laurinum |
| Phyllitis | Populus nigra |
| Cestron | Populus picea |
| Scordion | Paliurus |
| Chamæpitys | Oxyacantha |
| Androsæmon | Cynosbatos |
| Papauer ceratitis | Cistos |
| Vrtica | Rosa |
| Cynoglosson | Acacia |
| Spartum | Palma |
| Balanus myrepica, si- | Palma elate |
| ue glans vnguentaria | Malum punicum |
| Hippophaës | Malus |
| Characias | Siliquæ |
| Linozostis | Cotoneæ |
| Lathyris | Mala epirotica |
| Quercus | Pira |
| Chamæsyce | Mespilus |

C V R A T I V V S.

| | |
|------------------|-----------------------|
| Lotus | Althæa |
| Cornus | Polygonon mas |
| Sorbus | Lagopus |
| Pruna syriaca | Clematis daphnoides |
| Lepus terrestris | Xyris |
| Lac | Anchusa |
| Casens | Gramen Parnasium |
| Fuligo butyri | Rubus |
| Sanguis | Pentaphyllon |
| Fimum | Phoenix herba |
| Lyncurion | Idæa radix |
| Triticum | Oxyſchœnus |
| Brasſica fatiua | Rubrica ſinopis |
| Hordeum | Aizoon |
| Plantago | Papauer fatium |
| Crimnon | Adianton |
| Seris | Phlomidis |
| Bromos | Vux |
| Chondryllæ | Vinum phalernum |
| Oriza | Vinum œnanthe |
| Alica | Vinum paſſum |
| Milium | Vinum rhoite |
| Faba | Vinum myrtite |
| Lens | Vinum cedri |
| Anethum | Vinum lauri |
| Apium | A L V I N I S vtilia. |
| Aphace | Coagulum |
| Smyrnion | Nymphæa |
| Hippomarathrum | Clymenon |
| Acantha | Papauer fatium |
| Aloë | Omphacomeli |
| Hæma | A M A T O R I I S ve- |
| Ruta | neſicijs attributa. |
| Aniſum | Cyclaminos |
| Orchis ſerapias | Catanance |
| Pœonia | Dorycnion |

Cot

INDEX

| | |
|------------------------|----------------------|
| Cotyledon | Narcissus |
| Mandragoras | Oliuæ colymbades |
| Leontopodion | Ouum |
| Phyteuma. | Picea |
| AMBUSTORVM | Platanus |
| remedia. | Plantago |
| Acacia | Sesamum |
| Asphodelos | Stimmi |
| Aristolochia | Sal |
| Althæa | Thus |
| Ascyron | Vnguentum felinum. |
| Aizoon maius | AMPHISBAENAE |
| Arction | morsus curatio. |
| Alumen | Dioscorides libro 6. |
| Atramentū scriptoriū | cap. 64. |
| Buccinum | ANGINAE re- |
| Beta | media. |
| Cypros | Acetum |
| Cistos | Absinthium |
| Coriū vsum, siue vete- | Cyprinum vnguentum |
| rum calceamentorum | Cedria |
| Cynoglossum | Cepe |
| Cinnabaris | Crocodilium |
| Ebulus | Elaterium |
| Fimum | Fel animalium |
| Phlomis, siue verba- | Fimum |
| scum | Hirundo |
| Gallion | Hyssopus |
| Hedera | Irinum |
| Hypericon | Laserpitium |
| Helxine | Mel |
| Lactuca sylvestris | Oxymel |
| Lilium | Spartum siue genista |
| Myrtus | Sal |
| Morus | Viola |
| Malua | Piper |

Pix

CURATIVVS.

Pſ

Rhaphanus.

ANHELITVS dif-
ficultatis re-
media.

Afarum

Balsamum

Naphtha

Centaurium maius

Baccharis

Peucedanum

Galbanum

Parthenion

Adianton

Ampeloleuce

Et infra in verbo, Or-
thopnoicis.

ANIMALIVM fe-
ritas mitigatur

Oenagra.

ANIREMEDIA.

Vide, Sedis remedia.

ANIMALIA ven-
tris expellentia.

Vide, Tineas latas pel-
lentia.

ANIMALIA quæ
perimunt.

Diosco. lib. 6. in præfa-
tionis fine.

ANIMALIVM icus
remedia.

Bdellium

Panaces heracleon

Terra lemuia

Diosco. lib. 6. cap. 55.

ANIMI defectus
remedia.

Cucumis

Pulegium

Coris

ANIMI volupta-
tes auget.

Buglosson.

ANIMIdeliquia
generantia.

Diosco. lib. 6. in præfat.

ANODYNA.

Hyoscyamus

Aconitū pardaliāches.

ANTIDOTVM in-
gredientia.

Acorus

Phu

Amomum

Costum

Iuncus odoratus

Cyphi

Scincus, siue scingus

Sanguis

Rapæ satiuæ

Napum, siue hunias

Brassica sativa

Piper

Abrotonum

Stichas

Ruta

Caros

Anethum

Petroselinon

Hedysaron

Mandragoras

Rub

INDEX

- Rubrica, siue terra le-
mnia
APIVM icus
remedia.
Laurus
Malua
Sisymbrium
Althæa
Diosc. lib. 6. cap. 57.
APOSTEMATVM
remedia.
Vide, Suppurationum
remedia.
APPETITVM
generantia.
Cerasia.
APPETITVM
incitantia.
Vinum in comuni
Vinum Selenite.
AQVAE inter cu-
tem remedia.
Vide, Hydropicorum.
ARANEIS con-
traria.
Morus
Grossi
Melanthion.
ARANEI icus
remedia.
Mullus piscis
Allium
Melissophyllon
Coris
Oxychoenus
Hyacinthus
Aizoon maius.
ARGENTI viui
curatio.
Diosc. lib. 6. cap. 28.
ARGEMATVM
morbi remedia
Fel animalium
Vrina
Lactuca syluestris
Cera
Argemone
Anagallis
Ocimum
Papauer ceratitis
Lotus sativa.
AQVATORVM
remedia.
Onos, siue millepeda
Asparagus
Cyclaminos
Spondylion
Oenanthe
Buphthalmos
Chrysanthemon
Vinum absinthite.
ARSENICI, siue
auripigmenti.
curatio.
Diosc. lib. 6. cap. 29.
ARTICVLORVM
morbis vtilia.
Amurca.
Anethinum
Agaricum
Arction
Bulbus esculentus
Cent

CURATIVVS.

Centaurium minus
Cinis vitium
Helleborus niger
Scammonium
Mandragoras
Meon
Naphtha
Nardus
Narcissus
Ouum
Oxymel
Palma elate
Pentaphyllon
Psyllium
Ruta
Thapsia
Thymoxalme
Vua passa
Vinum melitite.

ARTERIALIA re- media.

Irinum
Myrrha
Thus
Caryotæ, siue caryoti-
des.
Ficus
Sinapi
Prason, id est porrum
Glycyrrhiza
Triticum
Rhapanus
Laserpitium
Pentaphyllon
Vua passa
Rhodomeli

Tragacantha.

ASPIDVM mor-
sus remedia.

Cimices lecti

Butyrum

Clematis

Daphnoides

Aqua maris

Diosc. lib. 6. cap. 70.

ASTRICTORIA
medicina.

Aspalathus

Bryon

Crocus

Oleum omphacinum

Oleum ex oleastro

Myrrha

Vnguentum melinum

Vnguentum œnanthi-
num

Cortex thuris

Picea ac pinus

Pityides

Lentiscus

Terebinthus

Fuligo picis

Cypressus

Iuniperus

Vlmus

Paliurus

Cyprus

Lilia

Cistos

Hypocistis

Cydonia

Rosa

Pp

I N D E X

| | |
|-------------------|----------------------|
| Acacia | Abſinthium |
| Salix | Abſinthium ſcriphium |
| Vitex | Mentha |
| Olea ſylueſtris | Melilotus |
| Quercus | Maron |
| Caſſanea | Ruta |
| Galla | Cyminum fatioum |
| Thuſ | Hieracium maius |
| Palma | Conyzae tertiu genus |
| Palma elate | Lyſimachium |
| Malicorium | Clymenos |
| Myrtus | Anchuſa |
| Myrtidanum | Idæa radix |
| Malus | Granum tinctorum |
| Cotonea | Chryſocome |
| Perſica | Aizoon maius |
| Pira | Phlomidēs |
| Pira ſylueſtria | Lotus ſylueſtris |
| Mepilus | Ebulus |
| Mepilus alia | Vitis ſylueſtris |
| Cornus | Nuclei acinorum |
| Morus | Vua œnanthe |
| Lixiua ex ficu | Omphacium |
| Ionia ſiue Cionia | Paſſum |
| Adeps | Vinum omphacites |
| Adipum medicinae | Vinum nigrum è la- |
| Faba Aegyptia | bruſca |
| Lens | Vinum cydonites |
| Portulaca | Omphacomeli |
| Seris | Vinum apiſtes |
| Porrum | Vinum myrtites |
| Hedera | Vinum palmeum |
| Myoſotis | Vinum è cedro |
| Agaricum | Vinum piſſite |
| Rhaponicum | Vinum abſinthite |
| Gentiana | Vinum tragoriganite |
| | Vin |

CURATIVVS.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Vinum prasite | Adipum medicinae |
| Vinum calaminthite | Asphodelus |
| Vinum aromatite | Abſinthium |
| Spuma argenti | Aniſum |
| Chryſocolia | Aparine |
| Cinnabaris | Aqua maris |
| Calcanthon | Acetum |
| Diphryges | Acetum ſcilliticum |
| Arsenicum | Alumen |
| Sal | Aphronitrum |
| Fæx vini | Blattæ |
| Spongiæ | Beta |
| Lapis phrygius | Crocus |
| Lapis Aſius | Ciſtos |
| Lapis ſciſſilis | Cornix |
| Terra eretria | Cucurbita |
| Lapius ſamius | Cepe |
| Fuligo pictoria. | Capparix |
| ASSVLAS fixas cor- | Cucumis anguinus |
| poribus extra- | Daphnides |
| hentes. | Dracunculus maior |
| Cochleæ terreſtres. | Ficus |
| ATTONITIS vtilia | Fel animalium |
| Ampeloleuce. | Faba Aegyptia |
| A VRVG INEM | Flos æris |
| tollentia. | Flos ſalis |
| Lycium | Hedera |
| Agaricum | Helxine |
| Libanotis coronaria. | Irinum vnguentum |
| A VRICVLARVM | Hyſſopus |
| remedia. | Laurinum |
| Bulbus eſculentus. | Lycium |
| A VRIVM medi- | Lapation |
| cinae. | Malum punicum |
| Cannabis ſatiua | Myrtus |
| Araneus | Mel |

INDEX

Myosotis
 Mentha
 Melilotus
 Myrrha
 Oleum amygdalinum
 Oleum balatinum
 Oleum hyoscyaminū
 Olea sylvestris
 Onos
 Origanum
 Omphacium
 Pix
 Populus alba
 Plantago
 Porrum
 Peucedanus
 Prasion
 Polygonon mas
 Papauer satium
 Pfyllum
 Rhus obsoniorum
 Rosa
 Salix
 Senecta serpentis
 Sefamum
 Sinapi
 Spondylium
 Stoebe
 Strychnum satium
 Sulphur
 Thus cum pice
 Terebinthina
 Vermes
 Vrina
 Vinum myrteum, siue
 myrsinite

Vinum cedrites.
B ^DELLARVM, siue
 hirudinū curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 32.
BESTIAS fu-
 gantia.
 Acantha leuce, siue spi-
 na alba.
BESTIARVM ve-
 nenatarū remedia.
 Balsamum
BESTIARVM mor-
 sus remedia.
 Helenium Aegyptium
 Sanguis
 Porrum
 Allium
 Argemone
 Eryngium
 Pulegium
 Apium
 Vinum cedrite
 Sal
 Terra samia.
BILEM ad gene-
 rantia.
 Iuglans.
BILEM pur-
 gantia.
 Agrioraphanus
 Androsamos
 Anchusa
 Apios
 Brassica canina
 Calamintha
 Clematis

Cic.

CURATIVVS.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cici | BRONCHOCE- |
| Cucumis anguinus | las discutientia. |
| Characias | Vide, gutturis remedia |
| Chamaelea | SVPRESTIS ve- |
| Helleborum nigrum | neni remedia. |
| Elaterium | Lac schiston. |
| Ebulus | Dioscorides libro 6. |
| Epithymum | cap. 3. |
| Empetron | CACHEXIAS, id |
| Helenium | est maciei remedia. |
| Hippophaes | Aqua maris. |
| Heliotropium | CACOETHE re- |
| Iris illyrica | media. |
| Lychnis sylvestris | Vnguentum rosaceum |
| Lathyris | Crocinum. |
| Linozoëis | Thus |
| Malus | Glandes |
| Melanthion | Ficus |
| Mentha | Cicer |
| Mandragoras | Plantago |
| Ocimum | Dracunculus maior |
| Parthenion | Dracunculus minor |
| Peplos | Hedera |
| Scammonia | Viscum |
| Thlaspi | Asclepias |
| Thapsia | Psyllium |
| Thymelæa | Vrtica |
| Vitis fatiua | Petasites |
| Vnguentum fusinum | Cadmia |
| id est, lilij. | Diphryges |
| BLATTAS in se | Flos salis. |
| contrahentia. | CALCIS curatio. |
| Phlomides. | Diosc. lib. 6. cap. 29. |
| BOVM scabiem | CALCVLI remedia. |
| emendantia. | Cyperus |
| Cedria. | Cardamonum |

INDEX

| | |
|-------------------|----------------------|
| Oleum amygdalinum | Lapides spongiarum. |
| Cerasia | CALEFACTO. |
| Amygdalus amara | riæ medicinæ. |
| Ossifragus | Adipum medicinæ |
| Vrina | Medullæ animalium |
| Sium | Fel |
| Struthion | Cera |
| Centaurium maius | Propolis |
| Bdellium | Triticum |
| Daphnides | Raphanus |
| Paliurus | Raphanus agria |
| Pruna | Sisymbrium |
| Finum | Sisymbriū aquaticum |
| Lapathon | Sinapi |
| Sisymbrium | Nasturtium |
| Ononis | Thlaspi |
| Cyminum sylvestre | Erysimon |
| Artemisia | Piper |
| Hippomarathon | Zingiber |
| Asplenon | Dracunculus maior |
| Anthemis | Dracunculus minor |
| Parthenion | Asphodelus |
| Prænia | Bulbus esculentus |
| Lithosperma | Agaricum |
| Althæa | Gentiana |
| Tribulum | Anonis, siue Ononis |
| Saxifragum | Eryngion |
| Gramen | Absinthium |
| Tragion | Absinthium seriphium |
| Acanthus | Hyssopum |
| Cotyledon prima | Origanum |
| Vitis sativa | Tragoriganum |
| Myrtus sylvestris | Pulegium |
| Oxalme | Mentha |
| Lapis Iudaicus | Serpyllum |
| Ochra | Sampsuchum |

Ma

C V R A T I V V S.

| | |
|----------------------|------------------------|
| Maron | Daphnides |
| Aspalathus | Cyprus |
| Crocomagma | Cistos alia |
| Helenium | Vitex |
| Oleum vulgare | Amygdalæ amaræ |
| Oleum sicyonium | Ficus |
| Strigmenta gymnasto- | Lixivia ex ficu |
| rum & palæstrarum | Cissaris |
| Blæomeli | Cochleæ terrestres |
| Laurinum | Fiber |
| Sampsuchinum | Buprestis pityocampa |
| Ocimum | Salamandra |
| Anethinum | Oesypus |
| Susinum | Panaces heraclion, si- |
| Cyprinum, siue ligu- | ue herculeum |
| strinum | Ligusticum |
| Irinum | Seseli Malsiliense |
| Gleucinum | Sison |
| Amaracinum | Anisum |
| Metopium | Caros |
| Stacte | Anethum |
| Nardinum | Cyminum sativum |
| Malabathrinum | Ammi |
| Myrrha | Oreoselinon |
| Myrrha Boeotica | Smyrnion |
| Styrax | Hippomarathrum |
| Bdellium | Daucus |
| Thes | Libanotis |
| Terebinthus | Laserpitium |
| Resina | Galbanum |
| Palimpissa | Ammoniacum |
| Iuniperus | Stachys |
| Sabina | Scordion |
| Cedria | Artemisia |
| Cedrides | Anthemis |
| Laurus | Chrysocome |

INDEX

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Portulaca agrestis | Chamaesyce |
| Lotus sylvestris | Flos æris |
| Vinum picatum | Pumex |
| Vinum in communi | Fæx vini |
| Aqua maris | Lapis thyites. |
| Vinum è cedro, arboribusq; alijs | CALLORVM remedia. |
| Vinum è cypresso | Triticum |
| Vinum cedrite | Laserpitium |
| Vinum chamædryte | Chalcitis lapis. |
| Aerugo aurificum | CANCRESCENTIBUS vlceribus medetur. |
| Chrysocolla | Vrtica. |
| Calcanthion | CANES occidentia. |
| Alumen | Asparagus |
| Sulphur | Apocynon. |
| Flos salis | CANIS rabie sanat. |
| Pyrites | Alyssum. |
| Lapis hæmatites. | CANIS rabiosi morsus remedia. |
| CALEFACTO- rum remedia. | Lycium |
| Lana succida. | Cancro |
| CALIGINIS oculorum remedia. | Cinis vitium |
| Fel animalium | Garum |
| Lactuca sylvestris | Omotarichos |
| Ocimum | Smaris |
| Dracunculus maior | Iecur ardens canis |
| Sinapi | Triticum |
| Nasturtium | Sanguis |
| Erysimon | Mel |
| Zinziber | Grossi |
| Dracunculus minor | Panaces heracleon |
| Anagallis | Cepe |
| Chelidonium maius | Laserpitium |
| Sagapenon | Vrina |
| Chamædrye | |

Aster

CURATIVVS.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Aster atticus | Lac schiston |
| Melissophyllon | Adipum medicinae |
| Vrtica | Diosc. lib. 6. cap. 1. |
| Cynoglosson | CAPILLORVM |
| Foeniculum | defluuium re- |
| Ballote | primen- |
| Oxalme | tia. |
| Adhronitrum, siue spu- | Oleum ex oleastro |
| ma nitri. | Myrrha |
| Diosc. lib. 6. cap. 37. | Cistos alia, siue Iadan |
| Herm. Coroll. cap. 212. | Myrtus |
| CANIS non rabidi | Brassica sativa |
| morsus remedia. | Nasturtium |
| Amygdalæ amaræ | Aloë |
| Iuglans | Adiantum. |
| Ficus | CAPILLVM |
| Mituli | denigran- |
| Gobius | tia. |
| Cucumis | Cupressus |
| Bulbus esculentus | Fagus |
| Mentha | Ilex |
| Ebulus. | Palma elate |
| CANIS impetum | Myrtus |
| cohibentia. | Hedera |
| Iecur & dens canis. | Elelisphacos |
| CANIS necantia. | Rubus |
| Chamæleon albus. | Vinum myrtite. |
| CANVM scabiem | CAPILLVM |
| emendantia. | ruffantia. |
| Oleum lentiscinum | Cyprus |
| Cedria. | Lycium |
| CANTHARIDES | Lotus |
| fugantia. | Fæx vini. |
| Vnguentum melinum. | CAPILLVM |
| CANTHARIDVM | flauum red- |
| veneni remedia. | dentia. |

INDEX

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Aqua maris. | Bettonica, siue Britan- |
| CAPILLVM | nica |
| purgantia. | Xyris |
| Fœnogræcum | Rubus |
| Linum. | Rubus Idæus |
| CAPILLOS | Oxalme |
| tingentia. | Vinum myrsinite |
| Acacia | Sal. |
| Myrtus | CAPITIS do- |
| Morus | loris reme- |
| Stratiotes terrestris | dia. |
| Ebulus | Iris Illyrica |
| Terra ampelites. | Asarum |
| CAPILLOS | Meon, siue meu |
| nutrientia. | Oleum oleastri |
| Iuglans. | Oleum amygdalinum |
| CAPITIS vlce- | Vnguentum rosaceum |
| rum remedia. | Narcissinum |
| Balsamum | Cyprus |
| Oleum ex oleastro | Rosæ |
| Oleum amygdalinum | Vitex |
| Vnguentum rosaceum | Amygdalæ amaræ |
| Telinum | Torpedo |
| Narcissinum | Lac humanum |
| Myrrha | Lana succida |
| Thus | Curmi |
| Vrina | Sisymbrium |
| Fœnogræcum | Sesamum |
| Cicer | Hedera |
| Linum | Portulaca |
| Malua | Aloë |
| Allium | Mentha |
| Cyclaminos | Serpyllum |
| Bulbus esculentus | Baccharis |
| Melilotus | Rata |
| Lilium | Anisum |
| | Spon |

C V R A T I V V S.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Spondylium | Men, siue meon |
| Peucedanum | Peucedanus |
| Melanthion | Mandragora |
| Conyza maior | Vinum gypsatum |
| Anagyris | Vinum phœnicite |
| Bettonica | Vinum rhetinite |
| Radix hederæ | Vinum mesagite. |
| Oxyſchoenos | C A P V T purgantia. |
| Pſyllium | Anemone |
| Papauer rhœas, siue er | Brassica fatiua |
| raticum | Beta |
| Strychnon, siue solanū | Cepe |
| fatiuum | Chelidonium minus |
| Aizoon maius | Calcanthum |
| Hippoglosson | Cyclaminos |
| Chamædaphne | Origanum. |
| Myrtus syluestris | C A R B V N C V L O. |
| Elaterium | rum medicina. |
| Scammonium | Brassica fatiua |
| Vitis fatiua | Cupressus |
| Vinum | Cinnamomum |
| Vua œnanthe | Cyprus |
| Aqua maris | Coriandrum |
| Acetum scillite | Characias |
| Lapis ophites. | Eruum |
| C A P I T I S dolo. | Fimum |
| rem facientia. | Iuglans |
| Styrax | Lupinum fatiuum |
| Oliuæ | Laserpitium |
| Glandes | Nasturtium |
| Palma | Olea syluestris |
| Arbutus | Pix |
| Iuglans | Plantago |
| Eruum | Panaces heracleon |
| Absinthium | Sabina |
| Ferula | Vua passa, |

C A R

INDEX

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| CARDIACO, | CASEVS ne cariem |
| rum reme- | sentiāt. |
| dia. | Dracunculus minor. |
| Buprestis | CAVA implentia. |
| Seris | Cadma |
| Rubus. | Promphilyx |
| CARNEM tenerio, | Cerussa |
| rum reddentia. | Lapis schistos |
| Vrtica siue acalyphe. | Lapis morochthus |
| CARNEM coale- | Terra samia |
| scere facientia. | Fuligo thuris |
| Lixiuia ficus | Aristolochia tertia. |
| Symphyton. | CEPAE acrimoniam |
| CARNES super- | retundit |
| uacuas compe- | Ruta. |
| scientia. | CERASTAE ictus |
| Characias | remedia. |
| Cadmia | Cedria, siue cedrinus li- |
| Aes vsum | quor. |
| Flos æris | Harundo |
| Laserpitium | Rosa |
| Lana vsta | Sal |
| Lapis Asius | Dioscor. lib. 6. cap. 55. |
| Spuma argenti | & 69. |
| Smaris. | CERVSSAE cu- |
| CARCINOMA- | ratio. |
| tum remedia. | Diosc. libr. 6. cap. 22. |
| Fuligo thuris | CERIONVM vl- |
| Buprestis | cerum remedia. |
| Cicer | Grossi |
| Erysimon | Pepo |
| Dracunculus maior | Quære , Fauos rum- |
| Dracunculus minor | pentia. |
| Aristolochia tertia | CERVICIS rigo- |
| Vrtica | ris medicinæ. |
| Galiopsis. | Vide , Opisthotonico- |
| | tum |

CURATIVVS.

rum remedia.
CHIRONIORVM

ulcerū remedia.
Plantago
Ampeloleuce.

CHOLERICIS
utilia.

Cotonea mala.
Calamintha
Ferrum Mentha
Polygonon mas.

CICATRICVM
remedia.

Anemone
Aloë Adeps

Bulbus esculentus
Balanus myrepica
Cistos

Centaurium
Chamæsyce

Calx viua

Corallium

Aes vstum

Aeris flos

Aerugo auriscum

Fuligo butyri

Faba

Fax vini

Oleum myrtinum

Oleum balaninum

Oleum cicinum

Olea æthiopica

Peucedanum

Plumbum elotum

Pumex

Scoria argenti.

CICVTAS

contraria.

Passum & vinum
Vinum in communi
Acorum

Hermo. Cor. cap. 17.

CIMICES fugan-
tia & necantia.

Hermo. Cor. cap. 366.
& 806.

CLAVORVM

remedia.

Smaris Fimum
Laserpitium.

COELIACORVM
remedia.

Myrrha

Hypocistis

Lycium

Olea syluestris

Quercus aut robur

Galla Thus

Myrtus

Cotonea

Morus

Lixiua ex ficu

Ceruinum cornu

Faba Aegyptia

Lapathon

Plantago

Coronopus

Rhaponicum

Acantha leuce, siue spi-
na alba

Ferula

Laserpitium

Tra

INDEX

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tragos herba | Paliurus |
| Papauer satium | Cyprus |
| Vinacei | Olea syluestris |
| Nuclei vinaceorum | Glandes |
| Elæomeli | Morus |
| Vinum phœnicite | Grossi |
| Vinum rhetinite | Ouum |
| Ferrum | Triticum |
| Lapis morochthus. | Hordeum |
| COLI remedia. | Fœnogræcum |
| Colocynthis | Linum |
| Fimum | Cicer |
| Galerita | Agrioraphanus |
| Mel | Plantago |
| Petroselinum | Sonchos |
| Ruta | Nasturtium |
| Sesamum | Bulbus esculentus |
| Talus suis. | Argemone altera |
| COLOREM com- | Rhaponticum |
| mendantia. | Acantha leuce |
| Acetum scillite | Thymus |
| Buphthalmos | Coriandrum |
| Cerussa | Smyrnum |
| Cyminum satium | Libanotis |
| Laserpitium | Viscum |
| Mastichinum | Parthenion |
| Vnguentum rosaceum | Cannabis syluatica |
| Vinum | Anagyris syluatica |
| Vinum aromatite. | Helxine |
| COLLECTIO. | Pentaphyllon |
| num remedia. | Peristerion supinus |
| Amomum | Papauer satium |
| Vnguentum telinum | Stratiotes aquaticus |
| Zopissa | Cytisus |
| Naphtha | Ampelos leuce |
| Myrica | Vinum in comuni |

CURATIVVS.

Vinum adynamon

Vinum cydonite.

COMITIALIS
morbi remedia.

Cardamomum

Balsamum

Naphtha

Populus nigra

Ficus

Iuncus odoratus

Lepus terrestris

Mustela Iecur

Vnguis asini

Lichen equi

Iecur hirci

Hirundines

Serum

Lachumanum

Coagulum

Fel

Sanguis

Fimum

Plantago

Eryngion

Ruta

Seseli Massiliense

Libanotis

Spondylion

Peucedanum

Laserpitium

Galbanum

Sagapenum

Ammoniacum

Trifolium

Conyza

Anthyllis

Symphyton

Cestron

Pentaphyllon

Papauer aphrodeles

Viola purpurea

Helleborum nigrum

Hippophastron

Ampelos leuce

Ampelos melana

Oxymel

Acetum scillite

Lapis selenites

Lapis aëtites

Cotes

CONCEPTIO.

ni contraria.

Epimedium

Heliotropium maius

Aerugo ferri

Alumen

Lapis ostracites

Herm. Cor. cap. 267.

CONCEPTIO.

nem facilliantia.

Coagulum

Lolium

Staphylinos agrios

Lapis samius

CONCOCTIO.

ni utilis.

Anethum

Althæa

Acetum scillite

Balsamum

Crocus

Crocomagma

Ca

INDEX

| | |
|------------------------|---------------------|
| Caros | Fimum |
| Cestron | Dracunculus maior |
| Calx viua | Dracunculus minor |
| Brucā | Asphodelus |
| Ligusticum | Capparis |
| Pulegium | Argemone |
| Papauer satium | Rhaponticum |
| Resina | Gentiana |
| Styrax | Aristolochia tertia |
| Seseli Massiliense | Centaurium maius |
| Sulphur | Acantha leuce |
| Vinum | Abrotonum |
| Vinum resinatum | Origanum |
| Vinum absinthite | Pulegium |
| Vinum tragoriganite. | Calamintha |
| CONSTRICTO- | Serpyllum |
| riæ medicinæ. | Baccharis |
| Vide, Adstrictoriæ me- | Panaces heracleon |
| dicinæ. | Libanotis |
| CONVULSIO, | Peucedanum |
| nis remedia. | Lasertitium |
| Iris illyrica | Sagapenon |
| Acorus | Galbanum |
| Cardamomum | Clinopodium |
| Asarum | Chamædrys |
| Costus | Alisma |
| Iuncus odoratus | Cestron |
| Balsamum | Xyris |
| Helenium | Symphytum |
| Calamus odoratus | Psyllium |
| Sampfuchinum | Phlomis |
| Metopium | Ampeloleuce |
| Bdellium | Vinum scilliticum |
| Iuniperus | Vinum chamædryte |
| Cedrides | Vinum tragoriganite |
| Halimos | Vinum daucites |
| Lixiua à fico | |

CURATIVVS.

Vinum panacite.

CONDYLOMA-
tum remedia.

Strigmenta à balneis

Myrteum

Myrtus

Cotonea

Ouum

Aloë

Anethum

Libanotis

Ballote

Stachys

Phalangion

Pentaphyllon

Vitis sativa

Ferrum

Plumbum elotum

Sandaracha.

CORDIS tremoris
medicinæ.

Nardi spica.

CORIANthro
contraria.

Vinum in communi

Diosc. lib. 6. cap. 9.

CORPORA defun-
cta à corruptione
diu tuetur

Cedria.

CORPVSMACRE-
scencia.

Canchamum.

COXA E doloris re-
media.

Strigmenta à palcstris.

COXENDICVM

doloris remedia.

Asparagus

Agaricus

Althæa

Abrotonum

Aster Atricus

Acetum scilliticum

Centaureum minus

Calamintha

Coris Cestron

Cucumis sylvestris

Erysimum

Euphorbium

Fimum Garus

Helenium

Ammoniacum

Hypericon

Hiberis

Heliochrysos

Iris Illyrica

Lolium

Lupinum sativum

Laserpitium

Naphtha

Onos

Populus alba

Panaces heracleon

Peucedanum

Pentaphyllon

Ruta

Scammonium

Vinum asarite

Xyris.

CRASSITVDL

nē extenuātia.

Q. q

INDEX

| | |
|----------------------|--------------------|
| Porrum | Amygdalæ amara |
| Staphis agria. | Cochleæ terrestres |
| CROCEVM colo- | Costus |
| rem facit | Chamæleon niger |
| Rhaponticum. | Iris Illyrica |
| CRVDITATIS | Lac |
| remedia. | Ficus |
| Balsamum | Linum |
| Strigmenta à balneis | Lupinus |
| Gentiana | Lotus sylvestris |
| Vinum scilliticum. | Mel ponticum |
| CRVSTAS generat | Oleum raphaninum |
| Lana vsta. | Picea |
| CVLICES fugan- | Sanguis leporis |
| tia. | Spuma argenti. |
| Cupressus | CVTIS pruritus |
| Conyza | remedia. |
| Ebulus | Lac. |
| Abſinthium | DENTIVM dolo- |
| Hiberis | ris remedia. |
| Plumbum vſum. | Amurca |
| CVTEM albicãtia. | Halicacabus |
| Rapum ſylveſtre. | Asparagus |
| CVTEM erugantia. | Allium |
| Oleum amygdalinum | Anagallis |
| Styrax. | Aristolochia |
| CVTEM lenientia. | Acantha leuce |
| Amygdala amara | Abſinthium |
| Oleum ſicyonium | Arction |
| Vnguentum telinum | Acetum |
| Succus Peponis | Acetum ſcillite |
| Terra Chia. | Alumen |
| CVTIS vitia tol- | Batrachion |
| lentia. | Cedria |
| Adarce | Cytinus |
| Ampelos leuce | Cochleæ terreſtres |

Cap

CURATIVVS.

Capparis
 Chelidonium maius
 Chamæleon niger
 Clematis daphnoides
 Cucumis anguinus,
 siue syluestris
 Characias
 Colocynthis
 Ephemerum
 Helleborus niger
 Ficus Galba
 Galbanum
 Hedera
 Hyoscyamus
 Hyssopus
 Lasepitiū
 Leucacantha
 Myrica
 Morus
 Melanthion
 Melissophyllon
 Naphtha
 Olea æthiopica
 Picea
 Plantago
 Panaces heracleon
 Pyrethrum
 Peucedanum
 Pentaphyllon
 Rhus
 Ranæ
 Sepiæ
 Senecta serpentis
 Strychnon hypnoticō,
 siue somniferum.
 Vnguentum rosaceum

Vermes terreni.
 DENTIVM suppo-
 ris remedia.
 Portulaca.
 DENTITIONI
 infantium vtilia.
 Leporis cerebrum
 Butyrum cum melle.
 DENTIFRICIA.
 Purpura
 Buccinum
 Ceruinum cornu
 Halcyonium
 Corallium.
 DENTIBVS suppo-
 rem adferentia.
 Cadmia.
 DENTES firmantia.
 Lentiscus
 Oliuæ colymbades
 Myrrha
 Oleum omphacinum.
 DENTES albica-
 refacit
 Halcyonium.
 DENTES vitiatos
 extrahentia.
 Amurca
 Oleum oleastri
 DENTES mouentia.
 Oleum oleastri.
 DEPILEs faciētia.
 Scolopendria
 Characias.
 DESQUAMATIS
 vtilia.

INDEX

| | |
|--|--------------------------|
| Strigmenta gymnastorum | DRACONIS marini morsus. |
| Lana succida. | Mullus piscis |
| DESTILLATIONES coërcentia. | Vrina |
| Irinum | Ocimum |
| Styrax | Absinthium |
| Naphtha | Plumbum elotū & crematum |
| Et in verbo, Pituite de stillationis remedia. | Sulphur |
| DILACRYMATIONES emēdantia. | Diosc. lib. 6. cap. 61. |
| Picea | DRYINI morsus curatio. |
| Pinus. | Diosc. lib. 6. cap. 65. |
| DISCVSSORIAE medicinae. | DVRITIEM emollientia. |
| Androsamon | Amaracinū vnguentū |
| Althæa | Bdellium |
| Viscum | Buphthalmos |
| Galbanum | Cyprinum |
| Ammoniacum | Capparis |
| Lapis Gagates. | Erysimon |
| DOLORVM inueteratorū remedia. | Aegilops |
| Sinapi | Ficus |
| Lana succida | Fimum |
| Ligusticum. | Glans |
| DOLORES lateris. | Galiopsis |
| Vide, laterum dolores. | Hydropiper |
| DLOREM ne sentiant qui vrendi se candīve sunt. | Ammoniacum |
| Mandragoras | Lens |
| Lapis memphites. | Linum |
| DORYCNI curatio. | Lapis alabastrites |
| Diosc. lib. 6. cap. 6. | Megalium |
| | Melanthion |
| | Mandragoras |
| | Porrum |
| | Panaces heracleon |
| | Pent |

CURATIVVS.

Pentaphyllon
Paronychia
Pyrites
Syrax
Sanguis
Smyrnion
Terra cimolia
Vinacei.

DYSENTERICO
rum remedia.

Adipum medicinæ
Asparagus
Argemone
Agaricum
Althæa Alcea
Alisma
Aizoon maius
Butyrum
Cupressus
Cotonea
Cornu
Cervinum cornu
Coagulum
Cera
Clematis daphnoides
Elatine
Eupatorium
Fœnogræcum
Faba Aegyptia
Ferrum
Galla
Omphacium
Hypocistis
Hedera
Hippuris
Lentiscus

Lycium
Lotus
Lixivia ex ficu
Lac schiston
Linum
Lapathum
Lysimachia
Myrrha
Macer
Malum punicum
Melissophyllum
Naphtha
Nymphæa
Nuclei acinorum
Oriza
Omphacium
Oxaline
Portulaca
Plantago
Phyllitis
Polemonium
Pentaphyllon
Papauer ceratitis, siue
corniculare
Quercus
Rubrica, siue terra le-
mnia
Silurus
Sanguis
Sium
Scordium
Symphyton
Stœbe
Sideritis achillea
Salsugo
Tragion

INDEX

- Vitis sativa, siue vini-
 fera
 Vinacei
 Vinum cydonite
 Et in verbo, Intestino-
 rum remedia.
E BRIETATI vi-
 lia.
 Amygdalus amara
 Brassica sativa
 Absinthium.
E LEPHANTIAE
 remedia.
 Cedria
 Erinaceus terrestris
 Serum
 Fel animalium
 Zythum
 Plantago
 Calamintha.
E LEPHANTIAS
 gignentia.
 Vinum siccyte.
E MOLLIENTES
 medicinae.
 Adipum medicinae.
 Bdellium
 Cinamomum
 Cypros
 Cistos Cera
 Cerussa
 Calcanthum
 Calx viva
 Oesypus
 Foenogracum
 Gleucinum
 Ammoniacum
 Irinum
 Laurus
 Lana succida
 Linum
 Lapis Gagates
 Metopium
 Myrrha Boeotica
 Medullae animalium
 Naphtha
 Palimpissa
 Panaces heracleon
 Psyllon
 Plumbum elotum
 Resina
 Styrax
 Viscum.
E NTEROCELAE
 remedia.
 Hippuris, siue equise-
 tum
E PHELIDIS vi-
 lia.
 Balanus myrepfica
 Cici.
E PINYCTIDIS mor-
 bi remedia.
 Olea sylvestris
 Myrtus
 Amygdalae amarae
 Grossi Fimum
 Brassica sativa
 Plantago
 Cucumis
 Porrum
 Absinthium
 Cor

CURATIVVS.

Coriandrū cum melle
passaq; vua

Viscum

Heliotropium maius

Vua passa.

EPIPHORA Ere-
media.

Asarum

Malobathrum

Cotonea

Crimnon

Coriandrum

Lilium

Ambrosia

Vua passa

Terra samia.

ERVGIS pinorum
conuenit

Vnguentum melium

Diosc. lib. 6. cap. 2.

ERVPTIONVM
remedia.

Scrum

Lupinum satium

Beta

Portulaca

Pentaphyllon

Balanus myreplica

Vinum myrsinite

Alumen.

EXCREATIO-
nis crassæ pectoris
remedia.

Pix liquida

Dracunculus minor

Tordylon.

EXCRESCEN-
tia deprimētia.

Alumen

Cerussa

Cinis vitis

Diphryges

Erinaceus marinus

Lapis Agius

Oebra

Pumex

Pyrites

Scordion

Spuma argenti

Sal.

EXTENUATO-
riæ medi-
cinæ.

Artemisia

Anthemis

Iris Illyrica

Hystopus

Lapis hæmatites

Pulegium

Panaces heracleon.

EXTRACTO-
riæ medicinæ.

Galbanum

Viscum

Thapsia

Scoria argenti.

FACIES ne à sole
adulatur.

Ouum.

FACIEI vitia' auge-
rentia.

Ampelos agria

Qq 4

INDEX

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Halcyonium | Vua passa |
| Adarces | Peponis radix |
| Brassica sativa | Grossi. |
| Bulbus esculentus | FAVCIUM morbi |
| Balanus myrepica | remedia. |
| Cinnamomum | Acetum |
| Cochleæ terrestres | Acetum scillite |
| Cyclaminos | Cacalia |
| Eruum | Aethiopsis |
| Ficus | Ficus |
| Hedera | Lac |
| Iris Illyrica | Laserpitium |
| Lepus | Mel |
| Lilium | Papauer sativum |
| Lotus sylvestris | Styrax. |
| Mastichinum | FAVCEs asperas |
| Mel sardoum | facientia. |
| Oleum amygdalinum | Characias |
| Oleum thaphaninum | Cimolia terra. |
| Pepo | FEBRIBVS con- |
| Polygonaton | traria. |
| Spuma argenti | Mala punica. |
| Sisymbrium aquaticum | FEBRIFUGIA. |
| Thapsia. | Centaurium minus |
| FACIEI rugas au- | Conyza. |
| ferentia. | FEBRIVM remedia. |
| Cacalia. | Agaricum |
| PASTIDIUM ge- | Aristolochia tertia |
| nerantia. | Anthemis |
| Vinum catorchite | Anchusa |
| Diosc. 6. in præfat. | Aphronitrum |
| FATIGATIO. | Balsamum |
| nū remedia. | Buglossum |
| Adeps. | Costus |
| FAVOS rumpentia. | Cucurbita |
| Eruum | Clymenon |
| | Fornis |

CURATIVVS.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Fœniculus | FELLE suffusis vti. |
| Hypericon | lia. |
| Hyoscyamus | Adiantum |
| Heliotropium maius | Vinum asarite. |
| Lachumanum | FELLE humoris |
| Lagopus | remedia. |
| Myrrha | Abſinthium |
| Ouum | Centaurium minus. |
| Oleum ſicyonium | FERITATEM ani- |
| Portulaca | maliū mitigantia. |
| Piper | Oenagra. |
| Panaces heracleon | FERRVMINA No- |
| Polygonon mas | di vim habentia. |
| Pentaphyllon | Spuma argenti |
| Peristerion ſupinus | Rubrica ſinopis |
| Rhaponticum | Spongia |
| Ruta | Lapis morochthus. |
| Smyrnion | FILIVM masculū |
| Sagapenon | generantia. |
| Saxifraga | Phyllon Orchis |
| Trifolium Vux | Cratægonos. |
| Vinum melitite | FISTVLARVM |
| Vinum rhoite | remedia. |
| Vinum hyſſopite. | Adeps |
| FEBRIS quartanæ | Arifaron |
| remedia. | Cinnamomum |
| Araneus | Characias |
| Bugloſſon | Chalcites lapis |
| Cimices lecti | Dracunculus minor |
| Dipſacum | Dipſacus |
| Hypericon | Helleborum nigrum |
| Heliotropion maius | Orchis Serapias |
| Pentaphyllon | Omphacinum |
| Verbenaca ſupina | Papyrus |
| Trifolium | Plantago |
| Ruta, | Pentaphyllon |
| | Qq s |

INDEX

Stratiotes terrestris.

FLATVS discutien-
tia.

Cinnamomum

Ocimum

Vinum stichadite.

FLATVM adgene-
rantia.

Malus

Rythum

Phaseolus.

FLUXIONVM
remedia.

Fuligo butyri

Erysimon

Lichen in petris

Ocimum

Portulaca

Pepo

Squama æris

Papauer satium

Acantha Arabica

Chium vinum

Acetum

Ebenus

Licum

Lixiua ex ficu

Vinum rhoite

Vinum terebinthinum

Vinum pissite

Vinum melapsinthiū.

FOETVS necantia.

Vide, Partus necantia.

FOEMINAS steri-
lescentia.

Lepus terrestris

Hedera.

FORMICAE mor-
bi remedia.

Cicer

Characias

Chamæsyce

Batrachion

Dipsacum

Heliotropium maius

Lacerta Ruta

Thus

Vitis satua.

FRACTURAE re-
media.

Fuligo pictoria.

FUNGORVM ve-
nenatorū re-
media.

Verbenaca

Fimum Mel

Rhaphanus

Abfinthium

Melissophyllon

Fungi

Vinum in communi

Acetum

Calcanthum

Sal

Pirorum ligni cinis

Aphronitrum

Cinis vitium

Lapis Agus

Diosc. lib. 6. cap. 23.

FVRVNCVLO-
rum remedia.

Ficus

Gro

C V R A T I V V S.

Grossi
Triticum
Rhapbanus
Asphodelus
Galbanum
Pycnocomum
Sal
Aphronitrum.

P V R F V R E S tollen
tia.

Allium
Adiantum
Alumen
Fœnogræcum
Fel animalium

Grossi
Linum
Lilium
Myrtus
Malua
Oleum oleastri
Oleum amygdalinum
Oleum myrrinum
Oxalme
Olea Salix
Vnguentum melinum
Vnguentum telinum
Vrina
Vinum myrsinite
Allium
Beta.

G A N G R A E N A E
morbi remedia.

Ampelos leuce
Brassica sativa
Bulbus esculentus

Cinnamomum
Characias
Galiopsis
Juglans
Lixivia de ficu
Lilium
Lens
Lupinum sativum

Laserpitium
Rhus
Rhapbanus
Vrtica
Vua passa.

G E N I T A L I V M
morbi remedia.

Asparagus
Amurca
Aloë
Aster atticus
Cyprinum
Cotyledon
Fœnogræcum
Flos salis
Linum
Malum punicum
Polygonon
Sampsuchinum
Vinum terebinthinũ.

G E N I T A L I V M
virus extinguen
tia.

Alumen.
G E N A R V N mor
bi remedia.

Aloë
Aerugo aurificum
Aerug

INDEX

| | |
|------------------------|--------------------|
| Aerugo ferri | Acetum scillite |
| Ammoniacum | Alumen |
| Lapis schistos | Butyrum |
| Mituli | Canchamum |
| Naphtha | Cytinus |
| Olea syluestris. | Chalcitis lapis |
| GENITVRAE pro- | Aerugo auriscum |
| fluuij in somno | Aerugo ferri |
| remedia. | Galla |
| Lactuca syluestris | Lycium |
| Nymphæa | Lepus terrestris |
| Hermol. Cor. cap. 932. | Lac schiston |
| GENERATIO | Lapis alabastrites |
| nem deprimentia. | Myrrha |
| Clymenon | Mastiche |
| Heliotropium maius | Oleum omphacinum |
| Mentha | Pruna |
| Thelypteris | Plantago |
| Xyphion | Pumex |
| Asplenon. | Rosa |
| GENITVRAM ex- | Rubus |
| tinguentia. | Staphis agria |
| Cannabis satiuæ semē | Sal |
| Anethum. | Tribulus |
| GENITVRAM | Vua oenanthē |
| augentia. | Vinum rhetinite. |
| Semen coriandri. | GIABROS aut de- |
| Coriandrum. | piles facientia. |
| GENITALIUM | Scolopendra |
| torporem in- | Characias. |
| ducentia. | GLADIORVM aciē |
| Cicuta. | perstringentia. |
| GINGIVARVM | Malum syluestre. |
| morbi remedia. | GLANDIS membri |
| Aristolochia tertia | remedia. |
| Aloë Acetum | Mel. |

G R A

CVRATIVVS.

GRAVEDINIS
remedia.

Styrax.

GVRGVLIONI
vtilia.

Silurus

GVTTVRIS re-
media.

Bdellium

Ficus

Aster Atticus

Vinum halosanthinum

G Y T S I curatio.

Lixiua ex ficu

Diosc. lib. 6. cap. 24.

H AEMORRHOI-
darū remedia.

Amaracinum

Allium

Anonis

Aloë

Cepe

Irinum

Libanotis

Lapis Arabicus

Ouum

Palma

Plumbum elotum

Rhus

Rubus

H AEMORRHOI-
darum curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 66.

H A L I T V S oris re-
media.

Agallochum

Anisum Bromos

Citrum

Malobathrum

Myrrha

Massiche

Vinum selenite.

H A S T V L A S infl-
xas corpori ex-
trahentia.

Oxyacantha.

H E P A T I C O R V M
remedia.

Vide, Iecinoris morbo
rum remedia.

H E R B A E quæ peri-
munt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

H E R N I A E medicinæ.

Cinnamomum

Cupressus

Cytinus

Pentaphyllon

Psyllium

Xiphion.

H E R P E T I S con-
traria.

Strychnon satium

Acetum.

H I R V N D I N V M

visus restauratia.

Chelidonium maius.

H I R V N D I N E S

pellentia.

Acetum.

H I R V N D I N I S

curatio.

Dio

INDEX

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Diosc. lib. 6. cap. 32. | Arction |
| HOMINEM ne- | Acetum |
| cantia. | Arsenicum |
| Iuniperi ramenta | Alumen |
| Smilax seu taxus. | Brassica fatua |
| HOMINIS morsus | Beta |
| remedia. | Bulbus esculentus |
| Iuglans. | Ballote |
| HORRORES excu- | Caries lignorum |
| tientia. | Cistos |
| Vide, Rigorem excu- | Chelidonium |
| tientia. | Centaurium |
| HVLCERANTES | Chamaeleon niger |
| medicina. | Coriandrum |
| Buprestis | Chamaedrys |
| Salamandra | Chamaepitys |
| Batrachion | Chamelæa |
| Ruta | Cadmia |
| Lonchitis | Cinis vitis |
| Hedysaron | Corallium |
| Clematis | Dracunculus |
| Portulaca agrestis | Elelisphacon |
| Ampeloleuce. | Eupatorium |
| VLCERV M re- | Ebulus |
| media. | Aes vstum |
| Amygdala amara | Ficus |
| Anemone | Fimum |
| Amylum | Aerugo aurificum |
| Anagallis | Fel |
| Aristolochia | Glans |
| Aloë | Grossi |
| Anthemis | Hedera |
| Althæa | Goëd, id est, coriandrū |
| Anchusa | Gentiana |
| Astragalus | Iris Illyrica |
| Aconiton | Isatis |

Indic

CURATIVVS.

| | |
|--|-----------------------|
| Indicus lapis | Pumex |
| Lixiua cū cinere ficus | Rhamnus |
| Lentiscus | Ruta |
| Lycium | Stratiotes terrestris |
| Lana combusta | Scordion |
| Lolium | Sandaracha |
| Lens | Sal |
| Lupinus | Spongia |
| Libanotis | Thus |
| Laserpitium | Viscum |
| Lilium | Thelypteris |
| Myrtus | Testæ fornacum |
| Mel | Vrtica. |
| Mandragoras | HVMORVM malo- |
| Nasturtium | rum medicinæ. |
| Narcissus | Metopium vnguentū |
| Olea syluestris | Nardinum |
| Oleum amygdalinum | Amygdalæ dulces |
| Orobus | Mel. |
| Orchis | HADROPICO- |
| Oenagra | rum remedia. |
| Omphacium | Asarum |
| Plantago | Amurca |
| Pix | Halicacabus |
| Palma | Allium |
| Purpura combusta | Absinthium |
| Pepo | Anisum |
| Panaces | Androsaces |
| Peucedanum | Alisma |
| Prasion | Ampelos agria |
| Pentaphyllon | Aqua maris |
| Peristereon supinus | Acetum |
| Papauer ceratidis, id est, corniculare | Aphronitrum |
| Psyllium | Halcyonium |
| Plumbum elotum | Buprestis |
| | Cyperus |

Cin

INDEX

| | |
|--|-------------------------|
| Cinnamomum | Vrina |
| Calamus odoratus | Vinum scillite |
| Cochleæ terrestres | Vinum rherinite |
| Cicer | Vinum cedrite |
| Chamæleon albus | Vinum asarite |
| Chamædrys | Vinum panacite. |
| Cestron | HYOSCYAMI cu- |
| Cotyledon | ratio. |
| Cucumis anguinus | Diosc. lib. 6. cap. 15. |
| Cici | I E C I N O R I S reme- |
| Helleborum nigrum | dia. |
| Ebulus | Acorus |
| Ficus | Nardi spica |
| Erinaceus terrestris | Nardum gallicum |
| Hippophaës | Amomum |
| Hippophaëston | luncus odoratus |
| Hystopus | Agallochum |
| Laserpitium | Picea |
| Lathyris | Pinus |
| Origanum | Daphnoides |
| Plantago | Palma elate |
| Pancratium | Amygdalæ amara |
| Polium | Lac humanum |
| Raphanus | Scandyx |
| Ruta | Struthium |
| Scilla | Anagallis |
| Sampfuchus | Agaricum |
| Staphylinus | Rhaponticum |
| Smyrnion | Gentiana |
| Strychnon hypnoticō, sive solanum somni- ficum | Glycyrrhiza |
| Sal | Eryngion |
| Trifolium | Absointhium |
| Tithymalus | Serpyllum |
| Vitex | Spondylium |
| | Ammoniacum |
| | Anthemis |
| | Cham |

C V R A T I V V S.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Chamæpitys | Cotyledon |
| Vettonica | Cici |
| Eupatorium | Chalcitis lapis |
| Hyoscyamus | Aerugo ferri |
| Pentaphyllon | Harundo |
| Chrysocome | Helxine |
| Papauer ceratitidis, siue | Ifatis |
| cornutum | Lens |
| Epipactis | Lilium |
| Isopyron | Lens palustris |
| Vinum cydonite | Lapis smyris |
| Vinum pifsite | Myrtus |
| Vinum abfinthite | Malua |
| Vinum nardite | Mandragoras |
| Vinum asarite | Portulaca |
| Vinum ex fylueftri a- | Plantago |
| faro | Parthenion |
| Vinum chamælatres | Polygonon mas |
| Rubrica finopis. | Pentaphyllon |
| I G N I S facri re- | Peristereon rectus |
| media. | Papauer fatium |
| Asarum | Psyllium |
| Acacia | Rhamnus |
| Acinos herba | Rofa |
| Anchufa | Ruta |
| Lycopfis | Rubus Idæa |
| Aizoon maius | Salix |
| Bralsica fatiua | Sanguis |
| Acetum | Seris |
| Beta | Strychnon, siue folanū |
| Baccharis | fatium |
| Bechion | Stratiotes aquaticus |
| Crocus | Vrina. |
| Cupreffus | I L E I morbi remedia. |
| Coriandrum | Oleum vulgare |
| Cicuta | Strychnos halicaca- |
| | R r |

INDEX

| | |
|------------------|-------------------|
| bus. | Bulbus esculentus |
| IMPETIGINIS | INFLATIONVM |
| morbi remedia. | remedia. |
| Amygdalæ amaræ | Aspalathus |
| Lapathon | Amygdalæ amaræ |
| Lichen in petris | Abfintbium |
| Lolium | Anifum |
| Thus | Anethum |
| Myrrha | Anthemis. |
| Nafurtium | Althæa |
| Sinapi | Coftus |
| Propolis. | Cicer |
| INCUSsis vtilia. | Cyminum |
| Phlomides. | Eryngion |
| INFANTES mor- | Epithymum |
| tuos vtero eij- | Helenium |
| cientia. | Hyffopum |
| Dictamnus. | Hieracium maius |
| INFANTIBVS | Iuncus odoratus |
| vtilia. | Iuniperus |
| Athara | Lac |
| Aster Atticus | Ligusticum |
| Strychnum fatium | Hordeum |
| Smilax aspera. | Ocimum |
| INFANTIVM pu- | Peucedanum |
| pillæ vt glaucæ, | Rapa fylueftris |
| non nigræ red- | Rhaponticum |
| dantur. | Triticum |
| Auellana. | Thymoxalme |
| INFLATIONES | Vrtica |
| facientia. | Vinacci |
| Allium | Vinum |
| Capparis | Vinum pifsite |
| Glans | Vinum abfynthite |
| Laferpitium | Vinum fcilliticum |
| Porrum | Vinum chamædryte |
| | Vin |

CVRATIVVS.

Vinum tragoriganite

Vinū syluestris nardi.

INFLAMMATIO

num remedia.

Coriandrum

Adeps

Asphodelus

Argemone

Anagallis

Artemisia

Aizoon maius

Acetum

Butyrum

Brassica syluestris

Bechion

Brion thalassion

Casia

Cotyledon prima

Elatine

Ebulus

Faba

Ficus

Harundo

Hyoscyamus

Irinum

Laurus

Linum

Lupinum satium

Lonchitis

Lichen in petris

Lens palustris

Lapis

Melilotus

Mandragoras

Naphtha

Ocimum

Ochra

Picea

Platanus

Portulaca

Pulegium

Parthenion

Polygonon mas

Papauer erraticum

Rosa Rhus

Susinum

Sabina

Sesamum

Sonchos Scordion

Symphytum

Stratiotes aquaticus

Triticum

Tribulus

Vinacei

Xyris.

INGVINUM mor-

bi remedia.

Vide, Genitalium.

INGENIVM prom-

ptum facientia.

Ouum.

INSANIAM in-

ducentia.

Hyoscyamus

Strychnon hypnoticō

Mandragoras.

INSANIENTIVM

remedia.

Bettonica

Helleborum nigrum.

INSOMNIA indu-

centia.

Rr 2

INDEX

Vide, Somniferæ me-
dicinæ.

INTESTINORVM
remedia.

Agallochum

Anthemis

Cochleæ terrestres

Hippuris

Irinum Lac

Linum

Massichinum

Malua

Hordeum

Palma

Portulaca

Rosaceum

Rosa

Ruta Salix

Spartum

Vinum surrentinum

Triticum.

Et in verbo, Dysenteri-
corum remedia.

INTERTRIGO vt
tollatur.

Vitex

Corium.

ISCHIA DICO-
rum remedia.

Asarum

Balsamum

Cardamomum

Silurus

Finum

Nasturtium

Thlaspi

Rhaponticum

Thymus

Ammoniacum

Leontopetalon

Erythrodanum

Ascyron

Androsæmum

Chamæpitys

Polemonia

Ocimoides

Aethiopis

Arction

Chamæcissos

Spartum

Colocynthis

Oxymeli

Vinum panacite

Salsugo

Adarces.

IVMENTIS con-
traria.

Gramen cilicum

Nerion.

IVMENTORVM
scabiem emen-
dantia.

Amurca

Alysson

Lupinum satium

Oleum picinum

Oleum lentiscinum.

IVMENTORVM
vlcera emen-
dantia.

Oleum picinum

Alysson

Thel

CURATIVVS.

Thelypteris.

LABIORVM scissu-
ræ remedia.

Adeps

Lycium.

LAC coagulantia.

Balsamum

Ficus.

LAC extinguentia.

Cicuta.

LACRYMAS
trahentia.

Aerugo aurificum

LACERTAE mor-
sus remedia.

Portulaca

Seps, siue lacerta cal-
chidica, in vino epo-
ta.

LACRYMAE
quæ perimunt.

Dioscorides libro 6. in
præfat.

LACRYMA-
tiones emen-
dantia.

Vide, dilacrymationes
emendantia.

LACTIS vberta-
tem facientia.

Argemone

Anethum

Ampeloleuce

Cicer

Circæa

Echion

Fœniculus

Halimos

Hordeum

Lactuca

Malua

Melanthion

Ocimum

Sonchos

Vitex.

LACTIS coagu-
lati curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 26.

LASSITVDINVM
remedia.

Anethinum

Adeps

Clymenon

Laurinum

Ammoniacum

Sal

Lapis gagates

Vinum chamæxetes.

LATERVM mor-
bi remedia.

Acorus

Agallochum

Asphodelus

Aristolochia tertia

Ampeloleuce

Balsamum

Brassica sativa

Bdellium

Cyprinum

Fimum

Centaurium maius

Gentiana

Galbanum

R r 3

INDEX

| | |
|------------------------|----------------------|
| Hordeum | Galbanum |
| Leucacantha | Melanthion |
| Myrrha | Raphanus |
| Naphtha Phu | Sanguis leporinus |
| Panaces heracleon | Sisymbrium sylvestre |
| Petroselinon | Spuma argenti |
| Prasiū, siue marrubium | Triticum cum aceto. |
| Pseudobunion | LEPRAE remedia. |
| Ruta | Allium |
| Sagapenum | Anemone |
| Terebinthina | Aristolochia |
| Thapsia | Acantha |
| Vrtica | Anchusa |
| Vinum cedrite | Acetum |
| Vinum hyssopite | Ampelos leuce |
| Vinum stichadite | Halcyonium |
| Vinum tragoriganite | Alumen Adarce |
| Vinum aromatite | Buprestis |
| Vinum acorite | Brassica sativa |
| Vinum glycyrrhite. | Cochleæ terrestres |
| LENDÆS necantia. | Clematis |
| Cedria Mel | Fraxinus |
| Myricæ Beta | Cucumis anguinus |
| Allium | Helleborum nigrum |
| Alumen. | Aerugo aurificum |
| LENTIGINIS ma- | Ficus |
| culæ remedia. | Fel |
| Alysson | Hordeum |
| Halcyonium | Iuniperus |
| Aqua maris | Lolium |
| Ampeloleuce | Lapathum |
| Brassica sativa | Lepidium |
| Bulbus esculentus | Myosotis |
| Balanus myrepica | Oleum oleastri |
| Cinnamomum | Oleum cicinum |
| Eruium | Olea æthiopica |
| | Oris |

C V R A T I V V S.

Oriza

Salamandra

Serum

Sinapi

Struthion

Scammonia

Sulphur

Sal

Terebinthina

Thapsia

Terra melia

Vlmus

Vrina

Vitis fatiua.

LEPORIS ma-
rini remedia.

Fiber

Cornus

Lapis ophites

Halcyonium

Chamæleon niger

Cicer

Cucumis anguinus

Characias

Helleborum nigrum

Ficus

Glutinum

Laserpitium

Olea

Pruna

Rhaponticum

Ruta

Sal

Vitis fatiua

Vinum tethalassome-
num.

LIENIS morbi
remedia.

Iris Illyrica

Nardum gallicum

Myrice

Acorus

Canchamum

Oleum amygdalinum

Lycium

Vitex

Cotonea

Linum

Ficus Aegyptia

Lac humanum

Lupinum satium

Raphanus

Lapathum

Sinapi

Brassica fatiua

Nasturtium

Piper

Struthion

Hedera

Cyclaminos

Pancration

Capparis

Lepidium

Agaricum

Rhaponticum

Aristolochia tertia

Crocodilion

Absinthium

Hysopum

Tragoriganum

Pulegium

Dictamnus

Rr 4

INDEX

Sifon
 Anifon
 Smyrnion
 Peucedanum
 Sagapenum
 Ammoniacum
 Viscum
 Polium
 Chamedrys
 Leucoion
 Nymphaea
 Asplenon
 Hemionitis
 Erythrodanum
 Veronica
 Lonchytis altera
 Polemonia
 Clymenon
 Xyris
 Anchusa
 Adiantum
 Pteris
 Ampelos leuce & agria
 Aqua maris
 Vitis sativa
 Acetum scilliticum
 Vinum panacite
 Ferrum
 Corallium
 Lapis Asius
 Coris
 Hermol. Cor. cap. 124.
 LINGVABUS
 Olea aethiopica.
 LIPPITVDI-
 nis remedia.
 Ebenus
 Lapis haematites
 Plantago
 Spongia.
 LIQVORES qui
 perimunt.
 Dioscorides libro 6. in
 praefat.
 LIVOREM emen-
 dantia.
 Allium
 Aqua maris
 Juglans
 Lana succida
 Rhaponticum
 Sinapi
 Lupinum sativum
 Thapsia.
 LOCORVM mulie-
 brium remedia.
 Anethum
 Althaea
 Foenogracum
 Linum
 Leucoion
 Trifolium.
 LUMBRICOS
 necantia.
 Coriandri semen
 Absinthium seriphium
 Brassica sativa
 Chamæleon albus
 Calamintha
 Myrrha
 Portulaca
 Oleum cicinum

The

CURATIVVS.

Thelypteris
Lupinum satium.
I V M B O R V M affe-
ctuum remedia.

Asparagus
Capparis
Chamaepeuce

Echion

Harundo

Leucacantha

Papauer cornutum

Sampsuchinum

Smyrnion.

I V P O S necantia.

Aconitum pardalian-
ches

Aconitum alterum

Apocynum.

I V S C I O S O R V M
remedia.

Fel animalium

Sanguis.

I V X A T I S vtilia.

Asparagus

Acantha

Aphronitrum

Bulbus esculentus

Fimum

Harundo

Heliotropion

Iuglans

Lilium

Narcissus

Polypodium

Vitex

Vrtica

Vitis satia
Vinum pilsite
Sampsuchus
Sal.

M A C I E I corporis
remedia.

Erinaceus.

M A C V I A S

tollentia.

Oleum balaninum.

M A C V I A S rube-
scere facientia.

Crocodilea, id est, Cro-
codili terrestis simu.

M A L I S medicamen-
tis contraria.

Adeps

Ruta

Pentaphyllon

Antirrhion.

M A I O R V M quæ
serpunt re-
media.

Acacia

Plantago

Polygonon mas

Helxine

Cicuta

Strychnum satium

Aizoon mains

Colymbades oliuæ

Sabina.

M A M M A R V M

morbi remedia.

Asarum

Cotonea

R r s

INDEX

Juglans
 Thus
 Erysimon
 Ochra
 Lens
 Eruum
 Asphodelus
 Mentha
 Scammonia
 Sandaracha
 Triticum
 Baccharis
 Apium
 Asclepias
 Hemerocallis
 Althæa
 Chamæpitys
 Epimedium
 Cici
 Hyoscyamus
 Vinacci
 Aqua maris
 Fax vini
 Terra samia.
 MAMMAE virginum
 ne crescant.
 Cicutæ
 Cotis.
 MASCULVM
 filium gene-
 rantia.
 Cratæogonos
 Phyllon
 Orchis.
 MATRICIS mor-
 bi remedia.

Malua
 Oleum balaninum
 Prænia.
 MAXILLARVM
 doloris remedia.
 Ceruinum cornu.
 MEATUS ape-
 rientia.
 Allium
 Cyperus.
 MECONIO
 contraria.
 Passum & protropon
 vinum
 Acetum
 Oxymel.
 MELICERIDVM
 morbi remedia.
 Serum
 Parthenion
 Helleborum nigrum
 Epithymum
 Acetum scilliticum
 Amomum
 Melilotus.
 MENSTRVA
 prouocantia.
 Iris Illyrica
 Meu
 Cyperus
 Asarum
 Casia
 Cinnamomum
 Costum
 Iuncus odoratus
 Balsamum
 Can

CVRATIVVS.

Canchamon
 Helenium
 Myrrha
 Sampsuchinum
 Amaracinum
 Abrotonum
 Stryax
 Naphtha
 Cedrides
 Myrice
 Tilia
 Hypocistos
 Lycium
 Acacia
 Vitex
 Olea syluestris
 Lotus
 Amygdala amara
 Ficus
 Cochleæ terrestres
 Fiber
 Buprestis
 Oesypus
 Fimium
 Cicer
 Raphanus
 Lapathum
 Brassica satina
 Chondrylla
 Lactuca syluestris
 Caucalis
 Eruca
 Ocimum
 Cepe
 Orobanche
 Allium

Porrum
 Ampeloprasum
 Nasturtium
 Thlaspi
 Struthion
 Cyclaminos
 Asphodelus
 Capparis
 Anemone
 Hedera
 Agaricum
 Aristolochia tertia
 Centaurium maius &
 minus
 Eryngion
 Absinthium
 Origanum
 Tragoriganum
 Pulegium
 Elelisphacos
 Calamintha
 Thymus
 Serpyllum
 Sampsuchus
 Paccharis
 Ruta
 Panaces heracleon
 Ligusticum
 Sefeli Massiliense
 Tordylon
 Sison
 Anisum
 Foeniculus
 Oreoselinum
 Petroselinum
 Hippomarathrum

Hip

INDEX

Hippofelinum
Smyrnion
Daucus
Libanotis
Melanthion
Laserpitium
Sagapenon
Euphorbion
Clynopodium
Chamædrys
Lilium
Melissophyllum
Prasium
Stachys
Trifolium
Polium
Scordion
Artemisia
Leucoion
Anthemis
Præonia
Erythrodanum
Anagyris
Alisma
Coris
Hypericon
Cestron
Medion
Xiphion
Tragion
Heliochrysos
Mandragoras
Vrtica
Myrtus
Adiantum
Myrtus sylvestris

Laurus Alexandrina
Daphnoides
Chamædaphne
Helleborus niger & al-
bus
Ampelos melæna
Heliotropion maius
Vinum scilliticum
Vinum absinthite
Vinum hyssopite
Vinum aromatite
Vinum daucite
Vinum panacite
Vinum helleborite
Vinum dictamnite
Staphylinus.

MENSTRUA sistentia.

Lentisci succus
Myrica
Oxyacanthos
Thus
Palma
Malum punicum
Myrtus
Lepus terrestris
Fuligo butyri
Coagulum
Sanguis
Acinos
Acantha Arabica
Hieracium maius
Nymphæa
Præonia
Limonion
Medion

Side

CURATIVVS.

Sideritis achilleos

Rubus

Idæa radix

Tragos Lyfimachia

Oxylchoenos

Heliochrysos

Papauer satium

Mandragora

Aizoon maius

Aerugo ferri

Vinum rhetinite

Fax vini

Lapis Asius

Morochthus

Hæmatites

Ostracites

Terra samia.

MENTEM com-
mouentia.

Coriandrum

Oreoselinum

METALLA quæ
perimunt.

Diosc. lib. 6. in præfat.

MOLLIENTES
medicinæ.

Vide, Demollientes.

MORBI regij
medicinæ.

Vide, Regij morbi.

MORBORVM quæ
serpunt remedia.

Vide, Malorum quæ
serpunt.

MVLIERV M desi-
derio quo satisfiat.

Acorum

Picea

Pinus

Adeps bubulus.

MVLIERV M

infirmorum
remedia.

Amomum

Balsamum

Susinum

Seseli Mafsilienfe.

MVRES necantia.

Chamæleon albus

Aconitū pardaliaches

Helleborus candidus

Hermol. Cor. cap. 28.

MVRIS aranei mor-
sus remedia.

Mus araneus

Abfinthium

Chrysogonon

Diosc. lib. 6. cap. 62.

MVRIS morsus
remedia.

Grosfi

Allium.

MVSCAS necantia.

Lyfimachia.

MYRMECIAS
tollentia.

Ficus.

NARIV M morbi
remedia.

Malum punicum.

NAVSEAM dis-
cutientia.

Tra

INDEX

Tragoriganum
Pulegium
Fœniculus.

NAVSEAM
mouentia.

Laurinum
Sufinum.

NERVORVN mor-
bi remedia.

Oleum scyonium
Oleum elæomeli

Laurinum
Cyprinum

Gleucinum

Amaracinum

Metopium

Bdellium

Lixiua ex ficu

Erinaceus terrestris

Cochleæ terrestres

Vipera

Vermes terreni

Lac humanum

Triticum

Poterium

Peucedanum

Laserpitium

Lilium

Satyrinum

Melissophyllon

Althæa

Coccus

Erigeron

Cacalia

Narcissus

Hippophastron

Vini qualitas

Aqua maris

Acetum scilliticum

Vinum stichadite

Vinum thymite

Fæx vini

Fiber.

NERVOS lædētia.

Malus

Hedera

Vinum

Vinum gypsatum

Mesagite.

NERVOS tollentia.

Mel fardoum.

NIGREDINES

abstergit.

Sabina.

NODIS vtilia.

Bdellium.

NOMARVM mor-
bos curantia.

Asparagus

Sabina

Papyrus

Cistos

Olea sylvestris

Olea

Oliuæ colymbades

Malum punicum

Smarides

Fel animalium

Vrina

Lilium

Plantago

Arifaron

As

C V R A T I V V S.

Asphodelus
 Maron
 Prasium
 Orchis serapias
 Britannica
 Perisfereon supinus
 Galiopsis
 Vua œnanthe
 Omphacinum
 Acetum
 Oxalme
 Squama aris
 Aerugo aurificum
 Chalcites lapis
 Flos salis
 Lapis ostracites.

N V B E C V L A S
 oculorū emen-
 dantia.

Vide, Oculorum reme-
 dia.

N Y C T I L O P A R V M
 morbi remedia.

Vide, Luscioforum re-
 media.

O B M V T E S C E R B
 facientia.

Mandragora.

O C V L O R V M epi-
 phoræ remedia.

Farum

Malabathrum

Coronea

Sesamum

Lens

Cucurbita

Anemone
 Argemone
 Myosotis
 Gentiana
 Baccharis
 Ruta
 Apium
 Hemerocallis
 Rubus idæa
 Papauer satium
 Phlomis
 Aster atticus
 Viola purpurea
 Cici.

O C V L I S contraria.

Lactuca
 Porrum
 Ocimum
 Coriandrum
 Anethum.

O C V L O R V M mor-
 borum remedia.

Acorum
 Cassia
 Cinnamomum
 Amomum
 Balsamum
 Canthamum
 Crocum

Crocomagma
 Oleum vulgare
 Elæomeli
 Oleum amygdalinum
 Myrrha
 Thus

Fuligo thuris & resinæ
 &

INDEX

| | | |
|--------------------|-------------------------|------|
| & picis | Fel animalium | |
| Picea | Sanguis | |
| Cupressus | Vrina | Mel |
| Sabina | Amylum | |
| Platanus | Faba | Lens |
| Populus alba | Brassica sativa | |
| Myrice | Portulaca | |
| Acalis | Seris | Pepo |
| Ebenus | Lactuca sylvestris | |
| Rosa | Ocimum | |
| Lycium | Cepe | |
| Acacia | Sinapi | |
| Salix | Piper | |
| Olea sylvestris | Zingiber | |
| Olea | Cyclaminos | |
| Olea Aethiopica | Asphodelus | |
| Palma thebaica | Dracunculus maior | |
| Cytinus | Dracunculus minor | |
| Myrtus | Argemone | |
| Cerasia | Anagallis | |
| Halicacabus | Chelidonium maius | |
| Mituli | Othonna | |
| Cochleæ terrestres | Centaureum minus | |
| Scorpius marinus | Tragacantha | |
| Vipera | Aloë | |
| Senecta serpentis | Abfinthium | |
| Sepia | Abrotonum | |
| Mullus piscis | Ruta | |
| Ouum | Sampsuchus | |
| Hirundines | Melilotus | |
| Cervinum cornu | Ruta Galatica, siue syl | |
| Lac humanum | vestris | |
| Costus | Panaces heracleon | |
| Fuligo butyri | Foeniculus | |
| Lana vsta | Libanotis | |
| Oesypus | Sagapenon | |
| | | Am |

C V R A T I V V S.

Ammoniacum
Sarcocolla
Chamaedrys
Prasium
Stœbe
Tribulus
Erinos
Gramen parnasium
Rubus
Elatine
Papauer satium, &
cornutum
Hyoscyamus
Mandragoras
Aconitum pardalian-
ches
Atzoon maius
Helleborus albus
Cici
Chamaesyce
Capnos
Lotus sativa
Sesamoides maius
Aes vstum
Vua œnanthe
Vinum surrentinum
Acerum scilliticum
Cadmia
Squama æris
Aerugo aurificum
Plumbum elotum
Stimmi
Cinnabaris
Chalcitis lapis
Alumen
Pumex

Sal
Flos salis
Fæx vini
Spongia
Corallium
Pyrites
Hæmatites
Galactites
Thyites
Morochthus
Sapphirus
Geodes
Samius

O P I S T H O T O N I
corum, id est, cerui-
cis rigore laboran-
tium remedia.

Acanthion
Eryngion
Laserpitium
Sagapenon
Satyrion
Coris.

O P I I remedia.

Sal
Diosc. lib. 6. cap. 17.
O R I S halitus re-
media.

Vide, Halitus oris re-
media.

O R I S vlcerum re-
media.

Cyperus
Aspalathus
Fuligo picis
Cyprus

S a

INDEX

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tilia | Thymus |
| Acacia | Baccharis |
| Olea syluestris | Seseli Mafsiliense |
| Castanea | Hieracium maius |
| Malum punicum | Smyrnion |
| Marna | Spondylium |
| Lac schiston | I'eucedanum |
| Butyrum | Melanthion |
| Plantago Aloë | Ammoniacum |
| Origanum | Melissophyllon |
| Leucoion | Bechion |
| Orchis serapias | Botrys |
| Anthemis | Anemone |
| Periclymenon | Hippuris |
| Rubus | Vrtica |
| Staphis agria | Elaterium |
| Vua oenanthæ | Hippophaëstion |
| Omphacium | Vinum panacite. |
| Acetum scilliticum | O S S I V M squamas |
| Sandaracha | extrahentia. |
| Alumen Sal. | Aristolochia |
| ORTHOPNOI, | Ampelos leuce. |
| cis, id est, difficul- | O S S A fracta conso- |
| ter spirantibus re- | lidantia. |
| media. | Vetonica |
| Helenium | Xyris. |
| Myrrha | O V E S necantia. |
| Cupressus | Nerion. |
| Daphnides | O X Y P A R A ingre- |
| Cotonea Vrina | dientia. |
| Struthion | Ligusticum |
| Cyclaminos | Caros |
| Dracunculus maior | Anethum. |
| Abrotonum | P A L P E B R A R V M |
| Hyssopus | remedia. |
| Calamintha | Vnguentum rosaceum |
| | Mass |

CURATIVVS.

Mastiche
 Resina
 Fuligo picis
 Grossi
 Lixiua ex fice
 Vrina
 Alumen
 Chondrylla
 Vide suprâ, Genarum
 morbi remedia.
 PALPEBRARVM
 pili euulsi ne renas-
 cantur.
 Tellinæ
 Sanguis
 Capnos.
 PALLIDVM colo-
 rem facientia.
 Hieracium minus
 Aloë.
 PANORVM remedia.
 Atriplex
 Acetum
 Bulbus esculentus
 Coriandrum cum fa-
 ba fracta
 Conyza
 Ficus
 Galiopsis
 Olea syluestris
 Helxine
 Ocimastrum
 Ammoniacum
 Isatis
 Plantago
 Xyphion.

PANTHERAS ne-
 cantia.
 Aconitum pardalian-
 ches.
 PAPAVERIS cu-
 ratio.
 Dioscor. lib. 6. cap. 17.
 & 18.
 PAPVLARVM re-
 media.
 Vrina
 Flos æris.
 PARALYTICO-
 rum remedia.
 Capparis
 Erythrodanum
 Colocynthis
 Ampelos melæna
 Vinum scilliticum
 Aphronitrum.
 PARTVS necantia
 Daphnides
 Coagulum
 Adeps hircinus & ouis
 lus & bubulus
 Nasturtium
 Thlaspi
 Ruta
 Hedyfaron
 Helleborus albus &
 niger
 Colocynthis
 Ampelos leuce
 Vinum phthorium.
 PARTVS quibus
 iuuatur.

INDEX

| | |
|--------------------|----------------------|
| Iris Illyrica | Prasum |
| Cinnamomum | Bechion |
| Balsamum | Artemisia |
| Vnguentum telinum | Conyza |
| Irinum | Leucoion |
| Amaracinum | Onosma |
| Myrtha | Anthemis |
| Picea Fiber | Anchusa |
| Olea æthiopica | Mandragoras |
| Oesypum | Laurus alexandrina |
| Fimum | Ampelos leuce |
| Cicer | Heliotropium maius |
| Lupinum satium | Vinum panacite |
| Allium | Vinum helleborite |
| Cyclaminos | Alumen |
| Dracunculus maior | Sulphur |
| Dracunculus minor | Lapis laspis |
| Hedera | Actites |
| Gentiana | Samius. |
| Centaurium maius | PARONYCHIA, |
| Centaurium minus | rum, id est, vnguium |
| Pulegium | morborum remedia. |
| Eleisphacos | Thus cum melle |
| Calamintha | Olea sylvestris |
| Baccharis | Myrtus |
| Panaces heracleon | Ebur |
| Staphylinus | Paronychia |
| Thynni falsi caro | Vua œnanthe |
| Seseli Massiliense | Aerugo ferri. |
| Smyrnion | PAROTIDVM, id est, |
| Peucedanum | aurium apostematū |
| Sagapenum | remedia. |
| Galbanum | Ficus |
| Clinopodium | Fimum |
| Ammoniacum | Linum Faba |
| Chamædrys | Lapathum |
| | Plan |

CURATIVVS.

Plantago
Erysimon
Viscum
Althæa
Psyllium
Strychnon fatium
Urtica
Galiopsis
Terra cimolia
Et in verbo, Aurium
medicinæ.

PAVESCENTIVM
remedia.

Linum
Melicratum
Hydromel.
PECORIS scabiem
emendantia.
Vide, Iumentorū sca-
biem.

PECORIVTILIA.
Adiantum.

PECVS necantia.
Merion
Aconitū lycoctonon.
PECVS mortuum
extrahentia.

Aristolochia.
PECTORIS morbi
remedia.

Acorus
Meu
Costum
Myrrha
Iuncus odoratus
Pityides

Terebinthina
Iuniperus
Ficus
Pomum
Nasturtium
Piper
Chelidonium minus
Rhaponticum
Stichas
Thymus
Ruta
Libanotis
Sagapenum
Ammoniacum
Scordion
Bechion
Urtica
Isopyrum
Vinum cedrite
Vinum aromatite
Vinum nectarite
Vinum daucite.

PEDICVLOS ne-
cantia.

Allium
Alumen
Mel
Cedria.

PEDVM qui à frigo
re alferūt remedia.

Cyclaminos.
PEDVM rimarum
remedia.

Scilla.
PERFRICTIO-
nis medicinæ.

INDEX

Iris Illyrica
 Cyperus
 Balsamum
 Oleum
 Ficus Aegyptia
 Vinum stichadite.
 PERCVSSIS à fe-
 ris vtilia.
 Balsamum
 Paliurus
 Mustela
 Ouum
 Argemone
 Hippomarathrum
 Coagulum
 Sanguis
 Piper
 Elaphoboscon
 Phyllitis.
 PERNIONVM re-
 media.
 Vnguentum melinum
 & tellinum
 Thus cum suillo adipe
 Acacia
 Ficus
 Cancrī
 Pulmo marinus
 Vngues alini
 Adeps Lens
 Eruum
 Rapa sativa
 Beta
 Cyclaminos
 Dracunculus maior
 Dracunculus minor

Asphodelus
 Scilla
 Batrachion
 Arction
 Cotyledon prima
 Aqua maris
 Alumen.
 PERIPNEUMO-
 niacorum remedia.
 Abrotonum
 Tragoriganum.
 FESTILENTIAE
 contraria.
 Myrrhis. id est celiso-
 lium
 Vinum omphacite.
 PHALANGIO
 rū icūs remedia.
 Cinnamomum
 Terebinthus
 Myrica
 Myrtus
 Lixiua ex ficu
 Cancrī
 Malua
 Asparagus
 Lactuca sylvestris
 Hedera
 Abrotonum
 Daucus
 Spondylium
 Aparine
 Phalangium
 Myrrhis
 Aqua maris
 Diosc. lib. 8. cap. 58.

P H A

CURATIVVS.

PHAGEDAENAE
morbi remedia.

Fel Fimum
Dracunculus minor

Ifatis
Chamaeleon niger

Panaces
Staphylinus

Petalites

Characias

Ampelos leuce

Vinum

Acetum

Alumen

Sal Flos salis.

PHARICO vene
no contraria.

Vinum albanum

Diosc. lib. 6. cap. 19.

PHLEGMATIS
contraria.

Plantago.

PHRENETICO-
rum remedia.

Crocinum

Vitex

Asparagus

Serpyllum

Conyza tertia

Leucoion.

PTHIRIASIS, si
ue pedicularis mor-
bi remedia.

Strigmenta gymnasto-
rum

Myrica

Hedera
Staphis agria

Sandaracha.

PTHISICORVM
remedia.

Pix

Adeps

Porrum

Agaricum

Rhaponticum

Acantha

Prasium

Cestrum

Lapis Asius.

PILI genarum ne
defluant.

Spicanardi

Cochleæ terrestres

Ocypus

Chondrylla

Armenius lapis

PILI palpebrarum
euulsi ne rena-
scentur.

Tellinæ

Sanguis

Capnos.

PILI alarum euulsi
ne renascentur.

Fabæ.

PITUITAE crassæ
remedia.

Iris Illyrica

Sesamum

Hyssopus

Thymoxaline.

SS 4

INDEX.

| | |
|---------------------|------------------------|
| PITUITAE reme- | Hyoscyamus |
| dia. | Helleborum nigrum |
| Cinnamomum | Sesamoides maius |
| Styrax | Cucumis |
| Naphtha | Elaterium |
| Vimus | Staphis agria |
| Auellana | Thapsia |
| Ouum | Hippophaë |
| Serum | Hippophaëton |
| Vrina | Cici |
| Hordeum | Characias |
| Linum | Lathyris |
| Faba | Scammonia |
| Lupinum satium | Thimelæa |
| Agrioraphanus | Ebulus |
| Portulaca | Apios |
| Cucurbita | Colocynthis |
| Cepa | Epithymon |
| Sinapi | Empetron |
| Piper | Ampelos leuce |
| Cyclaminos | Polypodium |
| Dracunculus maior | Heliotropium maius |
| Capparis | Vua passa |
| Anemone | Aqua maris |
| Anagallis | Vinum rhotinite |
| Centaurium minus | Vinum aromatite |
| Tragacantha | Vinum mandragorite |
| Hyssopus | Vinum scammonite |
| Origanus | Sulphur |
| Tragoriganum | Peplus. |
| Pulegium | PITYOCAMPA- |
| Thymus | rum curatio. |
| Ruta | Diosc. lib. 6. cap. 2. |
| Pyrethrum | PLAGARVM vibi |
| Spondylium | ces emendantia. |
| Melanthium | Susnon. |
| Parthenion | |
| Clematis | |
| Sideritis achilleos | |

PLAN

CURATIVVS.

PLANTAE quę pe-
rimunt
Diosc. lib. 6. in præfat.
PLEVRETICO-
rum remedia.
Staphylinus
Laserpitium
Aethiopsis
PODAGRÆ mor-
bi remedia.
Amomum Naphtha
Populus nigra
Amurca
Salix Ficus
Cochleæ terrestres
Mustela
Marinus pulmo
Lac humanum
Adipum medicinæ
Sanguis scilicet men-
struus
Fimum
Hordeum
Lens
Rapa sativa
Brassica sativa
Seris
Cucurbita
Aros
Aphodelus
Bulbus esculentus
Pulegium
Panaces heracleon
Libanotis
Scordion
Leucoion

Androsaces
Helxine
Papaver sativum
Hyoscyamus
Lens palustris
Aizoon maius
Bryon thalassium
Phycos marinus
Cucumis anguinus
Balanus myrepica
Ebulus
Heliotropium maius
Vua passa
Acetum Ferrum
Sulphur Sal
Lapis Alius
Lapis gagates
Testæ siue terræ fornæ-
cum.

POLYPI morbi re-
media.

Dracunculus maior
Dracunculus minor.

PRESTERIS ser-
pentis morsus re-
media.

Omotarichos
Rubus.

PRAEPVTIO-
rum morbi re-
media.

Aloë.

PRAECORDIO-
rum remedia.

Scordion
Vinum thymite

Ss s

INDEX

Vinum daucite.

PRAECIPITATIS
ex alto vtilia.

Iris Illyrica

Vitex

Asparagus

Anisum

Cannabis sativa.

PROFLUVII
geniturae remedia.

Vide, Geniturae proflu-
uij in somno.

PRURIGINEM
facientia.

Scolopendra

Ephemeron

Opium.

PRURIGINEM
emendantia.

Vrina Eruum

Lapathum

Aloë

Origanum

Pulegium

Elelisphacos

Melilotus

Balanus myrepica

Acetum

Alumen

Sulphur Sal.

PSILOTHRVM,
sive vnguentum de
pilatorio.

Lepas marinus

Hedera

Ampelos leuce

Dryopteris

Arsenicum.

PSORAE morbi
remedia.

Cardamomum

Oleum amygdalinum

Lycium Olea

Palma elate

Ficus

Erinaceus marinus

Cicer

Lupinum sativum

Batrachion

Chelidonium minus

Origanum

Pentaphyllon

Staphis agria

Balanus myrepica

Ampelos leuce

Vitis sativa

Aqua maris Sal.

PSYLLII curatio.

Diosc. lib. 6. cap. 10.

PTERYGII morbi
remedia.

Acacia

Rhus

Malum punicum

Myrtus

Ficus

Glycyrrhiza

Aloë

Prasium

Pentaphyllon

Characias

Ampelos leuce

Vua

C V R A T I V V S.

Vua œnanthe
 Acetum
 Alumen
 Sal
 Ferri rubigo.
 P V B E R T A S ne
 erumpat.
 Hyacinthus.
 P V L M O N I S mor-
 bi remedia.
 Iuncus odoratus
 Balsamum
 Cedria
 Amygdalus amara
 Ficus
 Lac
 Pulegium
 Ruta
 Sagapenon
 Symphyton
 Pentaphyllon
 Chrysocome
 Vrtica
 Thapsia
 Melicra:um
 Vinum hyssopite
 Vinum aromatite.
 P V L I C E S necantia.
 Vnguentum telinum
 Crocinum
 Butyrum.
 P V T R E D I N V M ge-
 nitalium remedia.
 Aspalathus.
 P V T R E D I N E S
 purgantia.

Irinum
 Cinnamomum
 Pix
 Sal.
Q V A D R V T B.
 dum scabiem
 emēdantia.
 Vide, lumentorum sca-
 biem.
Q V A R T A N A E fe-
 bris remedia.
 Vide, Febris quartanæ
 remedia.
R A D I C E S quę pe-
 rimunt.
 Diosc. lib. 6. in præfat.
 R A V C E D I N I S re-
 media.
 Tragacantha.
 R E D V V I A S sa-
 nantia.
 Ferri rubigo.
 R E F R I G E R A N-
 tes medicinæ.
 Vnguentum melinum
 Cupressus
 Rhodides
 Rosa
 Acacia
 Ouum
 Sonchos
 Seris
 Lactuca
 Caros
 Coriandrum
 Hieracium maius

Poly

INDEX

| | |
|-------------------|--------------------|
| Polygonum duplex | Aloë |
| Clymenon | Abſinthium |
| Periclymenon | Origanum |
| Helxine | Hippomarathrum |
| Papauer fatium | Libanotis |
| Pſyllium | Spondylium |
| Cicuta | Laſerpirium |
| Lens paluſtris | Præſium |
| Aizoon duplex | Scordion |
| Erigeron | Aſplenon |
| Phacos thalaſſion | Anthemis |
| Potamogeton | Pæonia |
| Cyſiſus | Erythrodanum |
| Ebulus | Chamæpitys |
| Acetum | Pentaphyllon |
| Omphacomeli | Hyacinthus |
| Pompholyx | Halicacabus |
| Plumbum elotum | Chamæciſſos |
| Spuma argenti | Oſyris |
| Ceruſſa | Myrtus ſylueſtris |
| Corallium | Elaterium |
| Terra | Vinum chamædryte |
| Lapis ſamius | Vinum calaminthite |
| Terra ampelitis. | Vinum nardite |
| RE G I I morbi | Sulphur. |
| remedia. | RE N V M doloris |
| Nardi ſpica | remedia. |
| Schiſtos | Amygdala amara |
| Ceruinum cornu | Asparagus |
| Fimum Cicer | Anagallis |
| Lapathum | Agaricus |
| Atriplex | Anthyllis |
| Asparagus | Anchuſa |
| Eryſimon | Halcyonium |
| Scilla | Cardamomum |
| Chelidonium | Calamus odoratus |
| | Cic |

C V R A T I V V S.

Cicer Casia
Cinnamomum
Chamæpitys
Passum
Glycyrrhiza
Iuncus odoratus
Laurinum Lac
Lotus sativa
Meu
Pistacia
Nardus gallica
Nuclei pini
Oleum amygdalarum
Palma elate
Portulaca
Plantago
Porrum
Petroselinum
Peucedanum
Præonia
Rhaponticum
Saccharum
Scandyx
Smyrnion
Symphyton
Stratiotes aquaticus
Tragacantha
Cordylon
Vrina
Veronica
Vua passa
Vinum
Vinum cydonite
Vinum holosanthinū
Erinaceus terrestris
Fœniculus

Vinum absinthite
Vinum nardite
Vinum aromatite
Oleum balaninum.

R H A G A D V M
remedia.

Pix Lycium

Vitex

Cancrī.

R H E V M A T I S.
mis vtilia.

Acetum

Cupressus

Daphnides

Ficus Fæx vini

Macer

Oleum oleastrī

Ouum Persica

Portulaca

Plantago

Staphis agria

Triticum

Vini qualitas

Vinum labruscæ

Vinum ex piris

Vinum myrrite.

R I C I N O S necantia.

Cedria.

R I G O R E S seu hor-
rores februm ex-
cutientia.

Gleucinum

Piper

Panaces heracleon

Staphylinus

Vinum cedrite

Pyr

INDEX

Pyrethrum.

RIMARVM sedis
remedia.

Vide, Sedis rimarum.

ROSIONIS re-
media.

Lac schiston

Pæonia.

R V C T V M mouctia.

Massiche

Raphanus

Anethum

Smyrnion

Vinum daucite.

R V P T O R V M re-
media.

Acorus

Cardamomum

Afarum

Calamus odoratus

Helenium Bdelium

Iuniperus Cedrides

Halimos

Lixiua ex ficu

Fel Fimum

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus

Bulbus esculentus

Capparis

Rhaponticum

Gentiana

Aristolochia

Centaurium

Acantha

Leucacantha

Abrotonum

Origanum

Calamintha

Serpyllum

Baccharis

Panaces heracleon

Libanotis

Laserpitium

Sagapenum

Galbanum

Polycnemon

Clinopodion

Althæa Cestron

Symphyton

Holosteum Xyris

Hippuris

Heliochryson

Phlomidis

Ampelos leuce

Vinum daucite

Vinum tragoriganite

Vinum panacite

Lapis schistos.

SAGITTAS infixas

S extrahentia.

Vide, Spicula infixa.

SALIVAM euo-

cantia.

Pyrethrum.

SALAMANDRAM

veneni remedia.

Diosc. lib. 6. cap. 4.

SANGVINEM ex-

creantibus vtilia.

Iuncus odoratus

Aspalathus

Thus

CURATIVVS.

Thus in potu datum

Lentiscus

Massiche potu data

Naphtha

Cupressus

Macer Myrica

Hypocistis Rosa

Lycium Salix

Quercus

Palma

Malum punicum

Myrtus

Cichorium

Amygdalus amara

Ouum

Ceruinum cornu

Fimum

Coagulum

Triticum

Amylum

Portulaca

Plantago

Porrum

Erysimon

Agaricum Aloë

Rhaponticum

Centaurium

Acantha leuce & Arabica

Ferula

Althæa

Cestron

Lysimachia

Symphytum

Polygonon mas

Symphytum alterum

Clymenon

Aethiopis

Isopyrum

Adiantum

Vitis sativa Vua

Omphacium

Vinum phœnicite

Corallium

Lapis hæmatites

Terra samia.

SANGVINEM si-

stentia.

Thus

Cupressus

Galla Persea

Cochleæ terrestres

Ranæ

Araneus Ouum

Coagulum

Sanguis

Fimum Faba

Plantago

Porrum Isatis

Elelisphacos

Mentha

Serpyllum

Ruta

Cyminum satium

Stœbe

Ferula

Clymenon

Hippuris

Sideritis achilleos

Pentaphyllon

Phoenix herba

Astragalus

Lich

INDEX

- Lichen in petris
 Idæa radix
 Gallion
 Stratiotes terrestris
 Vua oenanthe
 Acetum
 Vinum terebinthinum
 Plumbum elotum.
 Stimmi
 Cinnabaris
 Alumen Sulphur
 Spongiæ
 Gypsum.
 SANGVINEM con-
 cretum discutientia.
 Lixiua ex ficu
 Thymus
 Heliochryson.
 SANGVINEM per
 vrinam expellentia.
 Eruum
 Cantharides
 Ammoniacum.
 SANGVINEM per
 nares expellentia.
 Crocodilum.
 SANGVINEM per
 vrinam reddentium
 remedia.
 Cyminum syluestre.
 SANGVIS VAS
 necantia.
 Oxalme
 Diosc. lib. 6. cap. 32.
 SANDARACHAE
 curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 29.
 SARDONIAE
 curatio.
 Diosc. lib. 6. cap. 14.
 SCABIE M iumento-
 rum emendantia.
 Vide, lumentorum sca-
 biem.
 SCABIE I morbi
 remedia.
 Argemone prima
 Chamæleon niger
 Helleborus niger
 Oesypum Sal
 Oleum oleastri
 Sinapi
 Sulphur
 Vnguentum melinum.
 SCOLOPENDRAE
 morsus remedia.
 Grossi
 Scolopendra
 Asphodelus Sal
 Diosc. lib. 6. cap. 59.
 SCORPIONIS sicut
 remedia.
 Cyperus
 Amomum
 Cardamomum
 Cinnamomum
 Daphnides
 Myrtus
 Ficus Cancrī
 Scorpius terrestris
 Smarides
 Mullus piscis

Loc

CURATIVVS.

Locustæ
 Lacerta
 Mures domestici
 Fimum
 Lapathum
 Sonchos Seris
 Lactuca sylvestris
 Ocimum
 Abrotonum
 Sampsuchum
 Hieracium maius
 Delphinion
 Lasernitium
 Atractilis
 Lychnis vtraq;
 Millefolium
 Phalangium
 Polemonia
 Chamæsyce
 Heliotropium
 Scorpoides
 Aqua maris
 Vinū tethalassomenū
 Vinum cydonite
 Sulphur Sal
 Lapis sapphirus
 Diosc. lib. 6. cap. 66.
 SCORPIONES ne-
 cantia.
 Cancrī.
 SCORPIONIS ma-
 rini ictus remedia.
 Vrina
 Asphodelus
 Plumbum syncerū &
 crematum

Sulphur.
 Diosc. lib. 8. cap. 61.
 SCORPIONES tor-
 pefacientia.
 Delphinion
 Lychnis sylvestris
 Lens palustris.
 SECVNDINAS
 irahentia.
 Balsamum
 Sampsuchinum
 Abrotonum
 Picea Schistos
 Fiber
 Iecur mergi
 Linum
 Aristolochia tertia
 Thymus
 Pulegium
 Prasilium Stachys
 Artemisia
 Oenanthe
 Hemerocallis
 Erythrodanum
 Anagyris Myrtus
 Adiantum
 Ampelos leuce
 Vinum diſamnite.
 SEDIS rimarum
 remedia.
 Strigmenta balnearū
 Mei Aloë
 Dipsacos
 Leucoion.
 SEDIS inflammatio-
 nis remedia.

T t

INDEX

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Oleum cicinum | Diosc. lib. 6. in præfat. |
| Amaracinum | SENSIBVS nocētia. |
| Lens Libanotis | Vinum annosum. |
| Symphyton | SENSVS recreantia. |
| Erigeron | Lapis samius. |
| SEDIS morbi re- | SEDIS bestiolar mor- |
| media. | sus remedia. |
| Thus | Portulaca |
| Lentiscus | Oxymel. |
| Pix Rosa | SERPENTIVM ve- |
| Amurca | nenis contraria. |
| Malum punicum | Paliurus |
| Myrtus | Vitex Cancrī |
| Cancrī | Hippopotamus |
| Ouum | Fiber Muscī |
| Ocsypum | Gallinaceus |
| Adeps Fel | Cantharides |
| Lens | Chondrylla |
| Malua | Nasturtium |
| Althæa | Dracunculus |
| Portulaca | Asphodelus |
| Sonchos | Rhaponticum |
| Anagallis | Aristolochia tertia |
| Melilotus | Origanum sylvestre |
| Laserpitium | Baccharis Ruta |
| Aster Atticus | Phlomos, siue verba- |
| Viola purpurea | scum |
| Cucumis anguinus | Panaces chironium |
| Colocynthis | Staphylinus |
| Acetum | Smyrnion |
| Oxalme | Aparine |
| Vinum terebinthinum | Camædrys |
| Flos æris | Lychnis fatiua, siue |
| Plumbum elotum. | coronaria |
| SEMINA quæ | Erythrodanum, siue |
| perimunt. | Rubia |
| | Spar |

CYRATIVVS.

Sparganion
Polygonon mas
Clematis daphnoides
Polemonia Anchusa
Ocamoides
Hyacinthus
Maadragoras
Nerion
Adiantum.

SERPENTES fu-
gandia.

Iuniperus
Cornu ceruinum
Adeps Nasturtium
Dracunculus maior
Abrotonum
Origanum
Calamintha
Peucedanum
Melanthon
Galbanum
Polium
Oenanthe
Lyfimachia
Aster atticus
Vinum conyzite
Lapis gagates.

SERPENTIVM
morsus remedia.

Iris Illyrica
Asarum
Cinnamomum
Balsamum
Pix Naphtha
Iuniperus
Platanus

Erice Glandes
Pistacia
Ficus ægyptia
Pastinaca piscis
Ranz
Gobius Fel
Omorarichos
Fimur
Marinus pulmo
Mel Eruum
Dictamnus
Raphanus
Agaricum
Brassica sativa
Cyclaminos
Ampeloprasen
Dracunculus minor
Asphodelus
Anagallis
Acantha leuce
Abrotonum
Asclepias
Origanum
Lilium
Calamintha
Clinopodium
Serpyllum
Leontopetalon
Panaces heracleon &
asclepion
Cuminum sativum &
sylvestre
Ammi Foeniculum
Daucus
Libanotis
Sagapenon

INDEX

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Prasson | Aes vsum |
| Phyllitis | Harena litoris |
| Trifolium | Libanotis Mentha |
| Scordion | Pompholyx |
| Cestron | Spodium |
| Periclymenos | Rubus |
| Echion | Terra Chia |
| Ocimoides, siue ocima | Rubrica sinopis |
| strum | Fæx vini |
| Rubus | Diphryges. |
| Eupatorium | SINGVLIVM pel- |
| Heliochryson | lentia. |
| Adiantum | Fiber |
| Peristercon supinus | Sisymbrium |
| Ebulus | Rhaponiticum |
| Ampelos leuce | Mentha |
| Vitis sativa | Aristolochia tertia |
| Vinum Acetum | Anethum |
| Oxymeli | Cyminum sylvestre |
| Vinum conyzite | Alysson Asplenon |
| Vinum panacite | Clymenon |
| Sal Cinis vitis | Saxifragum. |
| Lapis ophites. | SIRIASIS remedia. |
| SERPENTES ne | Cucurbita Pepo |
| feriant. | Heliotropium maius. |
| Cervi medulla. | SITIM generantia. |
| SERPENTES ne | Cepe Allium |
| cantia. | Capparis |
| Anchusa onocheles | Vini qualitas. |
| Vinum cedrite. | SITIM extinguentia. |
| SICCANTES me- | Glycyrrhiza |
| dicinæ. | Symphytum. |
| Ammi Bromos | SMILACI contraria. |
| Cistos | Vide, Taxo contraria. |
| Cyminum sativum | SOMNIFERAE |
| Ebulus | medicinæ. |
| | Amyg |

C V R A T I V V S.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Amygdalæ amaræ | Sabina. |
| Halicacabus, siue solanum vesicarum | SPASTICORVM remedia. |
| Anisum | Fiber. |
| Amomum | SPASMI remedia. |
| Cistos tertia, siue ladanum | Vide, Convulsionis remedia. |
| Baccharis | SPIRITVM, id est, flatum generantia. |
| Dorycnion | Gentiana. |
| Hyoscyamus | SPIRANTIBVS |
| Lactuca | difficulter utilia. |
| Iris Illyrica | Vide, Orthopnoicis. |
| Opium | SPIRITVS discurretes coërcentia. |
| Mandragoras | Bdellium. |
| Papauer rhœas, siue faticium | SPIRANTIBVS vitam auferentia. |
| Portum Styra | Cedria. |
| Smilax hortensis | SPICVLA infixa corpori extrahentia. |
| Strychnon hypnoticō, siue solanum somnificum | Anagallis |
| Vitex | Harundo |
| Vinum nouum | Aristolochia |
| Lapis memphites. | Dictamnus |
| SOMNVM discutientia. | Propolis |
| Spondylium | Narcissus |
| Peucedanum. | Oxyacantha |
| SOMNIA imaginosa & mala inducentia. | Silurus |
| Faba Lens | Triticum |
| Pycnocomum | Tragion |
| Smilax leuis. | Xyphion |
| SORDES purgantia. | Xyris Lacerta. |
| Irinum | SPISSANDI vim habentia. |
| Cortex thuris | Acacia Malus |

INDEX

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cotonca | Pencedanum. |
| Malum syluestre | STAPHYLOMA. |
| Amygdalus amara | tis remedia. |
| Baccharis | Palma thebaica |
| Britannica | Lapis schistos |
| Polygonon mas & fœmina. | Lapis sapphiros. |
| Clymenon | STERNVTAMEN- |
| Medion | tum mouentia. |
| Helxine | Rubus Iris Illyrica |
| Idæa radix | Fiber Sinapi |
| Hippuris | Ptarmice |
| Psyllium | Struthion |
| Bryon thalassium | Batrachion |
| Potamogeton | Daphnoides |
| Acetum | Helleborus albus. |
| Vinum hadrianum | STERILES fœmi- |
| Aerugo aurificum | nas facientia. |
| Vinū nigrum labruscæ | Vide, Generationem |
| Vinum tyburtinum | deprimentia. |
| Cadmia | STIGMATVM |
| Pompholyx | remedia. |
| Squama æris | Batrachion |
| Pumex | Mandragora. |
| Corallium | STOMACHO |
| Rubrica sinopis | contraria. |
| Lapis hæmatites. | Terebinthina |
| SPLENETICIS | Cedrides |
| vtilia. | Melimela Pruna |
| Vide, Lienis morbi re- | Arbutus |
| media. | Iuglans |
| SPVMAE argenti | Auellana Ficus |
| contraria. | Hordeum |
| Vinum in commune. | Lens Malua |
| SQYAMAS ossium | Porrum |
| extrahentia. | Brassica satiuæ & ma- |
| Aristolochia tertia | rina |
| | Ce |

CURATIVVS.

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Cepe | Cotonea |
| Nasturtium | Mala epirotica |
| Capparis | Armeniaca |
| Abſinthium | Mefpilus |
| Abſinthium ſcriphium | Lotus Pruna |
| Balanus myreſtica | Amygdalæ dulces |
| Vua Thymelæa | Piſtacia Iuglans |
| Ebulus | Morus Perſea |
| Præſium | Ficus Aegyptia |
| Galbanum | Ionis |
| Aqua maris | Cochleæ terreſtres |
| Vinū terthalaffomenū. | Ouum Lac |
| STOMACHI mor- | Lac humanum |
| bi remedia. | Cafeus |
| Meu Nardi ſpica | Lana ſuccida |
| Nardum gallicum | Oriza Lyncurion |
| Malabarhum | Saccharon |
| Iuncus odoratus | Faba Aegyptia |
| Agallochum | Sifer |
| Helenium | Lupinum fatium |
| Oleum balaninum | Lapathum |
| Maſtichinum | Lampſana |
| Vnguentum roſaceum | Bræſſica ſatiua |
| Suſinum | Portulaca |
| Nuclei pini | Sonchios Seris |
| Maſtiche | Cucumis |
| Cupreſſus | Laſtica |
| Iuniperus | Gingidium |
| Laurus | Scandyx Aphace |
| Populus nigra | Ampelopraſon |
| Rofa | Allium |
| Oliuæ colymbades | Zingiber Scilla |
| Palma | Bulbus eſculentus |
| Palma elate | Agaricum |
| Malum punicum | Rhaponticum |
| Siliquæ Myrtus | Gentiana |

INDEX

| | | |
|-------------------|------------|---------------------|
| Acantha leuce | | Omphacomeli |
| Aloë | Abſinthium | Vinum |
| Mentha | | Vinum ſurrentinum |
| Tragoriganum | | Vinum omphacite |
| Pulegium | | Vinum nigrum ex la- |
| Melilotus | | bruſcæ floribus |
| Ligusticum | | Vinum melitite |
| Caros | | Vinum ſcilliticum |
| Anethum | | Vinum cydonite |
| Cyminum ſylueſtre | | Vinum apiſte |
| Hieracium maius | | Vinum anethinum |
| Apium | | Vinum rhoite |
| Petroſelinum | | Vinum myrtite |
| Smyrnion | | Vinum terebinthinum |
| Fœniculus | | Vinum phœnicite |
| Scordion | | Vinum abſinthite |
| Artemiſia | | Vinum bunite |
| Nymphæa | | Vinum dictamnite |
| Prœnia | Ceſtron | Vinum calaminthite |
| Polygonon mas | | Vinum aromatite |
| Rubus | | Vinum nectarite |
| Strychnon fatium | | Vinum nardite |
| Cotyledon prima | | Vinum ex ſylueſtri |
| Erigeron | Adiantum | nardo |
| Aſter atticus | | Vinum ſelenite |
| Viola purpurea | | Ferrum |
| Chamaſaphne | | Flos ſalis |
| Colocyathis | | Fæx vini |
| Vitis ſamia | | Lapis alabaſtrites |
| Nuclei acinorum | | Lapis ſamius. |
| Vua œnanthe | | STRVM AE gut- |
| Omphacium | | turis remedia. |
| Vini qualitas | | Iris lilyrica |
| Phalernum | | Groſſi |
| Hydromel | | Mustela |
| Thymoſalme | | Vnguis aſini |
| | | Fimum |
| | | Hor |

C V R A T I V V S.

| | | |
|------------------------|-------|---------------------------|
| Hordeum | | Seseli Maffiliense |
| Lolium | | Hippofelinon |
| Faba | Lens | Hippomarathon |
| Lupinum fatium | | Polycnemon |
| Lapathum | | Clinopodium |
| Andrachne, sine portu- | | Oenanthe |
| laca fyluestris | | Conyza |
| Plantago | Piper | Asplenon |
| Capparis | | Onobrychis |
| Argemone | | Polygonon mas |
| Coriandrum | | Saxifragon |
| Libanotis | | Xyris |
| Laserpitium | | Laurus Alexandrina |
| Aparine | | Tragion |
| Millefolium | | Pseudobunion |
| Scordion | | Adiantum. |
| Lithospermon | | STIPTICAE |
| Cotyledon prima | | medicinæ. |
| Galtopsis | | Vide, Adstrictoria me- |
| Pseudobunion | | dicinæ. |
| Adiantum | | SVCCI qui perimūt. |
| Testæ, sine terræ for- | | Diosc. lib. 6. in præfat. |
| nacum. | | SVDOREM de- |
| STRANGVLA | | primentia. |
| tus remedia. | | Oleum |
| Irinum | | Oleum omphacinum |
| Absinthium. | | Oleum oleastri |
| STRANGVRIAE | | Myrium |
| morbi remedia. | | Lentiscinum |
| Aspalathus | | Vnguentum melinum |
| Cedrides | | Rhodides |
| Locustæ | | Myrtus |
| Asparagus | | Bulbus esculentus |
| Sisymbrium | | Vinum myrsinite |
| Medica | | Sulphur |
| Panaces heracleon | | Gypsum |

T t 5

INDEX

Terra samia.
 S V D O R E S euocatia.
 Metopiū vnguentum
 Smyrnion
 Pyrethrum
 Onobrychis
 Flos salis
 Anchusa
 Lycopsis.
 S V E S necantia.
 Chamæleon albus
 S V F F V S I O N V M
 morbi remedia.
 Fel Sanguis
 Sagapenum
 Euphorbium
 Chamaſyce
 Harena litoris.
 S V G I L L A T O R V M
 remedia.
 Acetum Sal.
 S V P E R C I L I O
 rum raritati vtilia.
 Picea.
 S V P E R C I L I I S
 glabris vtilia.
 Fuligo resinæ.
 S V P P V R A T I O
 nis tuberculorum
 remedia.
 Crocomagma
 Palimpissa.
 S V P P V R A T I O
 num remedia.
 Ficus Aegyptia
 Mel Hordeum
 Lolium
 Cucurbita
 Ligusticum
 Smyrnion Althæa
 Mandragoras
 Vrtica Narcissus
 Ampelos leuce
 Diphryges.
 S V S P I R I O S O
 rum remedia.
 Canchamum
 Cyphi
 Oleum amygdalarum
 Pix Ficus
 Vulpinus pulmo
 Eruum
 Plantago
 Agaricum
 Rhaponticum
 Aristolochia tertia
 Hyssopum
 Thymus
 Acinos Ruta
 Galbanum
 Ammoniacum
 Prasium
 Parthenium
 Anagyris
 Adiantum Thapsia
 Ampelos leuce
 Vinum pafsite
 Vinum hyssopite.
 T A B I D I corporis
 remedia.
 Vide, Phthificorum
 remedia.

TA

CURATIVVS.

| | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| TABESCENTI- | Erigeron | |
| bus vtilia. | Vua passa | Sal |
| Daphnides | Geodes lapis | |
| Vinum strobilite. | Terra samia | |
| TAXO contraria. | Cimolia. | |
| Vinum in commune | THAPSIAE | |
| Acetum | contraria. | |
| Diosc. lib. 6. cap. 12. | Diosc. lib. 6. in præfat. | |
| TELA infixa corpo- | & cap. 33. | |
| ribus extrahentia. | THERIACAM | |
| Vide, Spicula infixa. | ingredientia. | |
| TENASMI mor- | Rapa sativa | |
| bi remedia. | Zingiber | |
| Lac schiston | Dictamnus | Apium. |
| Fœnogræcum | THERIOMATVM | |
| Linum | remedia. | |
| ERUUM. | Lupinum sativum | |
| TEREDINEM | Elelisphacos. | |
| sentientia. | THORACIS remedia. | |
| Ficus Aegyptia | Cerebrum gallinacei | |
| Hyoscyamus. | Glycyrrhiza. | |
| TEREDINEM | THYMOS ab- | |
| non sentientia. | sumentia. | |
| Tilia | Smaris | Fimum |
| Hermol. Cor. cap. 133. | Thymus | Ruta |
| TEREDINEM | Heliotropium maius | |
| necantia. | Vitis sativa | Sal. |
| Sal. | TIBIARVM vice- | |
| TESTIVM mor- | rum remedia. | |
| bi remedia. | Hydropiper | |
| Vitex | Myrtus | |
| Cicer | Faba | |
| Erysimon | Ampelos leuce | |
| Asphodelus | TINEAS latas | |
| Melilotos | pellentia. | |
| Cuminum | Ruta | Cardamomum |
| Hyoscyamus | Lilium | Costum |
| | | Malicoriū |
| | Melimeia | |

INDEX

| | | |
|----------------------|--------|---------------------|
| Iuglans | Morus | Hirundines |
| Heliotropium minus | | Lac schiston |
| Vinum absinthite | | Mel Sinapi |
| Lupinum sativum | | Aloë |
| Brassica sativa | | Origanum |
| Portulaca | | Britannica |
| Chamaeleon albus | | Periclymenos |
| Hyssopum | | Helxine |
| Calamintha | | Peristereon supinus |
| Thymus | Ruta | Omphacium |
| Coriandrum | | Vinum myrsinite |
| Melilotum | | Flos æris |
| Bryon thalassion | | Alumen Sal. |
| Pteris | | TORMINIS remedia. |
| Thelypteris | | Iris Illyrica |
| Vinum cedrite | | Acorus Meu |
| Calcanthum | | Cardamomum |
| Anchusa tertia. | | Balsamum |
| TINEAS rotun- | | Agallochum |
| das generantia. | | Oleum |
| Triticum. | | Iuniperus |
| TINEAS necantia. | | Halimos |
| Absinthium seriphion | | Iuglans |
| Mentha | | Ficus Fiber |
| Heliotropium minus | | Talus suis |
| Cedria | | Triticum |
| Aizoon maius. | | Milium |
| TINBIS contraria. | | Panicum |
| Citria. | | Eruum |
| TONSILLARVM | | Atriplex |
| morbi remedia. | | Sisymbrium |
| Pix | Cedria | Piper Scilla |
| Lycium | | Agaricum |
| Pruna | | Rhaponticum |
| Morus | | Centaurium maius |
| Ficus | | Eryngion |
| | | Ca |

C V R A T I V V S.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Calamintha | Sanguis. |
| Serpyllum | TREMOREM |
| Sampfuchus | excitientia. |
| Panaces heracleon | Vnguentum cinnamo- |
| Acetum | minum. |
| Cyminum sativum | TREMORIS remedia. |
| Seseli Massiliense | Lepus terrestris. |
| Cyminum sylvestre | TUBERCULO- |
| Elaphoboscon | rum suppuratio- |
| Petroselinum | nis remedia. |
| Daucus Libanotis | Strigmēta gymnastorū |
| Ferula | Morus Cepe |
| Peucedanum | Asphodelus |
| Asclepias | Panaces Asclepion |
| Melissophyllon | Laserpitium |
| Phalangion | Viscum Thapsia |
| Conyza Alisma | Mandragoras |
| Chamæpitys | Ephemeron |
| Gramen | Cucumis anguinus |
| Pseudobunion | Vrtica |
| Chamædaphne | Aerugo auriscum |
| Vinum scillite | Lapis Aſius |
| Vinum celrite | Terra cinolia. |
| Vinum hyssopite | TUBERA exte- |
| Vinum tragoriganite | nuantia. |
| Vinum panacite | Triticum |
| Aphronitrum | Leontopodium |
| Et in verbo, Dysenteri- | Scammonia |
| corum remedia. | Vinum nigrum è la- |
| TORPORIS remedia. | brusca. |
| Fagus. | TVMORVM |
| TORSIONIS | remedia. |
| remedia. | Anagyris |
| Tragoriganum. | Platanus |
| TOXICO contraria. | Fagus |
| Glandes | Illex Adeps |
| | Hor |

INDEX

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| Hordeum | Faba | T V S S I S remedia |
| Brassica sativa & syl- | | Amygdala amara |
| vestris | | Asphodelus |
| Cucurbita | | Apium sativum |
| Nasturnum | | Bdellium |
| Hydropiper | | Bromos |
| Bulbus esculentus | | Cinnamomum |
| Isatis | | Calamus odoratus |
| Chamaeleon | | Cupressus |
| Tragoriganum | | Cedrides |
| Sampfuchum | | Cistos |
| Ligusticum | | Cacalia |
| Daucus | Libanotis | Chamaedrys |
| Melanthion | | Tragacantha |
| Orchis serapias | | Dracunculus |
| Ornithum | | Faba |
| Buphthalmus | | Helenium |
| Cannabis sylvestris | | Hipparis |
| Polygonum mas | | Hyoscyamus |
| Lagopus | Xyris | Iris illyrica |
| Helxine | | Lycium |
| Pentaphyllon | | Laserpitium |
| Peristereon supinus | | Mel |
| Hyoscyamus | | Melicratum |
| Psyllium | | Origanum |
| Xanthium | | Paliurus |
| Sesamoides | | Piper |
| Ephemerum | | Peucedanum |
| Phlomis | | Prasium |
| Cucumis anguinus | | Papaver sativum |
| Thapsia | | Ruta |
| Chamaesyce | | Styrax |
| Pycnocomum | | Struthion |
| Aqua maris | | Smyrnion |
| Indicus lapis | | Sulphur |
| Fax vini | Spongia | Triticum |
| | | Tragoriganum |
| | | Terebinthina |
| | | Vua passa. |
| | | T V S S I S veteris |
| | | remedia. |
| | | Asa |

CURATIVVS.

| | | |
|--------------------|----------|----------------------|
| Afarum | Myrrha | VENEDICIIS |
| Nuclei pini | | medetur |
| Mastiche | | Scilla. |
| Naphtha | | VENEREM cum vo- |
| Cerasia | | luptate expedientia. |
| Amygdala amara | | Laurus Alexandrina. |
| Auellana | | VENEREM co- |
| Allium | | hibentia. |
| Ficus | Propolis | Portulaca Lactuca |
| Raphanus | | Lactuca syluestris. |
| Scilla | Hyssopus | VENEREM si- |
| Centaurium maius | | mulantia. |
| Baccharis | | Costum Crocum |
| Seseli Massiliense | | Mastiche Linum |
| Daucus | | Rapa sativa |
| Sagapenon | | Sifer Eruca |
| Galbanum | | Porrum Cepe |
| Scordion | | Nasturnum |
| Bechion | | Dracunculus maior |
| Helxine | | Dracunculus minor |
| Phlomidis | | Bulbus esculentus |
| Acetum | | Mentha |
| Vinum hyssopite | | Staphylinus |
| Sandaracha. | | Anisum Orchis |
| VAROS purgantia. | | Orchis serapias |
| Oleū balaninum. | | Satyrion |
| Myrrha | | Satyrion alterum |
| Lacerta | Linum | Orminum Xiphium |
| Porrum | Cepe | Vrtica Galtoplis. |
| Bulbus esculentus | | VENENATA |
| Pulegium | | fugantia. |
| Balanus myrepica | | Vitex Dictamnus. |
| Cici | Sory. | VENAS excitantia. |
| Ampelos leuce. | | Vinum phalernum. |
| VARICES sanantia. | | VENTRIS anima- |
| Cirrhon. | | lia expellentia. |

V

INDEX

Vide, Tineas latas.
 VENTREM soluentia.
 Vide, Aluum soluētia.
 VENENATORVM
 istius remedia.
 Cardamomum
 Nardum gallicum
 Helenium
 Cinnamomum
 Bdellium Vitex
 Ficus Propolis
 Raphanus Triticum
 Eryngium
 Cuminum sylvestre
 Althæa Tribulus
 Prasium
 Smilax aspera
 Aqua maris
 Acetum.
 VENENORVM
 remedia.
 Cinnamomum
 Oleum Pix
 Paliurus Lycium
 Olea Aethiopica
 Iuglans
 Lixiua ex ficu
 Lepus terrestris
 Fiber Butyrum
 Sanguis Vrina
 Rapa sativa
 Malua Erysimum
 Agaricum
 Aristolochia secunda
 Abrotonum
 Ruta Apium
 Laserpitium
 Leucas
 Polium Cestron
 Pentaphyllum
 Colchicon
 Epipasis Passum
 Linum gypsatum
 Rubrica lemnia
 Terra samia.
 VERMIBVS
 contraria.
 Cedria.
 VERRUCAS
 tollentia.
 Batrachion
 Clinopodium
 Characias
 Chamæsyce Dipsacos
 Ficus Grossi
 Cicer Lacerta
 Heliotropium Fimura
 Staphis agria
 Scilla Thymus.
 VERTIGINIS mor
 bi remedia.
 Balsamum
 Lac humanum
 Peucedanum
 Galbanum
 Ampelos leuce
 Ampelos melæna
 Acetum scilliticum
 Vinum scilliticum.
 VERTIGINEM
 adgenerantia.
 Cardamonum
 Bal

CURATIVVS.

Balsamum
 Hyoscyamus
 Mandragoras
 Falernum
 Vinum rhenitum
 Mandragorite
 Aconitum Cicutā
 VESICAE morbi
 remedia.
 Meu
 Nardum gallicum
 Nuclei pini Cupressus
 Laurus Palma
 Palma elate
 Myrtus Lac
 Ficus Ouum
 Cochlear terrestres
 Cicada Napum
 Ceruinum cornu
 Saccharum
 Gramen Malua
 Hippuris
 Portulaca
 Lotus sylvestris
 Plantago Vicia passa
 Cucumis
 Scandix Passum
 Ochra Porrum
 Bulbus vomitius
 Rhaponticum
 Glycyrrhiza
 Tragacantha
 Panaces heracleon
 Petroselinum
 Smyrnion
 Peucedanum

Foeniculus Nymphaea
 Anthemis Præonia
 Phalaris Cepe
 Halcyonium Cestron
 Vinum terebinthinum
 Vinum scilliticum
 Vinum aromatite
 Vinum halosanthite
 Lapis morochthus.
 VESPARVM ictus
 remedia.
 Laurus Malua
 Sisybrium.
 VESTIBVS ne ani
 malia noceant.
 Absinthium
 Heliochrysos.
 VIBICES plagarū
 emendantia.
 Suisinum.
 VIPERAE morsus
 remedia.
 Cassia Costum
 Iuniperus
 Macer
 Fraxinus Vrina
 Caries lignorum
 Triticum Erum
 Ferula Anchusa
 Onocheles
 Ocimoides
 Diosc. lib. 6. cap. 63.
 Herm. Cor. cap. 72.
 VIRIVM infirmis
 tates roborantia.
 Nuclei pini.
 Vv

INDEX

VISCO contraria.

Vinum in communi

Acetum

Vinum absinthite

Diosc. lib. 6. cap. 21.

VISCERVM mor-
bi remedia.

Thus.

VITILIGINIS
remedia.

Daphnides Myrtus

Ficus Grosi

Cochleæ terrestres

Lepus terrestris

Sepiæ Faba

Beta

Lupinum satium

Chondrylla

Cepa Allium

Piper

Dracunculus maior

Dracunculus minor

Asphodelus, Capparis

Argemone, Gentiana

Telephion Ruta

Chamæleon niger

Libanotis Lilium

Nymphæa Cicuta

Erythrodanum

Helleborum nigrum

Cucumis anguinus

Balanus myrepica

Narcissus

Sulphur

Halcyonium

Terra melia.

VITRA fracta con-
glutinantia.

Herin. Cor. cap. 254.

VMBILICIRE-
media.

Lapis magnes.

VNGVI BV svtilia.

Pix Cupressus

Daphnides

Olea Oriza

Linum Lapathum

Bulbus esculentus

Batrachion

Chelidonium minus

Viscum Vua passa

Sandaracha Alumen

Sulphur Fax vini.

VOCÊ M claram
reddentia.

Myrrha

Syrax Silurus.

VOLVPTATES

animi augescencia.

Buglossum.

VOLVCRVM mor-
sus remedia.

Iecur aprinum.

VOMITIONES
mouentia.

Irinum Laurus

Cochleæ terrestres

Omotarichos

Blattæ Pepo

Asphodelus

Capparis

Bulbus vomitorius

Orig

C V R A T I V V S.

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| Origanum | Cestrum | & asperæ remedia. |
| Anagyris semen | | Papauer ceratitis |
| Papauer spumeum | | VRINAM cruentam |
| Mandragoras | | mouētia. |
| Daphnoides | | Clymenon |
| Helleborus albus | | VRINAM ar- |
| Elaterium | Sylibon | cessentia |
| Balanus myrepica | | Eruum Galbanum |
| Narcissus | Cici | VRINAM mo- |
| Melicratum | | uentia. |
| Aes vstum | | Acorus |
| Chrysocolla | | Cyperus |
| Rubrica lemnia. | | Cardamomum |
| ▼ O M I T T I O N E S c o | | Nardi spica |
| hibentia. | | Nardum gallicum |
| Atriplex | Acetum | Asarum |
| Apium | Faba | Phu |
| Mentha | | Malabathron |
| Eupaterium. | | Casia Cinnamomum |
| ▼ O M I C A E morbi | | Costum |
| remedia. | | Iuncus odoratus |
| Paliurus | Thlaspi | Calamus odoratus |
| Struthion | Eryngion | Balsamum |
| Bechion | Psyllion | Crocum |
| Mandragora | | Crocomagma |
| Acetum. | | Helenium |
| ▼ R E N D I vim ha- | | Oleum amygdalinum |
| bentia. | | Vnguentum melinum |
| Misy | Melanteria. | Susinum |
| ▼ R E D I N E M fa- | | Irinum |
| cientia. | | Amaracinum |
| Trifolium. | | Bdellium |
| ▼ R I N A E difficulta | | Picea |
| tem generantia. | | Nuclei pini |
| Diosc. lib. 6. in præfat. | | Lentiscus |
| ▼ R I N A E harenosæ | | Resina |
| | | Terebinthus |
| | | Cupressus |
| | | Iuniperus |
| | | Populus alba |
| | | Paliurus |
| | | Tilia |

INDEX

| | | |
|---------------------|---------------------|----------|
| Olea æthiopica | Scilla | Capparis |
| Glandes Myrtus | Agaricum | |
| Palma elate | Crocodilion | |
| Siliquæ Cotonea | Centaurium maius | |
| Mala epirotica | Chamæleon albus | |
| Cornus | Acantha leuce | |
| Amygdalæ dulces | Acantha Anonis | |
| Erinaceus marinus | Eryngion | |
| Cimices lecti | Abſinthium | |
| Oues Bupreſtis | Abrotonum | |
| Vermes terreni | Tragoriganum | |
| Mel Hordeum | Eleliſphacos Thymus | |
| Zythum | Serpyllum Baccharis | |
| Milium Panicum | Ruta Moly | |
| Cicer Bruum | Ligusticum | |
| Rapa fatiua | Staphylinus | |
| Raphanus | Tordylon | |
| Raphanus agria | Sifon Anifum | |
| Sifer Bunion | Caros Anethum | |
| Brassica fatiua | Cyminum ſylueſtre | |
| Asparagus | Opium Oreofelinum | |
| Sifymbrium aquaticū | Petroſelinum | |
| Crithmon | Daucus Libanotis | |
| Cucumis Pepo | Melanthion | |
| Lactuca | Ammoniacum | |
| Gingidium | Chamædryſ | |
| Caucalis Bruca | Trifolium Scordion | |
| Ocimum | Androſaces | |
| Smilax hortensis | Anthyllis | |
| Porrum | Anthemis | |
| Ampelopraſon | Lithoſperma | |
| Cepa Allium | Erythrodanum | |
| Piper | Lonchitis Althæa | |
| Struthion | Hypericon | |
| Dracunculus | Choris | |
| Asphodelus | Chamæpitys | |

Ceſt

CVRATIVVS.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Cestron | Vinum chamæpiteos. |
| Polygonon mas | VERTICAE herbæ |
| Polemonia | pruritus remedia. |
| Saxifragon | Herm. Cor. cap. 707. |
| Xyris Gramen | VSTIS vtilia. |
| Gramen parnassium | Vrtica siue acalyphe. |
| Phoenix herba | VVAE faucium |
| Hippuris | remedia. |
| Oxychoenos | Pix Galla |
| Heliochrysos | Pruna |
| Astragalus | Hirundines |
| Hyacinthus | Vrtica |
| Papauer rhœas | Omphacium |
| Strychnon hypnoticō | Acetum Flos æris |
| Cotyledon prima | Alumen Sal |
| Vrtica Arction | VVLPEs necantia. |
| Vinum lesbium | Apocynon. |
| Hydromel | VVINERV M re |
| Melicratum | media. |
| Vinum rhetinite | Amurca |
| Vinum catorchite | Allium Argemone |
| Vinum è cedro | Aristolochia |
| Vinum è lauro | Aloë Anthyllis |
| Vinum absinthite | Althæa |
| Vinum calaminthite | Androsæmon |
| Vinum aromatite | Lycopsis Acetum |
| Vinum nectarite | Butyrum |
| Vinum nardite | Brassica |
| Vinum asarite | Coccus |
| Vinum syuestris nardi | Chamæpitys |
| Vinum daucite | Centaurion |
| Vinum acorite | Cyclaminos |
| Halcyonium | Cytinos |
| Lapis hæmatites | Cupressus |
| Lapis Iudaicus | Dracunculus |
| Corallium | Dictamnus |

INDEX

| | |
|----------------------|--------------------|
| Aerugo aurificum | Terra eretria |
| Oenanthe | Vinum |
| Ficus Aegyptia | Vinum oenanthe |
| Finum | Vnguentum citrinum |
| Gentiana | Vlmus |
| Glycyrrhiza | Vitex. |
| Glutinum | VVLVAE mulie- |
| Hippuris | ris remedia. |
| Ifatis | Meu |
| Lana succida | Cyperus |
| Ligusticum | Nardi spica |
| Lilium | Casia |
| Lysimachion | Costum |
| Minium sinopicum | Iuncus odoratus |
| Myriophyllum | Balsamum |
| Picea | Bryon |
| Palma | Narcaphthum |
| Portulaca | Oleum amygdalinum |
| Porrum | Mastichinum |
| Polycnemon | Vnguentum rosaceum |
| Polium | Melinum |
| Polygonon mas | Sampsuchinum |
| Polygonatum | Abrotoninum |
| Pentaphyllum | Sosinum |
| Phoenix herba | Narcissinum |
| Pteris | Crocinum |
| Peristereon | Irinum |
| Papauer | Gleucinum |
| Plumbum elotum | Amaracinum |
| Scordion | Metopium |
| Symphyton | Cinnamomum |
| Sideritis | Myrrha |
| Stratiotes aquaticus | Syrax |
| Spongia | Bdellium |
| Cochlex terrestres | Lentiscus |
| Thus | Pix |

Na

CURATIVVS.

| | | |
|------------------|-------|---------------------|
| Naphtha | | Panaces heracleon |
| Iuniperus | | Ammi |
| Laurus | | Spondylion |
| Myrica | | Peucedanum |
| Cistus | Rosa | Sagapenum |
| Lycium | | Galbanum |
| Acacia | | Asclepias |
| Amurca | | Lilium |
| Vitex | Galla | Circæa |
| Palma elate | | Artemisia |
| Myrtus | | Geranium |
| Coronea | | Anthyllis |
| Iuglans | | Parthenion |
| Cimices lecti | | Pæonia |
| Lac schiston | | Cestron |
| Butyrum | | Clematis daphnoides |
| Oesypum | | Chrysocome |
| Coagulum | | Ageraton |
| Eleps | | Vinum terebinthinum |
| Fœnogræcum | | Vinum cedrite |
| Linum | | Vinum picatum, siue |
| Malua | | pissite |
| Portulaca | | Vinum chamedryite |
| Plantago | | Vinum daucite |
| Sonchos | | Vinum helleborite |
| Porrum | | Lapis gagates |
| Sinapi | Piper | Peristereon rectus |
| Agaricum | | Hyoscyamus |
| Rhaponticum | | Mandragoras |
| Pulegium | | Ebulus |
| Centaurium maius | | Ampelos leuce |
| Melilotus | | Acetum |
| Ruta | | Acetum scilliticum. |

INDICIS CURATIVI
FINIS.

LVGDVNI,
EXCVDEBANT IOANNES ET
FRANCISCVS FRELLO-
NII, FRATRES.

1546

